

Dermov[®] 0,5 mg/ml kutanopløsning

clobetasolpropionat

3813685907

Dermov[®] er et registreret varemærke, som tilhører GlaxoSmithKline Koncernen

Læs denne indlægseddell grundigt, inden De begynder at bruge medicinen

- Gem indlægseddelen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Dermov[®] til Dem personligt. Lad derfor være med at give Dermov[®] til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Opsigt over indlægseddelen:

1. Dermov[®]s virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Dermov[®]
3. Sådan skal De bruge Dermov[®]
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Dermov[®]
6. Yderligere oplysninger

1. Dermov[®]s virkning og hvad De skal bruge det til

Dermov[®] indeholder et stærkt binyrebarkhormon (kortikosteroid), der dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslet, eksem eller psoriasis.

De kan bruge Dermov[®] til behandling af forskellige former for udslet, eksem og psoriasis. Det har en kløestillende virkning på huden.

De kan bruge Dermov[®] kutanopløsning til behandling af hovedbunden.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Dermov[®]

Brug ikke Dermov[®] hvis:

- De er overfølsom over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Dermov[®].
- De har betændelse i huden, som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.

Brug ikke Dermov[®] mod:

- En betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
- Betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- Bumser eller på områder med bumser.
- Sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelssår, skoldkopper og helvedesild).
- Hudsygdomme hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Dermov[®]

- Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at lægen igen har set på Deres hudsygdom.
- De bør ikke bruge binyrebarkhormon længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
- De bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
- Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
- Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør De tale med Deres læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
- De bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbindelse eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- De bør ikke bruge Dermov[®] rundt om øjnene.
- Undgå at få Dermov[®] i øjnene.
- Hvis De har brugt Dermov[®] i lang tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Dermov[®] i længere tid. Fortæl derfor lægen, at De bruger Dermov[®], hvis De er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Dermov[®].

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

De kan bruge Dermov[®] sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De må kun bruge Dermov[®] efter lægens anvisning.

Amning

De kan bruge Dermov[®] i korte perioder, selv om De ammer. Spørg lægen.

De bør ikke bruge Dermov[®] på brystet, hvis De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dermov[®] påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal De bruge Dermov[®]

Brug altid Dermov[®] nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Voksne: Den sædvanlig dosis er et tyndt lag påsmurt 1–2 gange daglig.

Ved behandling i håret: Sæt flaskens åbning mod hovedbunden og tryk let på flasken.

Undgå at få Dermovat® i øjnene.

Vask hænderne efter påsmøringen, med mindre De skal behandle hænderne.

Børn: De må kun bruge Dermovat® til børn efter lægens anvisning.

Hvis De har brugt for meget Dermovat® kutanopløsning

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Dermovat®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

I sjældne tilfælde efter langvarig og overdreven brug kan De få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

Hvis De har glemt at bruge Dermovat®

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis, men skal fortsætte med Deres sædvanlige dosering.

Hvis De holder op med at bruge Dermovat®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

4. Bivirkninger

Dermovat® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger kommer især efter længere tids behandling.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Langvarig brug af meget store doser kan føre til rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Hyppighed ikke kendt:

- Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse). Kontakt læge eller skadestue, ring evt. 112.
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter):

- Ny betændelse kan opstå på det behandlede område.

- Tynd hud, som let går i stykker, striber i underhuden (strækmærker).
- Udvidelse af de små blodkar i huden.
- Små punktfornede eller større blødninger i huden.
- En betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme på næse, kinder og pande (rosacea).

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Overfølsomhedsreaktioner.
- Lyse eller brune pletter på huden (pigmentforandringer).
- Uønsket hårvækst.
- Forværring af hudsygdom ved ophør af behandlingen.

Hyppighed ikke kendt:

- Sløring af betændelse i huden og forværring af betændelse i huden.
- Bumses.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved eller er generende. Nogle bivirkninger kræver behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Sådan opbevarer De Dermovat®

Dermovat® opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Dermovat®, efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Dermovat® 0,5 mg/ml kutanopløsning indeholder:

Aktivt stof: Clobetasolpropionat 0,5 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer: Isopropanol, carbomer, natriumhydroxid, renset vand.

Dermovat®'s udseende og pakningsstørrelse:

Dermovat® er en klar, gennemsigtig væske i en hvid plastbeholder.

Dermovat® findes i pakningsstørrelserne 25 ml og 100 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark:

Paranova Danmark A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2006