

Indlægsseddel: Information til brugeren

Finasterid Orifarm 5 mg filmovertukne tabletter

finasterid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Finasterid Orifarm
3. Sådan skal du tage Finasterid Orifarm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Finasterid Orifarm tilhører en gruppe medicin, der kaldes testosteron-5-alfa-reduktasehæmmere. De virker ved at formindske størrelsen af blærehalskirtlen (prostata) hos mænd.

Finasterid Orifarm bruges til behandling og kontrol af godartet forstørret blærehalskirtel (benign prostata-hyperplasi, BPH). Det medfører formindskelse af en forstørret blærehalskirtel, forbedrer vandladningen (urinflow) og symptomer forårsaget af den forstørrede blærehalskirtel. Desuden nedsættes risikoen for akut tilbageholdelse af urin og behovet for operation.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Finasterid Orifarm

Tag ikke Finasterid Orifarm:

- hvis du er allergisk over for finasterid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Finasterid Orifarm (angivet i pkt. 6).
- hvis du er kvinde (se også under "Graviditet og amning")
- hvis du er barn.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Finasterid Orifarm:

- hvis du har en stor mængde tilbageholdt urin og/eller flere vandladninger, hvor ikke alt kommer ud. I disse tilfælde, bør du undersøges for urinvejsforsnævring.
- hvis du skal have foretaget en PSA test (test der anvendes til at opdage prostata kræft). Finasterid kan påvirke niveauet af de substanser, der testes efter.
- Hvis du har nedsat leverfunktion.

- hvis du bemærker ændringer i dine bryster såsom knuder, smerter, hos mænd forstørrede bryster (gynækomasti) eller flåd fra brystvorterne.

Børn

Finasterid Orifarm er ikke beregnet til børn. Sikkerhed og virkning hos børn er ikke klarlagt.

Brug af anden medicin sammen med Finasterid Orifarm

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Finasterid Orifarm kan normalt tages sammen med anden medicin.

Brug af Finasterid Orifarm sammen med mad og drikke

Finasterid Orifarm kan tages med eller uden mad.

Graviditet, amning og fertilitet

Finasterid Orifarm er kun beregnet til mænd.

Hvis din seksualpartner er eller kan være gravid, skal du undgå at udsætte hende for din sæd, der vil kunne indeholde en lille mængde af lægemiddelstoffet.

Kvinder, der er eller måske kan være gravide, bør ikke røre ved knuste eller knækkede

Finasterid Orifarm tabletter. Hvis en kvinde, der er gravid med et drengefoster, optager finasterid gennem huden eller indtager det gennem munden, kan barnet blive født med misdannede kønsorganer. Tabletterne er fillovertrukne, hvilket forhindrer kontakt med finasterid, såfremt tabletterne ikke er knuste eller knækkede.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Så vidt vides påvirker Finasterid Orifarm ikke evnen til at køre bil eller betjene maskiner

Finasterid Orifarm indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager Finasterid Orifarm, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Finasterid Orifarm

Tag altid Finasterid Orifarm nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Voksne

Den sædvanlige dosis er 1 tablet dagligt (svarende til 5 mg finasterid).

De fillovertrukne tabletter kan tages enten på tom mave eller sammen med mad. De bør synkes hele og bør ikke deles eller knuses.

Selvom der kan ses tidlig forbedring, kan det være nødvendigt med behandling i mindst 6 måneder, for at kunne vurdere om der er opnået tilfredsstillende effekt af behandlingen.

Lægen vil fortælle dig, hvor længe du skal fortsætte med at tage Finasterid Orifarm. Afbryd ikke behandlingen for tidligt, da symptomerne så kan komme tilbage.

Patienter med nedsat leverfunktion

Der er ingen erfaring med brug af Finasterid Orifarm til patienter med nedsat leverfunktion.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Ældre patienter

Dosisjustering er ikke nødvendig.

Hvis du har taget for mange Finasterid Orifarm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Finasterid Orifarm, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Finasterid Orifarm

Hvis du glemmer at tage en dosis Finasterid Orifarm, kan du tage den så snart du kommer i tanke om det, med mindre du allerede er tæt på næste dosis. I så fald skal du fortsætte med at tage tabletterne som foreskrevet. Du må ikke tage en dobbeltdosis, som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Finasterid Orifarm

Afbryd ikke behandlingen før tid, da symptomerne kan komme tilbage.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De mest almindelige bivirkninger er impotens og nedsat sexlyst. Disse bivirkninger forekommer normalt i begyndelsen af behandlingen, men forsvinder ved fortsat behandling hos de fleste patienter.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 10 patienter):

- nedsat sexlyst, impotens, nedsat sædvolumen

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til én ud af 100 patienter):

- unormal sædudtømning, ømme bryster, forstørrede bryster
- udslæt

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

- hjertebanken
- kløe, nældefeber
- overfølsomhedsreaktioner, herunder hævelse af ansigt og læber
- forhøjede leverenzymmer
- smerter i testiklerne.

Kontakt straks lægen hvis du oplever ændringer i brystvævet, såsom knuder, smerter, forstørrelse eller udsivning fra brystvorterne, da disse kan være tegn på en alvorlig tilstand, såsom brystkræft.

Finasterid kan påvirke resultatet af PSA-laboratoriemålinger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Finasterid Orifarm utilgængeligt for børn.

Brug ikke Finasterid Orifarm efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Finasterid Orifarm indeholder:

- Aktivt stof: finasterid. Hver filmovertrukken tablet indeholder 5 mg finasterid.
- Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrySTALLinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat (Type A), pregelatineret majsstivelse, docusatnatrium, magnesiumstearat, hydroxypropylcellulose, hypromellose, titandioxid, talcum, indigocarmin aluminium lake (E132), gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Blå, cirkelformet, hvælvet, filmovertrukket tablet med facet kant og mærket med "E" på den ene side og "61" på den anden side.

Pakningsstørrelser

Blisterpakning i æsker med 30 stk. eller 100 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark

info@orifarm.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 05/2015