

INDLÆGGSSEDDEL: Information til brugeren

Papaverin "OBA", tabletter 35 mg

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Papaverin "OBA" til Dem personligt. Lad derfor være med at give Papaverin "OBA" til andre. Det kan være skadeligt for andre, selv om de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Papaverin "OBA"
3. Sådan skal De tage Papaverin "OBA"
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Papaverin "OBA" virker afslappende på tarmens muskulatur.

De kan bruge Papaverin "OBA" til behandling af akutte smertefulde sammentrækninger (kolikker) i maven og tarmen.

Lægen kan have givet Dem Papaverin "OBA" til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE PAPAVERIN "OBA"

Tag ikke Papaverin "OBA", hvis De

- er overfølsom over for det virksomme stof eller et eller flere af hjælpestofferne.

Vær ekstra forsigtig med at tage Papaverin "OBA"

Tal med lægen, hvis De har forstoppelse eller problemer med hjertet.

Brug af anden medicin

Papaverin "OBA" kan nedsætte virkningen af levodopa (mod parkinsonisme). De bør ikke bruge levodopa sammen med Papaverin "OBA".

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.

De kan bruge Papaverin "OBA" under graviditet og amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Papaverin "OBA" påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Det er uvist, om Papaverin "OBA" påvirker arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. De skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker Dem.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Papaverin "OBA"

Papaverin "OBA" indeholder lactose. Kontakt lægen før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE PAPAVERIN "OBA"

Dosering

Voksne:

1-2 tabletter 2-3 gange daglig.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

De bør kun ændre dosis eller holde op med behandlingen efter aftale med lægen.

Hvis De har taget for mange Papaverin "OBA"?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Papaverin "OBA", end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

De kan føle Dem døsig, få synsforstyrrelser eller hovedpine.

Hvis De har glemt at tage Papaverin "OBA"?

Tag aldrig dobbelt dosis for glemte doser. Fortsæt blot med den anbefalede enkeltdosis.

4. BIVIRKNINGEN

Papaverin "OBA" kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Leverbetændelse.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Døsighed, svimmelhed og hovedpine. Kvalme, madlede og opkastninger. Forstoppelse eller diaré. Hududslæt og kløe.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Sveden. Svimmelhed når De rejser Dem hurtigt op. Ansigtsrødmen.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på

www.meldenbivirkning.dk eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Papaverin "OBA" utilgængeligt for børn.

Opbevar Papaverin "OBA" ved stuetemperatur (15° C- 25° C).

Brug ikke Papaverin "OBA" efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Papaverin "OBA" indeholder

Aktiv stof: Papaverinhydrochlorid.

Øvrige indholdsstoffer: Gelatine; kartoffelstivelse; lactose; magnesiumstearat og talcum.

Papaverin "OBA" udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Papaverin "OBA" er en hvid rund (8 mm) tablet med plane flader og delekærv.

Pakningsstørrelser

100 tabletter i tabletglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

OBA-Pharma ApS

Sølvgade 19-21

1307 København K

Fremstiller:

Viminco A/S

Postboks 119

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Denne indlægsseddel blev senest revideret i december 2015