

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

A-vitamin medic 50.000 IE filmovertrukne tabletter

Vitamin A

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret A-vitamin til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage A-vitamin medic
3. Sådan skal du tage A-vitamin medic
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

A-vitamin medic bruges til behandling af A-vitaminmangel.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE A-VITAMIN MEDIC

Tag ikke A-vitamin medic:

- hvis du er allergisk overfor vitamin A eller et af de øvrige indholdsstoffer i A-vitamin medic (angivet i pkt. 6).
- hvis du ikke mangler vitamin A

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager A-vitamin medic.

Tal med lægen, hvis du har nedsat nyrefunktion.

Brug af anden medicin sammen med A-vitamin medic

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Hvis du også tager medicin mod forhøjet kolesterol i blodet (cholestyramin) eller paraffinolie (afføringsmiddel), kan vitamin A blive optaget dårligere fra mave-tarm-kanalen.

Hvis du også tager lægemidler, der indeholder syntetisk A-vitaminsyre (acitretin, anvendes mod psoriasis, eller isotretinoin, anvendes mod akne (bumser)), er der større risiko for, at du får bivirkninger.

Brug af A-vitamin medic sammen med mad og drikke

Du skal tage tabletterne sammen med et glas vand. Du skal helst tage tabletterne i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager A-vitamin medic.

Graviditet

Du må ikke tage A-vitamin medic, hvis du er gravid.

Amning

Du må ikke tage A-vitamin medic, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

A-vitamin medic påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

A-vitamin medic indeholder lactose og saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE A-VITAMIN MEDIC

Tag altid A-vitamin medic nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brug til voksne

Den sædvanlige dosis er 1 tablet dagligt i 5 dage.

Brug til børn

Den sædvanlige dosis er 1,5 mg pr. kg legemsvægt dagligt i 5 dage (højest 1 tablet).

Tabletterne kan sluges hele, knuses eller tygges.

Hvis du har taget for meget A-vitamin medic

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af A-vitamin medic end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag emballagen med.

Symptomer på overdosering er:

- Opkastning, hovedpine, døsighed, dobbeltsyn.
- Væskeansamling i øjet (papilødem).
- Forøget calciumindhold i blodet (hypercalcæmi).
- Øget intrakranielt tryk; spændte fontaneller hos børn.

Symptomerne ophører sædvanligvis, når behandlingen med vitamin A stoppes, mens hos børn kan overdoseringen resultere i nedsat længdevækst.

Hvis du har glemt at tage A-vitamin medic

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Det er vigtigt, at du kun tager A-vitamin medic i 5 dage, idet længere tids indtagelse af vitamin A kan give bivirkninger.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter:
Hudkløe, tørre slimhinder, betændelse i huden og knoglesmerter.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Lægemiddelstyrelsen på mail dkma@dkma.dk, eller med brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares i køleskab (2° C til 8° C).

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

A-vitamin medic indeholder:

- Aktivt stof: Vitamin A 50.000 IE svarende til 15 mg.
- Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol; talcum; hypromellose; silica, kolloid vandfri; povidon; magnesiumstearat; kartoffelstivelse; mikrokrySTALLINSK cellulose; lactose; saccharose; gelatine; modificeret stivelse, butylhydroxytoluen, natriumaluminiumsilikat, titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Runde, hvide fillovertrukne tabletter.

Pakningsstørrelse

50 tabletter

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Tlf.: 44 52 88 88

Fax: 44 52 88 99

E-mail: info@meda.dk

Fremstiller

Viminco A/S

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Denne indlægsseddel blev senest revideret december 2015.