

## Indlægsseddel: Information til brugeren

### Primafenadin 180 mg filmovertrukne tabletter

Fexofenadinhydrochlorid

**Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.**

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Primafenadin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

#### Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Primafenadin
3. Sådan skal du tage Primafenadin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

#### 1. Virkning og anvendelse

Det aktive stof i dette lægemiddel, fexofenadinhydrochlorid, tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes antihistaminer.

Primafenadin 180 mg filmovertrukne tabletter anvendes til at lindre symptomer som f.eks. rødmen af huden, væskeansamlinger og kløe, som forekommer i forbindelse med den allergiske hudreaktion, der kaldes kronisk idiopatisk urticaria (CIU).

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

#### 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Primafenadin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

#### Tag ikke Primafenadin:

- hvis du er allergisk over for fexofenadinhydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Primafenadin (angivet i punkt 6).

#### Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Primafenadin

- hvis du er ældre.
- hvis du nogensinde har haft hjerteproblemer.
- hvis du har nyre- eller leverproblemer.

#### Brug af anden medicin sammen med Primafenadin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Hvis du tager medicin mod for meget mavesyre, som indeholder aluminium eller magnesium, bør du vente 2 timer efter du har taget medicinen, til du tager Primafenadin. Medicinen mod for meget mavesyre kan mindske den mængde Primafenadin, der optages i kroppen og påvirke virkningen af Primafenadin. Hvis du tager Primafenadin sammen med erythromycin (et antibiotikum) eller ketoconazol (et svampemiddel), kan koncentrationen af fexofenadin i blodet stige.

#### Allergitest:

Hvis du skal have foretaget en allergitest, skal du afbryde behandlingen med Primafenadin 3 dage før testen.

#### Brug af Primafenadin sammen med mad og drikke

Primafenadin skal tages sammen med vand inden et måltid.

#### Graviditet amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

#### Graviditet

Du må kun tage Primafenadin efter lægens anvisning.

#### Amning

Hvis du ammer, skal du forsøge at undgå at tage Primafenadin. Spørg lægen til råds.

#### Trafik- og arbejdssikkerhed

Forsøg har vist, at Primafenadin ikke forårsager døsighed, og din evne til at køre bil burde derfor ikke blive påvirket, når du tager Primafenadin. Der kan imidlertid være sjældne undtagelser, så derfor skal du sikre dig, at du er frisk, inden du kører bil eller udfører opgaver, der kræver koncentration.

#### 3. Sådan skal du tage Primafenadin

Tag altid Primafenadin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Til lindring af symptomer på kronisk allergisk hudreaktion (idiopatisk urticaria):

Den anbefalede dosis er  
1 tablet dagligt til voksne og børn fra 12 år.

#### Børn og unge

Børn under 12 år bør ikke få Primafenadin.

Slug tabletten med vand inden et måltid.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du synes virkningen af Primafenadin er for kraftig eller for svag.

#### Hvis du har taget for mange Primafenadin tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Primafenadin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

