

Diproderm® salve, 0,5 mg/g

0078645905

Diproderm® er et registreret varemærke, som tilhører Schering-Plough Koncernen

Læs denne information godt igennem, før De begynder at bruge medicinen

- Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Diproderm® til Dem personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Diproderm®
3. Sådan skal De bruge Diproderm®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Diproderm® er en hvid salve.

Diproderm® indeholder et stærkt binyrebarkhormon.
Diproderm® dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.
De kan bruge Diproderm® til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som De skal læse, før De bruger Diproderm® salve

Brug ikke Diproderm® salve hvis:

- De er overfølsom over for det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Diproderm® salve.
- De har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.

Brug ikke Diproderm® mod:

- En betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
- Betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- Bumser eller på områder med bumser.

- Sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).
- Hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Særlige forholdsregler

- Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at Deres læge igen har set på Deres hudsygdom.
- De bør ikke bruge hormonsalve længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
- De bør særligt undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
- Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
- Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør De tale med Deres læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
- De bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbindelse eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- De bør ikke bruge Diproderm® rundt om øjnene.
- Undgå at få Diproderm® i øjnene.
- Hvis De har brugt Diproderm® i lang tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- Deres binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når De bruger Diproderm® i længere tid. Fortæl derfor lægen, at De bruger Diproderm® salve, hvis De er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Diproderm® salve.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun bruge Diproderm® salve efter lægens anvisning.

Amning:

De kan bruge Diproderm® i korte perioder, selv om De ammer. Spørg lægen.

De bør ikke bruge Diproderm® salve på brystet mens De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diproderm® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

De kan bruge Diproderm® sammen med anden medicin.

3. Sådan skal De bruge Diproderm®

Dosering

Voksne: Påsmør Diproderm® salve i et tyndt lag 1-2 gange daglig (morgen og aften).

Børn: De må kun bruge Diproderm® salve til børn under 12 år efter aftale med lægen. De bør i så fald kun smøre Diproderm® salve på små hudområder og behandlingen må højst vare 1 uge.

Vask hænder efter brug, med mindre hænderne behandles.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har De brugt for meget Diproderm® salve?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere af Diproderm® salve, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan De få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

Har De glemt at bruge Diproderm® salve?

Smør et tyndt lag Diproderm® salve på, så snart De kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist.

4. Bivirkninger

Diproderm® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Bivirkninger forekommer især ved langvarig og overdreven brug, samt ved brug af lufttæt forbindelse.

Alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm® salve

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
- Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.

Hyppighed er ikke kendt:

- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm® salve

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Ny betændelse kan opstå i hud, som er under behandling med Diproderm®.
- Betændelse i hårsække.
- Brændende fornemmelse, kløe, irritation, tør hud.
- Kontakteksem.
- Uønsket hårvækst.
- Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
- Udslett med små væskefyldte blærer.
- Hvide pletter på huden (mindre pigment i huden).
- Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker, laset og opblødt hud.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Overfølsomhed.
- Små punktformede eller større blødninger i huden.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Mørkere hud (øget pigment i huden).

Hyppighed er ikke kendt:

- Forværring af betændelse i huden, sløring af betændelse i huden.
- Udvidelse af de små blodkar i huden.
- Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>.

5. Opbevaring

Opbevar Diproderm® utilgængeligt for børn.

Brug ikke Diproderm® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Diproderm® salve indeholder:

Det virksomme indholdsstof i Diproderm® er betamethason 0,5 mg/g som betamethasondipropionat.

De øvrige indholdsstoffer er: Hvid blød paraffin og paraffinolie.

Pakningsstørrelser:

Diproderm® findes i følgende pakningsstørrelser: 30, 60 og 90 (3 x 30)g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark:

Paranova Danmark A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup.

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup.

Revideret 11/2006