

Diprosalic® 0,5 mg/g + 20 mg/g kutanopløsning betamethason/salicylsyre

5720165913

Diprosalic® er et registreret varemærke, som tilhører Schering Corporation.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen.

- Glem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Diprosalic® til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får en bivirkning, som ikke er nævnt her.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Diprosalic®
3. Sådan skal De bruge Diprosalic®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

- Diprosalic® kutanopløsning indeholder et stærkt binyrebarkhormon og salicylsyre.
- Diprosalic® virker ved at salicylsyren blødgør huden og binyrebarkhormonet dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved bliver udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis mindre.
- De kan bruge Diprosalic® til behandling af forskellige former for eksem samt psoriasis.

Lægen kan have givet Dem Diprosalic® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE DIPROSALIC®

Brug ikke Diprosalic® hvis De:

- er overfølsom over for et af de aktive stoffer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diprosalic® kutanopløsning.
- har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre De samtidig er i behandling for denne betændelse.
- har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme, især på næsen, kinderne og i panden (rosacea).
- har irritation eller betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- har uren hud eller på områder med akne (bumser).
- har betændelse i huden, der skyldes virus (f.eks. forkølelses-sår, skoldkopper).
- skal behandle hudlidelser hos børn under 1 år (f.eks. eksem eller bleksem).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Diprosalic®

- Behandling med binyrebarkhormon bør ikke vare længere end aftalt med lægen.
- De bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
- De bør ikke bruge Diprosalic® kutanopløsning i mere end 4 uger uden, at lægen igen har set på Deres hudsygdom.
- Hvis De får psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen, skal De kontakte læge eller skadestue.

- Hvis De får hovedpine, trykken bag øjnene og synsdefekter, skal De straks kontakte læge eller skadestue.
- Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene samt på indersiden af arme og ben.
- Armhule, lyske og andre områder, hvor hud gnides mod hud, bør kun behandles kortvarigt med Diprosalic®.
- Hvis huden bliver mere tør, irriteret, betændt, rød eller klør og svier, bør De tale med Deres læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi og behandlingen skal muligvis stoppe.
- De må ikke dække det indsmurte område med tætsluttende og lufttæt forbindelse eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- De bør ikke bruge Diprosalic® på åbne sår eller beskadiget hud.
- Undgå at få Diprosalic® i øjne.
- De bør ikke bruge Diprosalic® rundt om øjnene.
- Hvis De har brugt Diprosalic® i længere tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom nedtrapning af behandlingen.
- Dannelse af hormoner fra Deres binyrer kan blive nedsat, når De bruger Diprosalic® i længere tid. Fortæl derfor lægen, at De bruger Diprosalic®, hvis De er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Diprosalic®. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De må normalt ikke bruge Diprosalic®, hvis De er gravid, da der er risiko for, at det kan skade fosteret. Tal med lægen.

Amning:

Hvis De ammer må De kun bruge Diprosalic® efter aftale med lægen. Binyrebarkhormon udskilles i modermælken. De bør ikke bruge Diprosalic® på brystet, mens De ammer.

Trafik- og arbejdsikkerhed

Diprosalic® påvirker ikke arbejdsikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE DIPROSALIC®

Brug altid Diprosalic® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dryp nogle få dråber Diprosalic® kutanopløsning på det berørte område, og massér forsigtigt kutanopløsningen godt ind i huden.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn: Påsmør et tyndt lag 1-2 gange dagligt, henholdsvis morgen og aften.

Veldeholdelsesbehandling

Det vil i nogle tilfælde være tilstrækkeligt med færre påsmøringer.

Undgå at få Diprosalic® i øjnene.

Hvis De har brugt for meget Diprosalic® kutanopløsning

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Diprosalic® kutanopløsning, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug af binyrebarkhormon kan det give rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken.

Overdreven brug af præparater til at smøre på huden, som indeholder salicylsyre, kan give svimmelhed, diarré, feber, susen for ørene (tinnitus), kvalme og/eller opkast.

Hvis De har glemt at bruge Diprosalic® kutanopløsning

Påsmør et tyndt lag Diprosalic® kutanopløsning så hurtigt som muligt og følg derefter lægens anvisning.

Hvis De holder op med at bruge Diprosalic®

De må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter længere tids anvendelse efter aftale med lægen.

Hvis De har brugt Diprosalic® i længere tid, må De ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre Deres hudsygdom. Tal med lægen om langsom nedtrapning af behandlingen.

4. BIVIRKNINGER

Diprosalic® kutanopløsning kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):

- Binyrebarkhæmning, som giver risiko for alvorlig choktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse). Kontakt læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppighed ikke er kendt:

- Rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Kontakt lægen.
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt end normalt. Kontakt lægen.
- Børn kan få kraftig hovedpine, trykken bag øjne og synsdefekter på grund af for højt tryk i hjernen. Kontakt lægen.
- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Ny betændelse på det behandlede område.
- Tynd, skrøbelig hud, der let går i stykker. Tal med lægen.
- Irritation eller betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper og bumser.

- Små punktførmede eller større blødninger i huden pga. bristede blodkar.
- Strækmærker.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 1.000 behandlede):

- Øget behåring hos kvinder, evt. skægvækst/tynde bløde hår i ansigtet, på krop samt arme og ben.
- Lyse eller brune pletter på huden (hhv. mindre eller øget pigment).

Bivirkninger, hvor hyppighed ikke er kendt:

- Udslæt med små væskefyldte blærer pga. stærk sved eller feber.
- Sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden.
- Betændelse i hårsække.
- Kløe, brænden, svien, irritation, tør hud, udslæt.
- Tydelige små blodkar i huden, opblødt, evt. laset hud.
- Allergisk kontakteksem.
- Forværring af eksem når De stopper behandlingen.
- Følelse af smerte.
- Revner i mundvigen.

Der er større risiko for, at De får bivirkninger, hvis De bliver behandlet på store hudområder, ved langvarig behandling, eller hvis De bruger lufttæt forbindelse på det indsmurte område.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

- Opbevar Diprosalic® kutanopløsning utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Diprosalic® temperaturer over 25°C.
- Brug ikke Diprosalic® kutanopløsning efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletlet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Diprosalic® 0,5 mg/g + 20 mg/g kutanopløsning indeholder:

Aktive stoffer: Betamethason 0,5 mg/g som betamethasondipropionat og salicylsyre 20 mg/g. Øvrige indholdsstoffer: Isopropylalkohol, dinatriummedetat, hypromellose, natriumhydroxid og reset vand.

Pakningsstørrelser:

Diprosalic® kutanopløsning fås i pakningsstørrelserne 50 ml, 60 ml og 100 ml. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægseddél blev sidst revideret august 2009.