

## INDLÆGSSEDDEL

### Equip EHV 1,4, injektionsvæske, suspension

Den nyeste indlægsseddel kan findes på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk)

#### 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Zoetis Finland Oy  
Tietokuja 4  
00330 Helsinki  
Finland

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Zoetis Manufacturing & Research Spain S.L.  
Ctra. Camprodón s/n "La Riba"  
17813 Vall de Bianya (Gerona)  
Spanien

#### 2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Equip EHV 1,4, injektionsvæske, suspension

#### 3. ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

1 dosis á 1,5 ml indeholder:

Inaktiveret equint herpesvirus		
Type 1 (EHV-1), stamme 438/77		RP $\geq$ 1*
Inaktiveret equint herpesvirus		
Type 4 (EHV-4), stamme 405/76		RP $\geq$ 1*

\*Relativ styrke ELISA sammenlignet med en referencevaccine, der var påvist effektiv til heste.

Hjælpstoffer:

Carbopol 934	6 mg
Dinatriumhydrogenphosphat	11,93 mg
Natriumdihydrogenphosphat dihydrat	2,23 mg
Vand til injektionsvæsker	1,5 ml

#### 4. INDIKATIONER

Forebyggende mod luftvejsinfektioner forårsaget af EHV-1 og EHV-4, samt mod abort forårsaget af EHV-1.

#### 5. KONTRAINDIKATIONER

Må kun anvendes til raske heste.

## 6. BIVIRKNINGER

Der er i sjældne tilfælde meldt om forbigående reaktioner på injektionsstedet (hævelse), stivbenet gang og systemiske reaktioner (anorexi (spisevægring), hypertermi (forhøjet legemstemperatur) og letargi (vedvarende bevidsthedssvækkelse)). Hævelse kan være forbundet med smerte, men måler sædvanligvis ikke mere end 5 cm i diameter. De observerede kliniske tegn forsvinder i reglen uden behandling i løbet af nogle få op til 10 dage efter vaccinationen.

Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme anafylaktiske reaktioner som hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse.

Der kan i meget sjældne tilfælde udvikles abscesser, og man bør derfor være omhyggelig med at følge anvisninger om steril injektion, som er angivet under "Dosering".

Hvis du bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes du kontakte din dyrlæge.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted.  
[www.sst.dk](http://www.sst.dk)

## 7. DYREARTER

Heste.

## 8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVÆJ(E)

En dosis (1,5 ml) pr. hest gives dybt intramuskulært under iagttagelse af normale aseptiske forholdsregler og anvendelse af sterilt injektionsudstyr. Ryst hætteglasset godt før brug.

Vaccinationsregime:

### 1. Vaccination mod luftvejsinfektioner

#### Førstegangsvaccination

Førstegangsvaccinationen består af to doser af Equip EHV 1,4 givet med 4–6 ugers mellemrum.

Førstegangsvaccinationen af føl startes i 5–6 måneders alderen.

I tilfælde af øget infektionsfare (f.eks. ved utilstrækkelig kolostrum indtagelse eller fare for smitte med EHV-1 eller EHV-4) gives føllene en dosis Equip EHV 1,4 i 3–4 måneders alderen, efterfulgt af en dosis i 5–6 måneders alderen og en dosis 4–6 uger efter.

#### Boostervaccination

Det anbefales at give en boostervaccination af Equip EHV 1,4 hver 6. måned.

### 2. Forebyggelse af abort på grund af EHV-1 infektion

Drægtige hopper vaccineres i femte, syvende og niende drægtigheds måned med en enkelt dosis på 1,5 ml hver gang.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

## **9. OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE**

-

## **10. TILBAGEHOLDELSESTID**

0 dage

## **11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING**

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C til 8 °C).

Brug ikke dette vetrinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "Anv. før". Dato for sidste anvendelsesdag bør ikke overskrides.

## **12. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER**

### Forsigtighedsregler vedrørende brugen:

Samtidig behandling med lægemidler, som kan nedsætte immunresponsen på vaccineantigenerne, bør undgås. Heste, som har været behandlet med immunsuppressive midler, f.eks. glucocorticoider, bør tidligst vaccineres 4 uger efter behandlingens ophør.

### Drægtighed og diegivning:

Kan anvendes.

### Særlige forsigtighedsregler for den person, der administrerer præparatet:

I tilfælde af selvinjektion eller hvis en anden person bliver injiceret med denne vaccine, bør der straks ske henvendelse til læge. Lægen skal informeres om, at vaccinen indeholder en vinyl polymér (Carbopol).

## **13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT**

Ikke anvendte veterinære lægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

## **14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGGSSEDLEN**

21. september 2020