

M120201AA

Indlægsseddel: Information til brugeren

Carbocain®-Adrenalin 5 mg/ml, 10 mg/ml og 20 mg/ml + 5 µg/ml, injektionsvæske, opløsning

mepivacainhydrochlorid og adrenalin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Carbocain-Adrenalin
3. Sådan skal du bruge Carbocain-Adrenalin
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Carbocain-Adrenalin injektionsvæske, opløsning, indeholder det aktive stof mepivacainhydrochlorid, som er et lokalbedøvende middel, samt det aktive stof adrenalin, som forlænger mepivacainhydrochlorids virkning.

Lægemidlet anvendes som smertelindrende middel og til at bedøve en del af kroppen i forbindelse med en operation. Lægemidlet virker ved at forhindre nerverne i det indgivne område i at sende signaler om smerte, varme og kulde. Derfor kan du ikke mærke smerte i området, men stadig føle tryk og berøring.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Carbocain-Adrenalin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Carbocain-Adrenalin:

- hvis du er allergisk over for mepivacainhydrochlorid, andre lokalbedøvende stoffer, adrenalin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).
- hvis du er allergisk over for methyl- og/eller propylparahydroxybenzoat (methylparaben/propylparaben) eller over for para-amino-benzosyre (PABA).
- hvis du er allergisk over for natriummetabisulfit.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Carbocain-Adrenalin, hvis du samtidig:

- lider af sygdommen porfyri, som giver øget indhold af porfyrin i blod, urin, galde og afføring. Symptomer kan være mavesmerter, opkastninger, udspilet mave, forstoppelse, feber og hududslæt, ofte med blærer
- lider af hjerte-karsygdomme (sygdomme i hjerte, puls eller blodkar) eller nedsat hjertefunktion
- lider af en alvorlig lever- eller nyresygdom

- er ældre
- har en dårlig almentilstand
- er barn. Dosis skal nedsættes
- er i behandling med lægemidler, som er beslægtede med lokalbedøvende lægemidler eller midler mod hjerterytmeforstyrrelser (antiarytmika), da de kan forstærke uønskede virkninger af Carbocain-Adrenalin
- har forhøjet blodtryk
- har en sygdom i skjoldbruskkirtlen (thyreotoksikose)
- har diabetes eller en anden sygdom eller lidelse, som kan forværres af adrenalin.

Børn

Carbocain-Adrenalin kan anvendes til børn fra 2 måneder. Doser til børn skal tilpasses alder og vægt.

Brug af anden medicin sammen med Carbocain-Adrenalin

På grund af indholdet af adrenalin, bør dette Carbocain-adrenalin ikke anvendes, hvis du er i behandling med tricykliske lægemidler mod depression, ergotalkaloider og antipsykotiske midler.

Opløsninger, der indeholder adrenalin, bør anvendes med forsigtighed, hvis du samtidig bruger følgende:

- bedøvelsesmidler til inhalation, da der er risiko for alvorlige uregelmæssigheder i pulsen. Samtidig anvendelse af betablokkere såsom propranolol kan medføre alvorligt forhøjet blodtryk og langsom puls.
- andre lokalbedøvende midler eller med stoffer, som er beslægtede med lokalbedøvende midler, f.eks. nogle former for hjertemedicin.
- visse typer af beta-blokkere, som f.eks. propranolol.
- et lægemiddel mod mavesår (cimetidin). Det være nødvendigt med en mindre dosis af Carbocain-Adrenalin.

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Carbocain-Adrenalin kan anvendes til gravide, men anbefales ikke i forbindelse med fødsel, da der er øget risiko for forgiftning af fostret og den nyfødte.

Carbocain-Adrenalin kan udskilles i modermælk, men i så små mængder, at der ikke er nogen risiko for påvirkning af det ammede barn. Det vides ikke, om adrenalin udskilles i modermælken, men det vil næppe påvirke det ammede barn.



Trafik- og arbejdssikkerhed


Ud over den bedøvende effekt kan lokalbedøvelse have en meget mild effekt på koordination og opmærksomhed. Du skal derfor holde øje med, hvordan medicinen påvirker dig.

Carbocain-Adrenalin indeholder methylparahydroxybenzoat (E218), natriummetabisulfit (E223) og natrium

Carbocain-Adrenalin indeholder methylparahydroxybenzoat. Kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde åndedrætsbesvær.

Carbocain-Adrenalin indeholder natriummetabisulfit. Kan i sjældne tilfælde medføre overfølsomhedsreaktioner og vejrtrækningsbesvær.

AstraZeneca	Perigord Job No.:	300401	Artworker Initials:	JL	Printable Colours:	 Black	Non Print:	 Profile	Perigordpremedia
	Market:	Denmark, Iceland							
	Version No.:	01							
	Date & Time:	10 March 2017	14:13						
	Ops Component Code:	M120201AA							
	Drawing Ref:	CPG0045-2							
	Pack Line Code Data:	115							
	Description:	Carbocain Adrenaline leaflet							



Bar prints 100mm @ 100%

Font information

Font family: **Nimbus Sans**
 Body text size: **8.5 pt**
 Smallest text size: **8.5 pt**
(excluding component code)
 Condensed Fonts Used: **N**

Carbocain-Adrenalin injektionsvæske
5 mg/ml, 10 mg/ml og 20 mg/ml + 5 µg/ml
indeholder henholdsvis ca. 0,14 mmol (ca.
3,15 mg), ca. 0,13 mmol (ca. 3,0 mg) og ca.
0,11 mmol (ca. 2,6 mg) natrium pr. ml. Hvis
du er på natrium- eller saltfattig diæt, skal
du tage hensyn hertil.

3. Sådan skal du bruge Carbocain-Adrenalin

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens
anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller
apotekspersonalet.

Din dosis af Carbocain-Adrenalin afgøres af din
læge og afhænger af, hvilken type bedøvelse,
du har brug for, hvilket område, som skal
bedøves og varigheden af bedøvelsen.

Brug til børn

Carbocain-Adrenalin kan anvendes til børn
fra 2 måneder. Doser til børn skal tilpasses
alder og vægt.

Hvis du har brugt for meget

Carbocain-Adrenalin

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet,
hvis du tror, du har fået for meget
Carbocain-Adrenalin, eller mere end lægen
har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis en dosis er glemt

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis
du tror, du ikke har fået Carbocain-Adrenalin.
Du må ikke få en dobbeltdosis som
erstatning for den glemte dosis.

Hvis behandlingen bliver stoppet

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis
der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin
give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

*Sjældne til meget sjældne bivirkninger
(forekommer hos færre end 1 ud af
1.000 patienter)*

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær
og besvimelse (inden for minutter til timer),
pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/
shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Hjertestop. Ring 112.
- Svækket vejrtrækning, blåfarvning af
læber og negle. Ring 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

- Åndenød, hurtig, rallende vejrtrækning,
smerte eller ubehag i brystet samt hoste
med skummende evt. blodigt opspyt pga.
vand i lungerne. Kontakt straks læge eller
skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer
hos flere end 1 ud af 10 patienter)

- Kvalme
- Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt
blodtryk

Almindelige bivirkninger (forekommer hos
mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du
får meget langsom puls eller bliver utilpas
eller besvimer, skal du kontakte læge eller
skadestue. Ring evt. 112.
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller
følelsesløshed i huden
- Svimmelhed
- Opkastning
- For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt
blodtryk skal behandles. Meget forhøjet
blodtryk er alvorligt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer
hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

- Tegn og symptomer på forgiftning
i centralnervesystemet (kramper,
prikkende og snurrende fornemmelser
eller følelsesløshed i huden omkring
munden, følelsesløshed i tungen, sygeligt
skærpet hørelse, synsforstyrrelser, rysten,
susen for ørerne (tinnitus), talebesvær,
svækkelse af centralnervesystemet). Kan
være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger
(forekommer hos færre end 1 ud af
1.000 patienter)

- Uregelmæssig puls. Kan være eller blive
alvorligt. Tal med lægen.
- Smerter og føleforstyrrelser pga.
nervebetændelse
- Nerveskader i arme og ben
- Betændelse i membran, der beskytter
rygsøjlen og hjernen (arakhnoiditis)
- Dobbeltsyn. Kan blive alvorligt. Kontakt
lægen eller evt. skadestue.
- Allergiske reaktioner

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale
med din læge eller apoteket. Dette gælder
også mulige bivirkninger, som ikke er
medtaget i denne indlægsseddel. Du
eller dine pårørende kan også indberette
bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen
via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du
hjælpe med at fremskaffe mere information
om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Carbocain-Adrenalin utilgængeligt
for børn.

Brug ikke Carbocain-Adrenalin efter
den udløbsdato, der står på pakningen.
Udløbsdatoen er den sidste dag i den
nævnte måned. Anvendes senest 3 dage
efter åbning.

Opbevares ved 2 °C - 15 °C. Må ikke
nedfryses. Opbevares i den originale
emballage for at beskytte mod lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal
bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet
må du ikke smide medicinrester i afløbet,
toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Carbocain-Adrenalin indeholder:

- Aktivt stof/aktive stoffer:
mepivacainhydrochlorid
- Øvrige indholdsstoffer: hydrogenchlorid
(til pH-justering), natriumchlorid,
natriumhydroxid (til pH-justering),
natriummetabisulfid (E223),
methylparahydroxybenzoat (E218), vand til
injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Carbocain-Adrenalin injektionsvæske er en
steril vandig opløsning med pH 3,3-5,0.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller





Indehaver af markedsføringstilladelsen:


AstraZeneca A/S
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S

Fremstiller:
Recipharm Monts, Frankrig

**Denne indlægsseddel blev senest ændret
05/2016**
© AstraZeneca 2016

AstraZeneca 

	Perigord Job No.: 300401	Artworker Initials: JL	Printable Colours:  Black	Non Print:  Profile  Technical Info	Perigordpremedia
	Market: Denmark, Iceland				
	Version No.: 01				
	Date & Time: 10 March 2017 14:13				
	Ops Component Code: M120201AA				
	Drawing Ref: CPG0045-2				
	Pack Line Code Data: 115				
Description: Carbocain Adrenaline leaflet					



Bar prints 100mm @ 100%

Font information

Font family: **Nimbus Sans**
Body text size: **8.5 pt**
Smallest text size: **8.5 pt**
(excluding component code)
Condensed Fonts Used: **N**

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins
Carbocain® adrenalin 10 mg/ml + 5 míkrog/ml
stungulyf, lausn

mepivacainhýdróklóríð og adrenalin

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða heilbrigðisstarfsfólks ef þörf er á frekari upplýsingum.
- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.
- Látið lækinn, lyfjafræðing eða heilbrigðisstarfsfólk vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1. Upplýsingar um Carbocain adrenalin og við hverju það er notað
2. Áður en byrjað er að nota Carbocain adrenalin
3. Hvernig nota á Carbocain adrenalin
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á Carbocain adrenalin
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Carbocain adrenalin og við hverju það er notað

Carbocain adrenalin stungulyf, lausn inniheldur virka efnið mepivacainhýdróklóríð sem er staðdeyfandi efni og virka efnið adrenalin sem lengir verkun mepivacainhýdróklóríðs. Lyfið er notað við verkjastillingu og til þess að deyfa hluta líkamans við skurðaðgerð. Lyfið kemur í veg fyrir að taugarnar á meðferðarsvæðinu sendi boð um verki, hita og kulda. Þess vegna finnur þú ekki fyrir verkjum á svæðinu en getur þó fundið fyrir þrýstingi og snertingu.

2. Áður en byrjað er að nota Carbocain adrenalin

Verið getur að lækinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum lækni og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má nota Carbocain adrenalin:

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir mepivacainhýdróklóríði eða öðrum staðdeyfilyfjum, adrenalini eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talín upp í kafla 6).
- ef um er að ræða ofnæmi fyrir methyl- og/eða propylparahydroxybenzoati (methylparaben/propylparaben) eða fyrir para-amino-benzosýru (PABA).
- ef um er að ræða ofnæmi fyrir natriummetabisulfiti.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá læknum, lyfjafræðingi eða heilbrigðisstarfsfólki áður en Carbocain adrenalin er notað ef þú ert:

- með sjúkdóminn porfyriú, sem eykur magn porfyríns í blóði, þvagi, galli og hægðum. Einkennin geta verið kvíðverkir, uppköst, þaninn kvíður, hægðatregða, hiti og húðútbrot oft með blóðrum
- með hjarta- og æðasjúkdóma eða skerta hjartastarfsemi
- með alvarlegan lífrar- eða nýrnasjúkdóm
- aldraður/öldruð
- lasburða
- barn. Þá þarf að minnka skammtinn
- í meðferð með lyfjum sem eru skyld staðdeyfilyfjum eða lyfjum við hjartsláttartruflunum, þar sem þau lyf geta aukið óæskileg áhrif Carbocain adrenalin
- með of háan blóðþrýsting

- með sjúkdóm í skjaldkirtli (skjaldvakæitrun)
- með sykursýki eða annan sjúkdóm eða kvilla sem getur versnað við notkun adrenalíns.

Börn

Carbocain adrenalin má nota hjá börnum frá 2 mánaða aldri. Skammtar hjá börnum eiga að fara eftir aldri og þyngd.

Notkun annarra lyfja samhliða Carbocain adrenalin

Þar sem lyfið inniheldur adrenalin á ekki að nota Carbocain adrenalin ef þú ert í meðferð með þríhringlaga þunglyndislyfjum, ergotalkalóíðum og geðrofslyfjum. Gæta skal varúðar þegar lausnir sem innihalda adrenalin eru notaðar samhliða eftirfarandi:

- svæfingarlyfjum til innöndunar þar sem hætta er á alvarlegri óreglu á púls. Samhliða notkun betablokka, t.d. propranolols, getur valdið alvarlegri blóðþrýstingshækkun og hægum púls.
- öðrum staðdeyfilyfjum eða lyfjum sem eru byggjalega skyld staðdeyfilyfjum, t.d. nokkrum hjartalyfjum.
- ákveðnum tegundum betablokka, eins og t.d. propranololi.
- lyfi við magasári (cimetidin). Þá þarf hugsanlega að minnka skammt Carbocain adrenalin.

Látið lækinn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Meðganga og brjóstagiöf

Við meðgöngu, brjóstagiöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Carbocain adrenalin má nota á meðgöngu en ekki er mælt með notkun þess við fæðingu þar sem aukin hætta er á eiturverkunum á fóstur og nýbura.

Carbocain adrenalin getur skilist út í brjóstamjólk en í það litlu magni að engin hætta er á áhrifum á barn á brjósti. Ekki er vitað hvort adrenalin skilst út í brjóstamjólk en ólíklegt er að það hafi áhrif á barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Auk deyfandi áhrifa getur staðdeyfing haft mjög væg áhrif á samhæfingu og árvekni. Þú þarf að vera vakandi fyrir því hvaða áhrif lyfið hefur á þig.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.




Carbocain adrenalin inniheldur methylparahydroxybenzoat (E218), natriummetabisulfit (E223) og natrium

Carbocain adrenalin inniheldur methylparahydroxybenzoat. Getur valdið ofnæmisviðbrögðum (þau geta komið fram eftir meðferðina) og í mjög sjaldgæfum tilvikum öndunarerfiðleikum.

Carbocain adrenalin inniheldur natriummetabisulfit. Getur í mjög sjaldgæfum tilvikum valdið ofnæmisviðbrögðum og öndunarerfiðleikum.

Carbocain adrenalin stungulyf 10 mg/ml + 5 míkrog/ml inniheldur um 0,13 mmól (um 3,0 mg) natrium í hverjum ml. Sjúklingar á natriumskertu mataræði þurfa að hafa þetta í huga.

3

AstraZeneca	Perigord Job No.: 300401	Artworker Initials: JL	Printable Colours:  Black	Non Print:  Profile  Technical Info	Perigordpremedia
	Market: Denmark, Iceland				
	Version No.: 01				
	Date & Time: 10 March 2017 14:13				
	Ops Component Code: M120201AA				
	Drawing Ref: CPG0045-2				
	Pack Line Code Data: 115				
Description: Carbocain Adrenaline leaflet					



Bar prints 100mm @ 100%

Font information

Font family: **Nimbus Sans**
Body text size: **8.5 pt**
Smallest text size: **8.5 pt**
(excluding component code)
Condensed Fonts Used: **N**

3. Hvernig nota á Carbocain adrenalín

Notið lyfið alltaf eins og lækurinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá læknum eða lyfjafræðingi.

Lækurinn ákveður skammt Carbocain adrenalín sem fer eftir tegund deyfingar, svæðinu sem á að deyfja og lengd deyfingar.

Notkun handa börnum

Carbocain adrenalín má nota hjá börnum frá 2 mánaða aldri. Skammtar hjá börnum eiga að fara eftir aldri og þyngd.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Hafðu samband við lækinn eða heilbrigðisstarfsfólk ef þú heldur að þú hafir fengið of mikið Carbocain adrenalín, eða meira en lækurinn hefur ávísað (og þú finnur fyrir ónotum).

Ef gleymist að nota Carbocain adrenalín

Hafðu samband við lækinn eða heilbrigðisstarfsfólk ef þú heldur að þú hafir ekki fengið Carbocain adrenalín.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Ef hætt er að nota Carbocain adrenalín

Leitið til læknisins eða heilbrigðisstarfsfólks ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Alvarlegar aukaverkanir

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir og aukaverkanir sem koma órsjaldan fyrir (koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 1.000 sjúklingum)

- Skyndileg húðútbrot, öndunarerfiðleikar og yfirlið (innan mínútna til klukkustunda) vegna ofnæmis (bráðaofnæmisviðbrögð/lost). Getur verið lífshættulegt. Hringdu í 112.
- Hjartastopp. Hringdu í 112.
- Öndunarbílun, bláleitar varir og neglur. Hringdu í 112.

Aukaverkanir þar sem tíðni er ekki þekkt

- Andnauð, hröð, korrandi öndun, verkur og óþægindi fyrir brjósti ásamt hósta með froðukenndum og hugsanlega blóðugum uppgangi vegna vökva í lungum. Hafðu strax samband við lækni eða bráðamóttöku. Hringdu jafnvel í 112.

Aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar

Mjög algengar aukaverkanir (koma fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 sjúklingum)

- Ógleði
- Sundl, jafnvel yfirlið vegna lágs blóðþrýstings

Algengar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 sjúklingum)

- Hægur puls. Getur orðið alvarlegt. Ef puls verður mjög hægur eða þú finnur fyrir ónotum eða yfirliðstillfinningu skaltu hafa samband við lækni eða bráðamóttöku. Hringdu jafnvel í 112.

- Stingir og náladofi eða dofi í húð

- Sundl

- Uppköst

- Of há blóðþrýstingur. Hafðu samband við lækinn. Nauðsynlegt er að meðhöndla of háan blóðþrýsting. Mikil blóðþrýstingshækkun er alvarleg.

Sjaldgæfar aukaverkanir (koma fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 1.000 sjúklingum)

- Einkenni um eiturvekun í miðtaugakerfi (krampi, stingir og náladofi eða dofi í húðinni í kringum munninn, dofi í tungu, ofurnæm heyrn, sjóntruflanir, skjálfti, suð fyrir eyrum, taltruflanir, bæling miðtaugakerfis). Getur verið eða orðið alvarlegt. Hafðu samband við lækinn.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir og aukaverkanir sem koma órsjaldan fyrir (koma fyrir hjá færri en 1 af hverjum 1.000 sjúklingum)

- Óreglulegur puls. Getur verið eða orðið alvarlegt. Hafðu samband við lækinn.
- Verkir og truflanir á snertiskyni vegna bólgu í taugum
- Taugaskemmdir í hand- og fótleggjum
- Bólga í himnu sem verndar hrygg og heila (skúmbólga)
- Tvisýni. Getur orðið alvarlegt. Hafðu samband við lækinn eða jafnvel bráðamóttöku.
- Ofnæmisviðbrögð

Tilkynning aukaverkana

Látið lækinn lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Carbocain adrenalín

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum.

Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. Notið í seinasta lagi 3 dögum eftir opnun.

Geymið við 2°C - 15°C. Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Carbocain adrenalín inniheldur

- Virka innihaldsefnið er mepivacainhýdróklóríð
- Önnur innihaldsefni eru saltsýra (til að stilla pH), natriumklóríð, natriumhýdroxíð (til að stilla pH), natriummetabisulfit (E223), methylparahydroxybenzoat (E218), vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Carbocain adrenalín og pakkningastærðir

Carbocain adrenalín stungulyf er sæfð vatnslausn með pH 3,3-5,0.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

AstraZeneca A/S

Arne Jacobsens Allé 13

2300 København S

Danmörk





Framleiðandi:


Recipharm Monts, Frakkland

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður júlí 2016.

© AstraZeneca 2016

AstraZeneca 

	Perigord Job No.: 300401	Artworker Initials: JL	Printable Colours:  Black	Non Print:  Profile  Technical Info	Perigordpremedia
	Market: Denmark, Iceland				
	Version No.: 01				
	Date & Time: 10 March 2017 14:13				
	Ops Component Code: M120201AA				
	Drawing Ref: CPG0045-2				
	Pack Line Code Data: 115				
	Description: Carbocain Adrenaline leaflet				



Bar prints 100mm @ 100%

Font information

Font family: **Nimbus Sans**
Body text size: **8.5 pt**
Smallest text size: **8.5 pt**
(excluding component code)
Condensed Fonts Used: **N**

Annotations

Annotation & Approval Print PDF Error!