

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pergotime® 50 mg tabletter

clomifencitrat

Pergotime® er et registreret varemærke,
der tilhører Merck KGaA.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Pergotime® til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på
www.indlægsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pergotime®
3. Sådan skal du tage Pergotime®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Pergotime® er et hormonpræparat, der virker ved at stimulere de overordnede kønshormoner, hvorved ægmodningen og til en vis grad ægløsningen fremmes. Du kan bruge Pergotime® mod uønsket barnløshed på grund af manglende ægmodning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PERGOTIME®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Pergotime®, hvis:

- du er allergisk over for clomifencitrat, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pergotime® (angivet i punkt 6).
- du har tendens til blodpropper eller årebetændelse.
- du har eller har haft leversygdomme.
- du har blødning fra skeden af ukendt årsag.
- du har kræft i kønsorganer.
- du har livmoderslimhinde uden for livmoderen (endometriose).
- du har cyster i æggestokkene.
- dine æggestokke ikke fungerer normalt.
- du har en svulst i hypofysen.
- din skjoldbruskkirtel eller binyrerne ikke virker normalt.
- du har haft synsforstyrrelser under tidligere behandling med Pergotime®.
- du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Vær opmærksom på følgende:

- Før behandling med Pergotime® vil lægen foretage en gynækologisk undersøgelse. Det er meget vigtigt, at du ikke er gravid.
- Før behandling med Pergotime® bør det sikres, at din partner har tilstrækkelig sædproduktion.

- Æggestokkene kan i nogle tilfælde overreagere på behandlingen (hyperstimulering). Hvis du får mavesmerter, skal du kontakte sygeplejerske eller læge hurtigst muligt. Lægen vil tage stilling til om behandlingen skal fortsættes.
- Langvarig behandling med Pergotime® kan øge risikoen for kræft i æggestokkene. Du må derfor ikke overskride den anbefalede behandlingstid.
- Du skal vide, at risikoen for svangerskab med to eller tre fostre øges ved behandling med Pergotime®.
- Der kan forekomme blødning i starten af graviditeten, dette må ikke forveksles med almindelig menstruation.

Brug af anden medicin sammen med Pergotime®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Pergotime®, hvis du er gravid. Kontakt din læge, hvis du under behandling med Pergotime® finder ud af, at du er blevet gravid i den forrige periode.

Amning

Du må ikke tage Pergotime®, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pergotime® kan give bivirkninger (tågesyn eller andre synsforstyrrelser), der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Pergotime® indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE PERGOTIME®

Tag altid Pergotime® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

1-2 tabletter dagligt i 5 dage. Du må ikke tage mere end højst 2 tabletter daglig i 5 dage i højst 6 cykler.

Behandlingen bør begynde omkring den femte dag i cyklus. Hvis du ikke har blødninger, kan du begynde behandlingen når som helst. Det er vigtigt, at samleje sker på det rigtige tidspunkt i forhold til ægløsningen. Tal med din læge.

Nedsat leverfunktion

Hvis du har alvorlig leversygdom, må du ikke tage Pergotime®. Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Pergotime®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Pergotime®, end der står i denne information eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Ved indtagelse af mere end den anbefalede dosis Pergotime® kan følgende symptomer forekomme: Kvalme, opkastning, rødmen, synsforstyrrelser eller forstørret æggestok med bækken- eller mavesmerter. Tager du en dosis på over 100 mg om dagen i 5 dage, kan bivirkningerne forekomme oftere.

Hvis du har glemt at tage Pergotime®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Pergotime®

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om. Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Pergotime®.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige – meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):

- Forstørrelse af en æggestok med voldsomme smerter pga. afbrydelse af blodforsyningen til æggestokken. Kontakt straks læge eller skadestue.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af 1000 patienter):

- Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Åndenød, smerter i brystet med udstråling til arme eller hals, voldsomme smerter i maven, lammelser, føleforstyrrelser, talebesvær, smertende og evt. hævede arme eller ben pga. blodprop.
- Kontakt straks læge eller skadestue, hvis en af ovennævnte bivirkninger forekommer. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop. Kontakt læge eller skadestue.
- Sjældne tilfælde af kræft i æggestokkene er set efter medicinsk behandling mod barnløshed.
- Menstruationslignende smerter gennem længere tid. Kontakt læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige – meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):

- Nervøsitet.
- Søvnløshed.
- Hovedpine, svimmelhed.
- Synsforstyrrelser.
- Opkastning, kvalme, mavesmerter.
- Rødmen.
- Ømme bryster.
- Ovariecyster.

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Oppustet mave.
- Brystubehag.
- Uregelmæssige blødninger.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Depression, humørsvingninger. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med din læge.
- Nældefeber og allergisk udslæt.
- Forbigående hårtab.
- Træthed.
- Vægtøgning.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Forstoppelse, diarré.
- Akut betændelse i bugspytkirtlen.
- Forhøjet triglycerid i blodet.

Pergotime® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forhøjede levertal, som bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

- Opbevar Pergotime® utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Pergotime® ved temperaturer over 25 °C.
- Opbevares i den original emballage for at beskytte mod lys.
- Brug ikke Pergotime® efter den udløbsdato, der står på pakningen (efter EXP). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Pergotime® 50 mg tabletter indeholder:

Aktivt stof: Clomifencitrat.
Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, natriumstivelseglycolat, majsstivelse, mikrokrySTALLinsk cellulose, kolloid silica og magnesiumstearat.

Udseende og pakningsstørrelser:

Hvide runde tabletter med delekærv og mærket med S.
Pergotime® 50 mg fås i blisterpakning med 5 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Frigivet af:

Paranova Pack B.V.
Vijzelweg 32, 8243 PM Lelystad
Holland

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2016.