

Effexor® 50 mg tabletter

venlafaxin

0113085906

Effexor® svarer til lægemidlet Efixor®

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Effexor® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Effexor® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Effexor®s virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Effexor®
3. Sådan skal De bruge Effexor®
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Effexor®
6. Yderligere oplysninger

1. Effexor®s virkning og hvad De skal bruge det til

Effexor® tilhører en gruppe lægemidler, som kaldes antidepressiva.

Effexor® anvendes til behandling og forebyggelse af moderat til alvorlig depression.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Effexor®

Brug ikke Effexor® hvis De:

- er overfølsom overfor venlafaxin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Effexor®
- samtidig er i behandling med MAO-hæmmer (mod depression)

Vær ekstra forsigtig med at bruge Effexor®

Hvis De skal skifte fra en MAO-hæmmer til Effexor®, skal De holde en pause på 14 dage, før De begynder med Effexor®.

Hvis De skal skifte fra Effexor® til en MAO-hæmmer, skal De holde en pause på 7 dage, før De begynder med MAO-hæmmeren.

Effexor® bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Ved behandling af børn og unge under 18 år med Effexor® skal De være særlig opmærksom på symptomer som selvmordstanker, aggressiv opførsel og vrede.

Hvis De oplever disse symptomer, kontakt da straks lægen, da der er risiko for selvmordsforsøg hos denne gruppe, når de behandles med medicin mod depression. Der er usikkerhed om, hvordan Effexor® påvirker børn og unge med hensyn til vækst, modning, forståelses- og adfærdsmæssige udvikling.

Fortæl altid lægen om andre problemer med helbredet, specielt ved hjerte-, lever- og nyreproblemer samt tidligere tilfælde af kramper eller mani.

Lægen skal også vide, hvis De:

- lider af forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
- tager vanddrivende medicin
- er særligt disponeret for blødning i hud og slimhinder (blå mærker)
- har sukkersyge

Der er øget risiko for selvmord i de første uger af behandlingen, indtil bedring af symptomerne. Hold derfor tæt kontakt til Deres læge i starten af behandlingen.

Aggressivitet kan forekomme ved behandlingsstart/-ophør eller ved dosisændring.

De skal være opmærksom på, at lægen muligvis vil tage blodprøver for at undersøge indholdet af kolesterol i blodet samt lave blodtryksmåling for at kontrollere Deres blodtryk.

Hvis De er i den fødedygtige alder, skal De bruge sikker prævention, mens De bruger Effexor®.

Hvis behandlingen har været længerevarende, og den, i samråd med lægen, skal nedtrappes, bør det ske gradvist over en periode på mindst 2 uger.

Hvis behandling med Effexor® pludselig ophører, ved nedsat dosis eller under nedtrækning af Effexor® kan De opleve symptomer som: Hypomani (tilstand med bl.a. løftet sindsstemning, taletrang og øget selvfølelse), angst, nervøsitet, forvirring, søvnløshed, rastløshed, uro, aggressivitet, søvnforstyrrelser, træthed, sygelig søvnighed, lettere lammelse, svimmelhed, krampe, pludselige svimmelhedsanfald, hovedpine, svedeture, mundtørhed, ringen

for ørerne, spiseforstyrrelser, diarré, kvalme og opkastninger.

Dette vil dog være af forbigående karakter og forsvinder uden behandling.

Brug af anden medicin

Effexor® kan påvirke optagelsen og udskillelsen af andre lægemidler.

Fortæl lægen hvis De anvender følgende medicin:

- blodfortyndende medicin
- medicin mod migræne
- smertestillende medicin
- svampedræbende medicin
- medicin mod depression
- haloperidol (mod psykiske tilstande som hallucinationer og vrangforestillinger)
- perphenazin, levomepromazin (mod skizofreni og psykoser)
- propafenon, quinidin (mod hjerterytmeforstyrrelser)
- cimetidin (mod for meget mavesyre)
- perikon (naturlægemiddel)

Undgå alkohol og slankemidler under behandling med Effexor®.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Brug af Effexor® sammen med mad og drikke

De bør tage Effexor® i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De må ikke bruge Effexor®, hvis De er gravid.

Amning:

Hvis De ammer, må De ikke bruge Effexor®, da det bliver udskilt i mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Effexor® kan måske virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal De tage hensyn til, når De færdes i trafikken eller arbejder med maskiner.

3. Sådan skal De bruge Effexor®

Medicinen fås i flere styrker. Der gøres derfor opmærksom på, at ikke alle doseringer, nævnt herunder, kan opnås med Effexor® 50 mg.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

Individual: 37,5 mg 2 gange dagligt. Efter nogle uger kan dosis øges til 75 mg 2 gange dagligt.

Lægen styrer dosis ud fra virkning.

Maksimal døgndosis er 375 mg.

Vedligeholdelsesbehandling ved

depression: Samme dosis som ved behandlingens start.

Børn og unge under 18 år: De må kun anvende Effexor® til børn og unge under 18 år efter lægens anvisning.

Ældre: Dosis skal muligvis nedsættes. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og/eller leverfunktion:

Det er nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisninger

Brug altid Effexor® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket.

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis De har taget for mange Effexor® tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Effexor® end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Symptomer på overdosering er forandringer i hjerterytmen, for hurtig hjerterytme, for langsom hjerterytme, for lavt blodtryk, svimmelhedsanfald, krampeanfald og dødsfald.

Hvis De har glemt at tage Effexor® tabletter

Kontakt lægen hvis De har glemt at tage Effexor®, her vil De kunne få oplyst, hvordan De skal forholde Dem.

Hvis De holder op med at tage Effexor® tabletter

De må ikke stoppe behandlingen brat, men skal trappe langsomt ned.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4. Bivirkninger

Effexor® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter): Påvirkning af leverfunktion, for lavt natriumindhold i blodet, hallucinationer.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter): Blodet er længere tid om at størkne, nedsat antal blodplader i blodet, for lille produktion af det hormon der koncentrerer urin, leverbetændelse, krampeanfald, malignt neuroleptika syndrom (alvorlig tilstand med høj feber, muskelstivhed og stærk svedtendens), seretonergt syndrom (som bl.a. giver feber, koma, kramper, muskelstivhed, hurtig puls og diarré), selvmordstanker eller -adfærd, mani. Kontakt læge eller sygehus, ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Ændringer i blodets sammensætning, kraftig allergisk reaktion, forstyrrelser i hjerterytmen, hudlidelse ledsaget af feber og ledproblemer i nogle tilfælde alvorlig, med blæreformet udslæt og betændelsesreaktioner, betændelse i bugspytkirtlen, alvorlig muskellidelse med nedbrydning af muskelvæv, delirium, lungeproblemer, grøn stær (øjenlidelse). Kontakt læge eller sygehus, ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter): For højt blodtryk, forhøjet kolesterol i blodet, kraftløshed, træthed, nedsat appetit, rødmen og hedeftning, forstoppelse, mavesmerter, kvalme, opkastning, vægttab, mareridt, nedsat seksuallyst, svimmelhed, mundtørhed, søvnløshed, nervøsitet, følelse af myrekryb, rysten, afslappethed, gaben, synsforstyrrelser (forringet nærsyn), forstørrede pupiller, uklart syn, unormal sædafgang/orgasme (mænd), manglende orgasme, rejsningsbesvær/impotens, vandladningsbesvær, hjertebanken, forøget muskelspænding, hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter): For lavt blodtryk, for hurtig hjerterytme, ringen for ørerne, overfølsomhed for lys, tænderskæren, diarré, blodansamlinger under huden, blødning fra slimhinder, vægtstigning, apati (sygelig ligegyldighed), ufrivillige muskelsammentrækninger, ophidselse, svimmelhed når man rejser sig fra liggende eller siddende stilling, besvimelsesanfald, udslæt, pletsældethed, smagsforstyrrelser, problemer med orgasme (kvinder), meget kraftig menstruation, tilbageholdelse af urin, væskeophobning.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter): Opmærksomhedsforstyrrelser, motorisk uro (oftest i benene).

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Kløe, øget produktion af prolaktin (hormon der stimulerer mælkeproduktion), bevægelsesforstyrrelser.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved eller er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Sådan opbevarer De Effexor®

Effexor® opbevares utilgængeligt for børn. Brug ikke Effexor®, efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere information

Effexor® tabletter indeholder

Det virksomme indholdsstof i Effexor® er venlafaxin 50 mg som venlafaxinhydrochlorid.

De øvrige indholdsstoffer er: Mikrokrystallinsk cellulose, lactose, natriumcarboxymethylstivelse, magnesiumstearat, gul og brun jernoxid (E172).

Effexor®s udseende og pakningsstørrelser:

Effexor® er en femkantet, rosa tablet mærket W 50 på den ene side.

Effexor® findes i pakningsstørrelsen 50 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i Danmark:

Paranova Danmark A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Denne indlægsseddel blev senest revideret juni 2007