

Fleet Klar-til-brug 21,4 g / 9,4 g, rektalvæske, opløsning

Natriumdihydrogenphosphatdihydrat / Dinatriumphosphatdodecahydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fleet Klar-til-brug
3. Sådan skal du bruge Fleet Klar-til-brug
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Fleet Klar-til-brug er et afføringsmiddel. Du skal indføre Fleet Klar-til-brug i endetarmen.

Fleet Klar-til-brug virker ved at fylde op i tarmen, så du får trang til afføring.

Fleet Klar-til-brug kan bruges af voksne og børn over 4 år til:

- lejlighedsvis forstoppelse
- tarmtømning ved operation og kikkertundersøgelse af endetarm og tarm, fødsel og radiologiske undersøgelser.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 7 dage.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Fleet Klar-til-brug

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Brug ikke Fleet Klar-til-brug

- hvis du er allergisk over for natriumdihydrogenphosphatdihydrat, dinatriumphosphatdodecahydrat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Fleet Klar-til-brug (angivet i afsnit 6).
- hvis du har forstoppelse eller ophør af normal tarmbevægelse.
- hvis du har blokering af den nedre tyktarm (Hirschsprungs sygdom).
- hvis du har stor tyktarm (også kendt som megakolon).
- hvis du har forsnævring eller ufuldstændig åbning af anus eller endetarm.
- hvis du har mekanisk tarmslyng (blokering af tarmen) eller paralytisk tarmslyng (manglende tarmfunktion).
- hvis du har dårligt hjerte med åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile, hoste, trykken for brystet, hurtig puls, hævede ben (hjerteinsufficiens).
- hvis du har nyreproblemer.
- til børn under 4 år.
- hvis du føler dig tørstig, svag, har øget puls, er svimmel eller besvimer pga. væskemangel og udtørring.
- hvis du har fået at vide af din læge, at du kan have:
 - blindtarmsbetændelse.
 - perforeret/beskadiget eller blokeret tarm.
 - aktiv inflammatorisk tarmsygdom (såsom Crohns sygdom eller colitis ulcerosa).

- hvis du har udiagnostiserede blødninger i endetarmen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Fleet Klar-til-brug, hvis du

- er ældre eller svagelig.
- har ukontrolleret blodtryk.
- lider af en hjerte- eller nyresygdom.
- lider af ascites (ophobning af væske i bughulen).
- lider af rektal ulceration (indre sår i endetarmen) eller fissurer (rifter i endetarmen).
- lider af elektrolytforstyrrelser (forandringer i kroppens saltkoncentrationer så som lavt calcium-, lavt kalium-, højt fosfat- eller højt natriumniveau).
- har kolostomi.
- har kvalme, kaster op eller har ondt i maven, med mindre det er foreskrevet af lægen.

Kontakt venligst din læge, selv hvis et eller flere af disse forhold hører fortiden til. Du kan have brug for at blive tilset mere grundigt.

Du bør ikke bruge afføringsmidler dagligt i en længere periode. Tal med din læge, så årsagen til forstoppelsen kan blive undersøgt.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Fleet Klar-til-brug. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Fleet Klar-til-brug

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin

- der ændrer hjerterytmen (forlænger QT-intervallet som f.eks. amiodaron, arsenitrioxid, astemizol, azithromycin, erythromycin, claritromycin, chlorpromazin, cisaprid, citalopram, domperidon, terfenadin, procainamid).
- til mentale lidelser (lithium).
- der kan gøre dig dehydreret eller ændre din krops saltniveau (kalium, calcium, natrium, fosfat eller vand), hvilket også kaldes for elektrolytbalancen.
- til at tømme tarmen (natriumfosfat).
- til at tømme blæren (diuretika).
- til behandling af højt blodtryk (hypertension) eller angina (kalkkanal-blokkere).
- som NSAID-produkter (ikke-steroid anti-inflammatorisk medicin) som f.eks. acetylsalicylsyre eller ibuprofen.
- der kan medføre hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Fleet Klar-til-brug efter aftale med lægen.

Amning

Fleet Klar-til-brug går over i modermælken, så det anbefales at der malkes ud og at mælken kasseres i mindst 24 timer efter brug af Fleet Klar-til-brug. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fleet Klar-til-brug påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Fleet Klar-til-brug indeholder benzalkoniumchlorid

Fleet Klar-til-brug indeholder benzalkoniumchlorid, som er lokalirriterende og kan give hudreaktioner.

3. Sådan skal du bruge Fleet Klar-til-brug

Brug altid Fleet Klar-til-brug nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens, apotekspersonalets eller sundhedspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Den anbefalede dosis er

Voksne, ældre og unge over 15 år

Den anbefalede dosis er ét lavement (118 ml indgivet dosis) højst 1 gang om dagen eller efter aftale med lægen.

Børn og unge 4-15 år

Efter aftale med lægen.

Børn under 4 år

Du må ikke bruge Fleet Klar-til-brug til børn under 4 år.

Med mindre det er aftalt med din læge, bør du ikke bruge Fleet Klar-til-brug i længere tid end en uge. Tager du mere end ét lavement indenfor en periode på 24 timer, kan det være skadeligt.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brugsanvisning

1. Lig på venstre side med begge knæ bøjet og armene i ro foran dig. (se Fig. 1).

Fig. 1



2. Fjern den orange beskyttelseshætte. Hold imod på det rillede låg og træk forsigtigt hættens af mens flasken holdes opad. (se Fig. 2).




Fig. 2

3. Før med en rolig bevægelse forsigtigt lavementets spids (Comfortip) ind i endetarmen med spidsen i retning mod navlen.
4. Klem flasken sammen indtil næsten al væsken er trykket ud.

Stop hvis du mærker modstand. Der kan ske skade, hvis du tvinger væsken ind.

Bemærk: Det er ikke nødvendigt at tømme flasken helt. Den indeholder mere væske end der er behov for, og en lille mængde vil altid være tilbage i flasken.

5. Fjern forsigtigt rektalspidsen fra endetarmen. Det er normalt at der spildes en lille smule væske fra lavementet.
6. Bliv liggende i samme stilling (Fig. 1) indtil trangten til afføring er stærk – normalt indenfor 2-5 minutter.
7. Put den brugte flaske tilbage i kartonen for bortskaffelse.

Hvis det bløder fra endetarmen, skal lavementet afbrydes med det samme og der skal øjeblikkeligt tages kontakt til læge.

Du skal forvente at kunne mærke tarmene arbejde indenfor 5 minutter efter at du har taget en dosis af Fleet Klar-til-brug. Dette er helt normalt og et tegn på at lægemidlet virker. **Hvis tarmene ikke reagerer indenfor dette tidsrum, skal du kontakte din læge.** Brug ikke yderligere Fleet Klar-til-brug medmindre det sker efter aftale med lægen. Hold dig i nærheden af et toilet indtil virkningen er aftaget.

Drik rigeligt med væske for at undgå dehydrering: fx vand, klar suppe, urtete, sort te, sort kaffe eller sommerdrik/frugtjuice uden frugtkød (men ikke juice med rød eller lilla farve).

Som hovedregel skal du drikke 250 ml i timen (svarende til et normalt vandglas) indtil effekten af Fleet Klar-til-brug er aftaget. Herefter bør du når du er tørstig drikke klare væsker, helst vand, indtil endt behandling eller som du i øvrigt aftaler med din læge.

Hvis du har brugt for meget Fleet Klar-til-brug

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Fleet Klar-til-brug, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering:

- for højt fosfat i blodet, for lavt kalk i blodet, for højt natrium i blodet, dehydrering, for lavt kalium i blodet, lav blodmængde, for meget syre i blodet eller stivkrampe. Disse symptomer kan forekomme ved overdosering eller tilbageholdelse i tarmen.

Der er forekommet dødsfald ved overdosering, tilbageholdelse i tarmen eller anvendelse til børn eller til patienter med tarmslyng.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Overfølsomhed, f.eks. nældefeber.
- Blister, kløe, stikken.
- Tørst, almen svaghed, øget puls, svimmelhed, besvimelse pga. væskemangel og udtørring. Udtalt dehydrering er en alvorlig bivirkning. Kontakt lægen.
- Hjerterpavirkning med lavt blodtryk og tendens til besvimelse, forkalkninger i hud og underhud samt langs randen af hornhinden pga. for højt fosfat i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Kramper i hænderne, prikken i hænder og fødder og muskelsvaghed pga. for lavt kalk i blodet. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
- Tørst pga. for højt natrium i blodet. For højet natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med kramper, bevidstløshed og koma. Tal med lægen.
- Kvalme, opkastning, mavesmerter, udspilet mave, diarré, smerter i tarmsystemet, analt ubehag, smerter i endetarmen.
- Irritation, smerter, stikken og isninger i og omkring endetarmsåbningen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Fleet Klar-til-brug utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 25 °C. Må ikke opbevares koldt.

Brug ikke Fleet Klar-til-brug efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Fleet Klar-til-brug indeholder:

- Aktive stoffer: En dosis på 118 ml indgiver hvad der svarer til 21,4 g natriumdihydrogenphosphatdihydrat (18,1 % w/V) og 9,4 g dinatriumphosphatdodecahydrat (8,0 % w/V).
- Øvrige indholdsstoffer: Dinatriumedetat, benzalkoniumchlorid og rensat vand. Smøremiddel til rektalspidsen er hvid blød paraffin.

Fleet Klar-til-brug indeholder 4,4 g natrium pr 118 ml indgivet dosis

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Klar opløsning uden farve, lugt, udfældninger eller uklarer.

Pakningsstørrelser

Fleet Klar-til-brug fås i en pakningsstørrelse á 133 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2016.