

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på [www.indlaegsseddel.dk](http://www.indlaegsseddel.dk).

## Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ikorel
3. Sådan skal du tage Ikorel
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

### 1. Virkning og anvendelse

Ikorel indeholder det aktive indholdsstof "nicorandil". Det tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes "kaliumkanal-aktivatorer". Ikorel anvendes til at forebygge eller nedsætte de smertefulde symptomer ("angina pectoris") på din hjertesygdom. Det anvendes til voksne, som ikke kan tage hjertemedicin som "betablokkere" eller "calciumantagonister".

Ikorel virker ved at øge blodgennemstrømningen i hjertets blodkar. Dermed forbedres blodtilførslen og iltforsyningen til hjertemusklen og belastningen på hjertet mindskes.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

### 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Ikorel

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

#### Tag ikke Ikorel, hvis:

- du er allergisk over for nicorandil eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ikorel (angivet i afsnit 6)
- du har alvorligt lavt blodtryk ("hypotension")
- du har problemer med hjertet, f.eks. kardiogent shock, venstresidigt hjertesvigt med lavt fyldningsstryk eller hjertesvigt
- du tager lægemidler til behandling af impotens (som f.eks. sildenafil, tadalafil eller vardenafil) eller lægemidler til behandling af "forhøjet blodtryk" i lungerne (som f.eks. riociguat). Dette kan påvirke dit blodtryk, hvis disse lægemidler tages sammen med Ikorel
- du har lavt blodvolumen
- du har væske i lungerne ("lungeødem").

Tag ikke Ikorel, hvis noget af dette gælder for dig. Hvis du er i tvivl, så kontakt din læge eller apotekspersonalet, før du tager Ikorel.

#### Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ikorel.

Tal straks med din læge, hvis du oplever nogen af følgende alvorlige bivirkninger under behandlingen:

- røde, kløende, hævede eller rindende øjne
- sår i munden, maven, tarmen (tyktarmen og tyndtarmen) eller endetarmsåbningen. Disse kan forårsage blod i afføringen eller opkast, en fistel (unormal rør-lignende passage fra et hulrum i kroppen til et andet eller til huden), et hul, bylder eller vægttab. Sår kan også udvikle sig på huden, kønsorganer og i næsen eller omkring en stomi (en kunstig åbning til fjernelse af afføring, såsom en kolostomi eller ileostomi). Disse er mere tilbøjelige til at opstå, hvis du har et problem med din tyktarm ("divertikelsygdom").
- Tal med din læge, før du tager lægemidler mod betændelse (kortikosteroider) eller non-steroid antiinflammatoriske lægemidler, inklusive acetylsalicylsyre, sammen med Ikorel. Hvis disse tages sammen, kan du være mere tilbøjelig til at få mavesår eller de andre problemer, der er nævnt ovenfor.

Disse bivirkninger kan opstå i begyndelsen af behandlingen eller senere i behandlingsforløbet. Tal straks med din læge, hvis du oplever nogen af de ovenstående symptomer. Se en fuldstændig liste over alle bivirkninger i afsnit 4.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, inden du begynder at tage Ikorel, hvis:

- du har lavt blodtryk
  - du har et lavt indhold af kalium i blodet, og tager kaliumtilskud
  - du har nedsat nyrefunktion, eller hvis du tager andre lægemidler, der kan øge indholdet af kalium i kroppen
  - du har problemer med hjertet som f.eks. hjertesvigt
  - du har en genetisk sygdom, der kaldes "glucose-6-fosfatdehydrogenase-mangel"
- Hvis noget af ovenstående gælder for dig (eller du er i tvivl), skal du tale med din læge eller apotekspersonalet, før du tager Ikorel.

#### Børn

Ikorel må ikke anvendes til børn.

#### Brug af andre lægemidler sammen med Ikorel

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Dette skyldes, at Ikorel kan påvirke virkningen af nogle typer lægemidler. Nogle typer lægemidler kan også påvirke virkningen af Ikorel.

#### Tag ikke Ikorel og tal med lægen, hvis du tager et eller flere af følgende:

- lægemidler mod rejsningsproblemer som f.eks. sildenafil, tadalafil eller vardenafil
- lægemidler til behandling af "forhøjet blodtryk" i lungerne som f.eks. riociguat.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, må du ikke tage dette lægemiddel. Tal med din læge eller apotekspersonalet.

Fortæl det til lægen, før du tager Ikorel, hvis du tager en eller flere af følgende typer lægemidler:

- lægemidler mod forhøjet blodtryk
- lægemidler, der udvider blodkarrene
- lægemidler, der øger indholdet af kalium i blodet
- dapoxetin, lægemiddel til behandling af for tidlig sædafgang
- lægemidler mod betændelsestilstande (kortikosteroider, non-steroid antiinflammatoriske lægemidler såsom ibuprofen). Hvis disse tages sammen med Ikorel, kan du være mere tilbøjelig til at få sår
- lægemidler mod depression
- acetylsalicylsyre.

Fortæl det til din læge, før du tager Ikorel, hvis du tager et eller flere af ovenstående lægemidler.

#### Brug af Ikorel sammen med alkohol

Nicorandil kan sænke dit blodtryk. Hvis du drikker alkohol, mens du tager Ikorel, kan dit blodtryk blive endnu lavere.

#### Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Du må ikke tage dette lægemiddel, hvis du er gravid.

Man ved ikke, om nicorandil udskilles i din brystmælk. Du må ikke amme, mens du tager dette lægemiddel.

#### Trafik- og arbejdssikkerhed

Ikorel kan gøre dig svimmel eller give dig en svaghedsfølelse. Hvis du oplever dette, må du ikke køre bil, anvende værktøj eller betjene maskiner.

#### Ikorel indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

### 3. Sådan skal du tage Ikorel

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Vær opmærksom på, at ikke alle anførte doseringsmuligheder kan følges med dette præparat.

#### Den sædvanlige dosis er

- Den sædvanlige startdosis er 10 mg to gange dagligt.
- Hvis du får hovedpine, kan lægen udskrive en lavere dosis på 5 mg to gange dagligt til de første 2 til 7 dage.
- Din læge vil muligvis øge din dosis til 40 mg to gange dagligt. Dette vil afhænge af dit behov, hvordan du reagerer på behandlingen, og hvor godt du tåler behandlingen.

#### Sådan tages dette lægemiddel:

- Tabletterne skal synkes hele morgen og aften med lidt væske
- Tabletterne kan tages med eller uden mad.
- Du må ikke tage tabletten ud af blisterpakningen, før du skal tage den.
- Delekærven på 20 mg tabletten er kun beregnet til, at du kan dele tabletten, hvis du har svært ved at sluge den hel.

En større kapsel svarende til et "tørremiddel" er tydeligt markeret i den ene ende af hvert blisterkort. Det skal beskytte Ikorel mod fugt. Du må ikke sluge denne tørrekapsel. Hvis du ved et uheld kommer til at sluge en tørrekapsel, skal du kontakte din læge straks. Det bør ikke skade dig.

#### Hvis du har taget for mange Ikorel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ikorel, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har taget for mange Ikorel, eller hvis et barn har slugt en eller flere tabletter, skal du straks søge lægehjælp eller tage til nærmeste skadestue. Tag emballagen med. Du kan blive svimmel eller få svaghedsfølelse - symptomer på nedsat blodtryk. Du kan muligvis også mærke, at hjertet banker uregelmæssigt og hurtigere.

#### Hvis du har glemt at tage Ikorel

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du tage den, så snart du kommer i tanke om det. Men hvis det snart er tid til den næste dosis, skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

#### Hvis du holder op med at tage Ikorel

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

### 4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

#### Alvorlige bivirkninger

Tal straks med lægen, hvis du får en eller flere af følgende alvorlige bivirkninger:

- røde, kløende, hævede eller rindende øjne, inklusive problemer med en del af øjet kaldet "hornhinden" (meget sjældent, kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)
- sår i munden, i maven, tarmene (tyktarmen og tyndtarmen) eller endetarmen (sjældent, kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer).

Dette kan give blod i afføringen eller opkast, en fistel (unormal rør-lignende passage fra et hulrum i kroppen til et andet eller til huden), et hul, bylder eller vægttab. Der kan også opstå sår på huden, ved kønsorganer og i næsen eller ved en stomi (en kunstig åbning til fjernelse af afføring såsom en kolostomi eller ileostomi). Disse er mere tilbøjelige til at opstå, hvis du har et problem med din tyktarm ("divertikelsygdom").

Disse bivirkninger kan opstå i begyndelsen af behandlingen eller senere i behandlingsforløbet. Tal straks med din læge, hvis du oplever nogen af de ovenstående symptomer.

#### Andre bivirkninger

Fortæl det til din læge eller apotekspersonalet, hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

- hovedpine – dette forekommer især i de første par dage af behandlingen. Din læge vil muligvis starte din behandling med en lav dosis og øge den gradvist for at nedsætte risikoen for hovedpine.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

- svimmelhed
- hudrødme
- kvalme
- opkastning
- svaghedsfølelse
- meget hurtige, uregelmæssige eller kraftige hjerteslag (hjerteranken).

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

- nedsat blodtryk.

Sjældent (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

- udslet
- kløe
- ømme muskler, som ikke skyldes fysisk aktivitet (myalgi).

Meget sjældent (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

- mavesmerter
- højt indhold af kalium i blodet
- gulfarvning af huden og øjnene, lys afføring, mørkfarvet urin – dette kan være tegn på leverproblemer
- øjenbetændelse
- hævelse af ansigt, læber, mund, tunge, svælg eller hals, som kan give synkebesvær eller vejrtrækningsbesvær.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

- dobbeltsyn.

#### Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: [www.meldenbivirkning.dk](http://www.meldenbivirkning.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

### 5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod fugt.

Efter åbning skal hvert blisterkort anvendes inden for 30 dage ved ovenstående opbevaringsbetingelser.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

### 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

#### Ikorel indeholder:

- Aktivt stof: nicorandil. 1 tablet indeholder 20 mg nicorandil.
- Øvrige indholdsstoffer: majsstivelse, croscarmelloseatrium, stearinsyre og mannitol.

#### Udseende og pakningsstørrelser

Ikorel tabletter 20 mg er hvide, runde tabletter med facetteret kant, delekærv på den ene side, og mærket IK 20 på den anden side. Delekærven er kun beregnet til at dele tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.

En større kapsel svarende til et "tørremiddel" er tydeligt markeret i den ene ende af hvert blisterkort.

Det skal beskytte Ikorel mod fugt. Tørrekapslen må ikke sluges.

Pakningsstørrelser: 60 tabletter.

#### Indehaver af markedsføringstilladelsen:

2care4  
Stenhuggervej 12  
6710 Esbjerg V

#### Fremstiller:

2care4  
Stenhuggervej 12-14  
6710 Esbjerg V

Ikorel® er et registreret varemærke, der tilhører Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha.

Ikorel svarer til Angicor.

**Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2024.**