

Indlægsseddel: Information til brugeren

Beconase™ 50 mikrogram/dosis

næsespray, suspension

Beclometasondipropionat

03-2015
P106128-6

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Beconase™
3. Sådan skal du bruge Beconase™
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Beconase™ er et forebyggende middel til behandling af høfeber og helårssnue. Det virker ved at øge slimhindens modstandskraft over for allergener (f.eks. pollen, husstøvmider, svampesporer) og ved at hæmme den allergiske reaktion i næsen (kløe, tilstoppet eller løbende næse).

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Beconase™

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Beconase™,

- hvis du er allergisk over for beclometasondipropionat eller et af de øvrige indholdsstoffer i Beconase™ (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Beconase™

Vær opmærksom på følgende

- Tal med lægen, hvis du har betændelse i næsen. Den kan behandles samtidig med, at du bruger Beconase™ næsespray.
- Hvis du har sår, nylig skade eller er opereret i næsen, skal du rådføre dig med lægen, før du bruger Beconase™ næsespray.
- Hvis du får tabletbehandling med binyrebarkhormon, må du ikke skifte til Beconase™ næsespray uden at tale med lægen.
- Hvis Beconase™ næsespray bruges i en længere periode, skal man være opmærksom på bivirkninger, som nedsat binyrebarkhormonproduktion, væksthæmning hos børn og unge, Cushings syndrom og cushingoide træk som rødte, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine p.g.a. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken, nedsat knogletæthed, grå stær (uklart syn) og hovedpine, kvalme, synsnedsettelse og regnbuesyn p.g.a. forhøjet tryk i øjet (grøn stær).
- Derudover kan der især hos børn ses psykiske og adfældsrelaterede bivirkninger som uro, rastløshed, søvnforstyrrelser, angst, depression og aggressivitet.

- Ved meget høj udsættelse for sæsonallergener, kan supplerende behandling, især for øjetsymptomer, være nødvendig.

Brug af anden medicin sammen med Beconase™

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Anden medicin kan påvirke behandling med Beconase™. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Beconase™. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Beconase™ efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Beconase™ påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Beconase™ indeholder benzalkoniumklorid

Beconase™ indeholder benzalkoniumklorid, som kan give åndedrætsbesvær og virke hudirriterende og medføre hudreaktioner.

3. Sådan skal du bruge Beconase™

Brug altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Omrystes før brug.

Den sædvanlige dosis er Voksne

2 pust (100 mikrogram) i hvert næsebor 2 gange daglig.

Du må ikke bruge mere end 8 pust (400 mikrogram) daglig.

Skal bruges hver dag for at opnå maksimal virkning.


Virkingen indtræder inden for 12-24 timer - efter nogle ganges anvendelse - og fuld effekt efter 3-4 dage.

Bør ikke anvendes i mere end 3 måneder uden lægens anvisning.

Brug til børn og unge


Børn og unge under 18 år må kun få Beconase™ næsespray efter lægens anvisning.

Brugsanvisning



1. Tag den klare beskyttelseshætte af og **ryst flasken**. Hold flasken lodret som vist på tegningen.

Første gang du skal bruge sprayen, eller hvis den har stået ubrugt i nogen tid: Pres pumpen ned et par gange ved tryk på den hvide krave, indtil der kommer forstøvet væske ud.



2. Puds næsen forsigtigt. Bøj hovedet let over. Hold flasken lodret og før studsens ind i det ene næsebor. Luk det andet med et let tryk med en finger. Tryk pumpen ned én gang og træk **samtidigt** vejret igennem næsen – ikke så kraftigt, at medicin kan smages. Ånd ud gennem munden. Tag 1 pust i hver indånding. Gentag behandlingen i det andet næsebor. Tør næsestudsens af og sæt **aldrig** beskyttelseshætten på igen.

Rengøring

Fjern beskyttelseshætten og træk den hvide krave forsigtigt af. Vask begge dele under den kolde hane. Lad dem tørre og sæt dem sammen igen. Hvis næsestudsens bliver tilstoppet, fjernes beskyttelseshætten, og pumpedelen skrues af og lægges i blød i håndvarmt vand. Lad den tørre og skru den på flasken igen. Stik **aldrig** i næsestudsens med spidse genstande. Kontakt eventuelt apoteket.

Hvis du har brugt for meget Beconase™ næsespray

Det er vigtigt, at du tager den dosis, der står på etiketten fra apoteket, eller som aftalt med din læge. Du bør kun tage så meget som din læge har anbefalet; tager du mere eller mindre kan dine symptomer blive værre. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Beconase™, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Beconase™

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Beconase™

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvortige bivirkninger

- Sjældne bivirkninger:** Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.
- Hovedpine, kvalme, synsnedsettelse og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.
 - Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Pludseligt hudslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

- Vejtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hul i næseskillevæggen. Kontakt lægen.
- Rødt, rundt "måneansigt", tørst p.g.a. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Tal med lægen.

Ikke alvortige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Ubehagelig smag og lugt.
- Tørhed og irritation i næse og svælg.
- Næseblod

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Udslæt, nældefeber, kløe, rødme i huden.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Nedsat vækst hos børn og unge.
- Uro og rastløshed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Beconase™ utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Beconase™ ved almindelig temperatur. Beconase™ næsespray må kun anvendes 3 måneder efter anbrud. Brug ikke Beconase™ efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i den nævnte måned. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Beconase™ indeholder:

Aktivt stof: Beclometasondipropionatmonohydrat svarende til beclometasondipropionat 50 mikrogram. Øvrige indholdsstoffer: Vandfri glukose, carboxymethylcellulosenatrium, mikrokrystallinsk cellulose, 20 mikrogram benzalkoniumchlorid, polysorbit 80, 250 mikrogram phenylethylalkohol og rensat vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Beconase™ næsespray er en suspension (oplæmning), som skal rystes før brug.

Pakningsstørrelser

Beconase™ fås i pakningsstørrelse á 200 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Zcare4
Tømmervej 9
6710 Esbjerg V

Ompakket og frigivet af

Zcare4
Tømmervej 9
6710 Esbjerg V

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2015