

12-2012
P114919-4

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Desmopressin 2care4 0,1 mg/ml, næsespray, opløsning

Desmopressinacetat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Desmopressin 2care4 til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.
Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Desmopressin 2care4
3. Sådan skal du tage Desmopressin 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Desmopressin virker som det naturlige hormon ADH (antidiuretisk hormon).
Det påvirker nyrernes evne til at udskille vand.

Hvis du lider af sygdommen diabetes insipidus, mangler du dette hormon, og du udskiller øgede og ofte meget store mængder urin. Du kan tage Desmopressin 2care4 for at afhjælpe dette.

Du kan også tage Desmopressin 2care4, hvis du skal have undersøgt nyrernes evne til at koncentrere urinen.

Lægen kan have givet dig Desmopressin 2care4 for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DESMOPRESSIN 2CARE4

Tag ikke Desmopressin 2care4, hvis

- du har unormalt stor tørst, som skyldes vane eller psykiske problemer.
- du har svangerskabsforgiftning.
- du er overfølsom over for desmopressin eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- du har dårligt hjerte eller andre tilstande der kræver behandling med vand-drivende medicin (diuretika).
- du har moderat eller alvorligt nedsat nyrefunktion.
- du har for lavt natriumindhold i blodet.
- du har ureguleret dannelse af antidiuretisk hormon (ADH).

Vær ekstra forsigtig med at tage Desmopressin 2care4

- Tal med lægen, inden du tager Desmopressin 2care4, hvis du
- har en hjertesygdom, forhøjet blodtryk eller har fået lavet en by-pass operation.
 - får vanddrivende medicin.
 - har nedsat lever- eller nyrefunktion.
 - har forstyrrelser i væske- eller saltbalancen. Det kan du f.eks. have, hvis du ofte kaster op, har diaré eller diabetes (sukkersyge). Risikoen er forøget hos meget unge eller ældre patienter.
 - har cystisk fibrose (arvelig sygdom med meget sejt slim i lungerne).

Hvis du skal føde, skal du fortælle lægen eller jordemoderen, at du får Desmopressin 2care4.

Ældre kan have øget risiko for at få for lavt natrium i blodet.

Det er vigtigt, at du jævnligt kontrollerer din vægt, da vægtstigning kan afsløre, at du får for meget Desmopressin 2care4, eller at du drikker for meget.

Når du begynder behandling med Desmopressin 2care4, er det vigtigt, at du samtidig nedsætter den væskemængde, du drikker, da der ellers kan ske ophobning af væske i kroppen. Symptomer på for meget væske i kroppen er hovedpine, kvalme, hævede hænder og fødder samt vægtøgning. I alvorlige tilfælde kan du få kramper og blive bevidstløs.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager

- medicin mod gigt (indometacin, NSAID).
- medicin mod psykoser (chlorpromazin).
- medicin mod epilepsi (carbamazepin).
- medicin mod depression (tricykliske antidepressiva f.eks. amitriptylin, nortriptylin, SSRI).
- medicin mod manio-depressiv sygdom (skiftende perioder med opstemthed/overaktivitet og nedsat sindsstemning) (lithium).
- medicin mod diabetes (sukkersyge) (glibenclamid).
- medicin mod for lavt eller for højt blodtryk.

Brug af Desmopressin 2care4 sammen med mad og drikke

Du kan tage Desmopressin 2care4 i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Desmopressin 2care4 efter aftale med lægen.

Amning

Desmopressin 2care4 går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Desmopressin 2care4 påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE DESMOPRESSIN 2CARE4

Tag altid Desmopressin 2care4 nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Diabetes insipidus

Voksne

1-2 pust 1-2 gange daglig. Hvis du skal tage 2 pust, skal du tage 1 pust i hvert næsebor.

Børn og unge

1 pust 1-2 gange daglig. 1 pust indeholder 10 mikrogram desmopressinacetat. Nogle børn skal kun have 5 mikrogram, og så kan du ikke bruge Desmopressin 2care4.

Undersøgelse af nyrernes koncentrationsevne

Hvis du skal bruge Desmopressin 2care4 til en undersøgelse af dine nyrer, er det vigtigt, at du nøje følger den vejledning, du har fået af lægen.

Ældre

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion


Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Instruktion vedrørende håndtering og indtagelsesmåde

- Inden du bruger Desmopressin 2care4 næsespray første gang, skal du fylde pumpen ved at trykke den ned ca. 4 gange, eller indtil der kommer en ensartet sky. Du skal gøre det samme, hvis du ikke har brugt næsesprayeren i en uge.
- For at opnå en ensartet dosering er det vigtigt, at plastslangen i flasken er nede i væsken, som vist på figur 2.

Brugervejledning

- Puds næsen og fjern beskyttelseshætten (figur 1).
- Hold sprayflasken som vist på figur 3.
- Læn hovedet en smule tilbage. Før spidsen op i næseboret. Træk vejret svagt ind under pustet (figur 4).
- Sæt beskyttelseshætten på efter brug. Opbevar sprayflasken stående.



Hvis du har taget for meget Desmopressin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Desmopressin 2care4, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

Overdosering med Desmopressin 2care4 kan give vægtstigning, hovedpine, kvalme, mavekrampe og i svære tilfælde krampe og bevidstløshed.

Hvis du har glemt at tage Desmopressin 2care4

Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosering.

Hvis du holder op med at tage Desmopressin 2care4

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe behandlingen med Desmopressin 2care4.

Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Desmopressin 2care4 er stoppet.

4. BIVIRKNINGER

Desmopressin 2care4 kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Voldsom hovedpine, kvalme, opkastning, krampe samt synsforstyrrelser pga. ophobning af væske i hjernen. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Hvis du tager Desmopressin 2care4 uden samtidig at begrænse din væskeindtagelse, kan du få ophobning af vand i kroppen og for lavt indhold af salt (natrium) i blodet. Du får stigende vægt, hovedpine og kvalme og i svære tilfælde krampe, ophobning af væske i hjernen samt dyb bevidstløshed (koma).

Hvis du har blødersygdommen von Willebrandts sygdom (type I), er der risiko for, at Desmopressin 2care4 påvirker dit blod. Kontakt læge eller skadestue, hvis du får blødning fra hud og slimhinder og blå mærker.

Hvis du har en hjertesygdom, er der risiko for, at du kan få smerter i brystet evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter.

- Mavesmerter og kvalme.
- Tilstoppet næse, snue, næseblod.
- Svimmelhed, hovedpine, træthed.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter.

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Vrangforestillinger, ophidselse, adfærdssændringer. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Forhøjet blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.
- Rødme af huden.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter.

- Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkrampe og koma. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail, med almindeligt brev eller telefonisk for at rekvirere et indberetningsskema.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Desmopressin 2care4 ved temperaturer over 25 °C.

Tag ikke Desmopressin 2care4 efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Du kan bruge Desmopressin 2care4 i 50 dage efter, du har åbnet næsesprayen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Desmopressin 2care4 0,1 mg/mL, næsespray indeholder:

Aktivt stof: Desmopressinacetat. 1 dosis indeholder 10 mikrogram.

Øvrige indholdsstoffer: Natriumchlorid, kaliumsorbat (E 202), saltsyre og rensat vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Desmopressin 2care4 er en klar, farveløs væske.

Pakningsstørrelser

1 x 5 mL (ca. 50 doser) og 3 x 5 mL (ca. 150 doser).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret december 2012