

INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Femelle® 150/30 mikrogram, filmovertrukne tabletter

desogestrel/ethinylestradiol

02-2012
P086480-3

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Femelle® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

- Virkning og anvendelse
- Det skal du vide, før du begynder at tage Femelle®
- Sådan skal du tage Femelle®
- Bivirkninger
- Opbevaring
- Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Femelle® anvendes til at forhindre uønsket graviditet. Femelle® er en p-pille, som indeholder to forskellige kvindelige hormoner, desogestrel (et gestagen) og ethinylestradiol (et østrogen). Femelle® betegnes som en lavdosis p-pille pga. det lave indhold af hormoner. Eftersom alle tabletter indeholder de samme hormoner i samme dosis, er Femelle® en monofasisk p-pille af kombinationstypen. P-piller er en meget sikker metode mod graviditet. Risikoen for at blive gravid er minimal, når man tager p-pillerne korrekt, dvs. uden at glemme nogen p-piller.

Lægen kan have givet dig Femelle® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FEMELLE®

Anvend ikke p-piller af kombinationstypen, hvis du tilhører en af nedenstående risikogrupper. Hvis du tilhører en af disse, bør du tale med din læge, før du begynder at anvende Femelle®. Din læge råder dig måske til at anvende en anden type p-piller eller en helt anden type svangerskabsforebyggelse (uden hormoner).

Tag ikke Femelle®:

- Hvis du er overfølsom over for ethinylestradiol, desogestrel eller et af de øvrige indholdsstoffer i Femelle® (se ”Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Femelle®”).
- Hvis du har eller har haft blodprop i arme, ben, lunge, hjerte eller hjerne.
- Hvis du har eller har haft tegn på en blodprop (såsom hjertekramper eller brystsmerte) eller på et slagtilfælde (såsom nedsat gennemblødning af hele eller dele af hjernen).
- Hvis du tidligere har haft migræne ledsaget af f.eks. synsforstyrrelser, talebesvær, svaghed eller følelsesløshed i dele af kroppen.
- Hvis du har en arvelig eller anden kendt risiko for blodpropper (se ”Vær ekstra forsigtig med at tage Femelle®” og ”P-piller og blodpropper”).
- Hvis du har sukkersyge med skader på blodkarrene.
- Hvis du har alvorligt forhøjet blodtryk.
- Hvis du har eller har haft betændelse i bugspytkirtlen med for meget fedt i blodet.
- Hvis du har eller har haft svulster (godartet eller ondartet) i leveren eller leversygdom med fortsat nedsat leverfunktion.
- Hvis du har eller har mistanke om kræft, der er påvirkelig af kønshormoner (f.eks. i brystet eller livmoderen).
- Hvis du har uforklarlige blødninger fra skeden.

Hvis du får en af ovenstående sygdomme, mens du bruger p-piller, skal du straks stoppe med p-pillerne og kontakte din læge. I mellemtiden bør du bruge en anden svangerskabsforebyggelse (uden hormoner).

Vær ekstra forsigtig med at tage Femelle®

Indlægssedlen omtaler de situationer, hvor du bør stoppe med at anvende p-piller, eller hvor sikkerheden ved p-piller kan være nedsat. I disse situationer bør du ikke have samleje, eller også bør du anvende en anden form for svangerskabsforebyggelse (uden hormoner), f.eks. kondom eller anden form for barrieremetode. Anvend ikke ”sikre perioder” eller ”temperatur”-metoden. Disse metoder er usikre, fordi p-pillen ændrer temperaturforløbet samt livmoderslimhinden i løbet af menstruationscyklen.

Ligesom alle andre p-piller beskytter Femelle® ikke mod HIV infektion (AIDS) eller andre seksuelt overførte sygdomme

Hvis du tilhører en af nedenstående risikogrupper og samtidig anvender p-piller af kombinationstypen, bør du muligvis kontrolleres jævnligt. Din læge kan forklare dig mere om dette.

Før du begynder med Femelle®, bør du derfor fortælle din læge om du:

- Ryger.
- Har sukkersyge.
- Er overvægtig.
- Har forhøjet blodtryk.
- Har en hjerte-klapfejl eller hjerterytmeforstyrrelse.
- Har årebetændelse (overfladisk flebitis).
- Har åreknuder.
- Har nogen i din nærmeste familie, som har haft blodpropper, hjertetilfælde eller slagtilfælde.
- Lider af migræne.
- Lider af epilepsi.
- Selv eller nogen i din nærmeste familie har eller har haft forhøjet indhold af kolesterol eller triglycerider (fedtstoffer) i blodet.
- Selv eller nogen i din nærmeste familie har/har haft brystcancer.
- Har en lever- eller galdeblæresygdom.
- Har Crohn’s sygdom eller ulcerøs tyktarmsbetændelse(kronisk tarmbetændelse).
- Har Systemisk Lupus Erythematosus (SLE - en sygdom som påvirker huden overalt på kroppen).
- Har Hæmolytisk Uræmisk Syndrom (HUS - en sygdom som påvirker blodets evne til at størkne, og som forårsager nyresvigt).
- Har seglcelleanæmi (arvelig form for blodmangel).
- Har en tilstand der opstod første gang eller blev forværret under graviditet eller tidligere brug af kønshormoner (f.eks. høretab, en stofskiftesygdom kaldet porfyri, en hudsygdom kaldet herpes gestationis, en neurologisk sygdom kaldet Sydenham’s chorea).
- Har eller har haft chloasma (gullig-brune, skjoldede farvninger på huden, især i ansigtet). I så fald skal du undgå at opholde dig for meget i solen eller udsætte dig for UV-stråling.

Hvis en eller flere af ovenstående tilstande konstateres for første gang, genopstår eller forværres under p-pillebrug, bør du kontakte din læge.

P-piller og blodpropper

En blodprop er dannelse af en klump størknet blod, som kan blokere et blodkar. Blodpropper kan undertiden dannes i de dybe vener i benene (dyb venetrombose).

Hvis en blodprop føres væk fra venerne, kan den sætte sig fast i lungearterierne og forårsage ”lungeemboli”. Dyb venetrombose er sjælden og kan opstå, uanset om du anvender p-piller eller ej. Dyb venetrombose kan også forekomme under graviditet. Risikoen for at udvikle dyb venetromboser er større for kvinder, som anvender p-piller, end for dem som ikke anvender p-piller, men risikoen er ikke så høj, som den er under graviditet.

Risikoen for at udvikle dyb venetrombose ved anvendelse af p-piller med desogestrel er muligvis en smule højere end ved anvendelse af p-piller med levonorgestrel. De absolutte tal er meget lave. Hvis 10.000 kvinder anvender en p-pille med levonorgestrel i 1 år, vil 2 kvinder udvikle en blodprop. Hvis 10.000 kvinder anvender en p-pille med desogestrel i 1 år, vil ca. 3-4 kvinder udvikle en blodprop. Til sammenligning: Hvis 10.000 kvinder bliver gravide, vil 6 af disse kvinder udvikle en blodprop. Disse tal er baseret på resultaterne fra bestemte studier. Andre studier finder ikke en øget risiko for p-piller indeholdende desogestrel. I meget sjældne tilfælde kan der dannes blodpropper i hjertets blodkar (medfører hjertetilfælde) eller hjernens blodkar (medfører slagtilfælde). Yderst sjældent kan der dannes blodpropper i lever, tarm, nyre eller øje. Yderst sjældent kan en blodprop forårsage alvorlig, uhelbredelig invaliditet eller i værste tilfælde døden. Risikoen for at få et hjertetilfælde eller slagtilfælde stiger med alderen. Risikoen øges også, hvis du ryger. **Når du anvender p-piller, anbefales det at du holder op med at ryge, specielt hvis du er over 35 år.**

Hvis du får forhøjet blodtryk under p-pillebrug, vil din læge muligvis anbefale dig at stoppe med at anvende p-piller. Ved operation eller immobilisation (f.eks. hvis du har et eller begge ben i gips eller benskinne) er risikoen for at udvikle dyb venetrombose forbigående øget. Ved anvendelse af p-piller kan risikoen stige yderligere. Fortæl derfor din læge i god tid før en hospitalsindlæggelse eller operation, at du anvender p-piller. Lægen kan bede dig om at stoppe anvendelsen af p-piller flere uger før operation eller ved immobilisation. Din læge vil også oplyse dig om, hvornår du igen kan begynde at tage p-pillerne. Hvis du får mistanke om en blodprop bør du straks stoppe med at tage p-pillerne og kontakte din læge.

P-piller og kræft

Brystkræft forekommer lidt oftere hos p-pillebrugere end hos ikke-brugere på samme alder. Dette udligner sig dog gradvist over en 10-årig periode efter ophør med p-piller. Det vides ikke, om p-piller har nogen betydning i denne sammenhæng. Den hyppigere forekomst kan også skyldes, at p-pillebrugere undersøges oftere, hvorved brystcanceren konstateres tidligere. I sjældne tilfælde er der rapporteret om godartede leversvulster hos p-pillebrugere. Yderstsjældent ses ondartede leversvulster. Disse svulster (godartede og ondartede) kan medføre indre blødninger. Kontakt straks din læge, hvis du får stærke mavesmerter. Den væsentligste risikofaktor for livmoderhalskræft er vedvarende infektion med humant papillomatøst virus (HPV). Der er rapporteret en let forøget forekomst af livmoderhalskræft hos kvinder, der har brugt p-piller i lang tid. Dette skyldes ikke nødvendigvis p-pillerne, men kan måske forklares ved seksuel adfærd og andre faktorer.

Regelmæssige kontrolundersøgelser

Når du anvender p-piller, vil din læge bede dig om at komme til regelmæssige kontrolundersøgelser.

Kontakt din læge hurtigst muligt hvis:

- Du bemærker nogle forandringer i dit helbred, specielt i forbindelse med forhold beskrevet i denne indlægsseddel. Husk også de punkter som omhandler den nærmeste familie.
- Du mærker en knude i brystet.
- Du begynder at anvende anden medicin.
- Du skal immobiliseres (ben i gips eller benskinne) eller opereres (kontakt din læge mindst 4 uger i forvejen).
- Du har uforklarlige, kraftige blødninger fra skeden.
- Du glemmer 1 eller flere p-piller i den første uge af blisterpakningen og har haft samleje i de forudgående 7 dage.
- Du har kraftig diarré.
- Du ikke får din menstruation 2 gange i træk eller har mistanke om, at du er blevet gravid (begynd ikke på den næste blisterpakning, før du har talt med din læge).

Du skal stoppe med at tage p-pillerne og straks kontakte din læge, hvis du bemærker følgende tegn på blodpropper:

- En usædvanlig hoste.
- Stærke brystsmerte, som kan brede sig til venstre arm.
- Åndenød.
- Usædvanlig kraftig eller langvarig hovedpine eller migræneanfald.
- Delvist eller fuldstændigt tab af synet eller dobbeltsyn.
- Utydelig tale eller besvær med at tale.
- Pludselige forstyrrelser i høre-, lugte- eller smagssans.
- Svimmelhed eller besvimelsesanfald.
- Svaghed eller følelsesløshed i en eller flere dele af kroppen.
- Stærke mavesmerter.
- Stærke smerter eller hævelse af et af dine ben.

De situationer og symptomer, som er nævnt ovenfor, er beskrevet mere detaljeret andre steder i indlægssedlen.

Brug af anden medicin

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Femelle®, og Femelle® kan påvirke virkningen af andre lægemidler. Hvis du tager, forventer at tage eller for nylig har taget andre lægemidler, bør du fortælle din læge om dette.

Visse lægemidler kan nedsætte p-pillernes sikkerhed. Det drejer sig om:

- Epilepsimedicin (f.eks. primidon, phenytoin, barbiturater, carbamazepin, oxcarbazepin, topiramat, felbamat).
- Tuberkulosemedicin (f.eks. rifampicin, rifabutin)
- HIV-medicin (f.eks. ritonavir)
- Antibiotika (f.eks. penicillin, tetracyklin, griseofulvin) til behandling af visse infektionssygdomme.
- Produkter/naturmedicin, der indeholder prikbladet perikum (Hypericum perforatum), bør ikke tages sammen med p-piller.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl også de læger eller tandlæger (eller apoteket), som udskriver anden medicin til dig, at du tager Femelle®. De kan fortælle dig, om du har brug for at anvende yderligere former for prævention og i hvor lang tid.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Du må ikke tage Femelle®, hvis du er gravid eller tror, at du er gravid. Hvis du bliver gravid mens du anvender Femelle®, skal du kontakte sin læge med det samme.

Amning

Du må ikke tage Femelle®, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Femelle® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Femelle®

Femelle® indeholder lactosemonohydrat. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE FEMELLE®

Tag altid Femelle® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Hver Femelle® blisterpakning indeholder 21 tabletter. Tabletterne bør tages på ca. samme tidspunkt på døgnet. Indtag dem med et glas vand. Markér startdagen ved at gennembryde aluminiums-folien på ugedagsmarkeringen. På denne måde kan du let kontrollere, om du har taget den daglige pille. Følg pilenes retning på blisterpakningen, indtil alle 21 tabletter er taget. I løbet af de næste 7 dage tager du ingen tabletter. I løbet af disse 7 dage vil du sædvanligvis få din menstruation. Normalt starter menstruationen på 2. eller 3. dagen efter den sidste p-pille er taget. Du starter med en ny blisterpakke på den 8. dag - også selv om din menstruation fortsætter. Dette betyder, at du altid starter en ny blisterpakning på samme ugedag og får din menstruation med ca. 4 ugers mellemrum.

Sådan starter du på din første Femelle® blisterpakning

- Hvis du ikke har anvendt nogen hormonale svangerskabs-forebyggende midler indenfor den sidste måned: Den første p-pille tages på menstruationens første dag, dvs. 1. blødningsdag. Hvis din 1. blødningsdag f.eks. er en fredag, starter du med p-pillen mærket ”FRE”. Følg herefter ugedagene i pilenes retning. Ønsker du at starte på dine p-piller på menstruationens 2.-5. dag, skal du huske at beskytte dig ekstra mod graviditet (kondom eller anden form for barriere-metode) i de efterfølgende 7 dage.
- Ved skift fra et andet svangerskabsforebyggende middel af kombinationstypen (p-pille, p-ring, p-plaster): Du skal starte med Femelle® dagen efter, du har taget den sidste aktive tablet i din tidligere p-pillepakke - men dog senest på dagen efter den sædvanlige tablet frie periode eller efter perioden med placebotabletter. Du skal starte med Femelle® samme dag som p-ring eller p-plaster fjernes – men dog senest på dagen efter den sædvanlige ringfrie eller plasterfrie periode. Hvis du er i tvivl, så spørg din læge eller på apoteket.
- Ved skift fra rene gestagenpræparater (minipiller, injektion, implantat, intrauterint indlæg indeholdende gestagen): Du kan stoppe med minipillerne på en hvilken som helst dag og starte med Femelle® næste dag på samme tidspunkt (ved skift fra implantat eller intrauterint indlæg på den dag implantatet eller indlægget fjernes; ved skift fra injektion, når næste injektion skulle være givet). Men husk altid at beskytte dig ekstra mod graviditet (f.eks. kondom eller anden form for barrieremetode) i de første 7 dage, du tager p-pillerne.
- Efter fødsel: Lige efter fødslen vil din læge måske råde dig til at vente med at tage Femelle® til efter din første normale menstruation. Nogle gange kan du starte før. Spørg din læge. Ønsker du at anvende Femelle® mens du ammer, så spørg din læge til råds først.
- Efter abort: Din læge kan rådgive dig.

Hvis du har taget for mange Femelle®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Femelle®, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke set nogle tilfælde af alvorlige skadelige virkninger efter indtagelse af for mange Femelle® p-piller på én gang. Hvis du har taget for mange p-piller på én gang, kan du få kvalme, opkastninger eller blødninger fra skeden. Hvis du opdager, at et barn har taget Femelle®, spørg da en læge til råds.

Hvad gør du hvis ...

... du glemmer en eller flere p-piller?

- Hvis der er gået **mindre end 12 timer** siden, du skulle have taget din p-pille, er sikkerheden stadigvæk uændret. Tag p-pillen så snart du husker det. Tag de næste p-piller på det sædvanlige tidspunkt.
- Hvis der er gået **mere end 12 timer** siden, du skulle have taget din p-pille, er sikkerheden muligvis nedsat. Jo flere p-piller du har glemt, desto større er usikkerheden. Hvis de glemte p-piller hører til i 1. uge eller 3. uge af en blisterpakning, er risikoen for at blive gravid væsentlig forøget. Du bør derfor følge nedenstående anvisninger (se også skemaet).

Hvis mere end 1 p-pille er glemt

Spørg din læge til råds.

1 p-pille er glemt i uge 1

Tag den glemte p-pille, så snart du husker det, også selv om det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Tag de efterfølgende p-piller på det sædvanlige tidspunkt.

Beskyt dig ekstra mod graviditet (f.eks. kondom eller anden form for barriere-metode) i de efterfølgende 7 dage. Hvis du har haft samleje i ugen før du glemte p-pillen, kan du være blevet gravid. Kontakt derfor din læge.

1 p-pille er glemt i uge 2

Tag den glemte p-pille, så snart du husker det, også selv om det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Tag de næste p-piller på det sædvanlige tidspunkt. P-pillerne sikkerhed er uændret, og du behøver ikke at beskytte dig ekstra mod graviditet.

1 p-pille er glemt i uge 3

Du kan vælge mellem én af følgende muligheder uden at anvende yderligere form for svangerskabsforebyggelse.

- Tag den glemte p-pille, så snart du husker det, også selv om det betyder, at du skal tage 2 p-piller samtidig. Tag de næste p-piller på det sædvanlige tidspunkt. Start straks på næste blisterpakning **uden at holde pause mellem pakningerne**. Du får sandsynligvis ingen menstruation før efter den næste blisterpakning, men du kan få pletblødninger eller gennembrudsblødninger, mens du tager p-pillerne.
- Stop med at tage p-pillerne fra din nuværende blisterpakning. Hold en p-pille fri periode på 7 dage eller mindre **inkl. den dag, du glemte din p-pille**. Fortsæt herefter med den nye blisterpakning. Fordelen ved denne metode er, at du kan starte med den næste blisterpakning på samme ugedag, som du plejer.

- Hvis du har glemt at tage p-piller i en blisterpakning og ikke får din menstrua-tion i den p-pillefrie periode, er du måske blevet gravid. Kontakt din læge, før du starter på den næste blisterpakning.

... du kaster op eller har kraftig diarré?

Hvis du kaster op kort tid (3–4 timer) efter du har taget din Femelle® p-pille, er det ikke sikkert, at p-pillen har nået at virke. Dette svarer til at have glemt en p-pille. Følg derfor anvisningen for glemte p-piller. Hvis du har kraftig diarré, skal du kontakte din læge.

... du ønsker at udskyde din menstruation?

Du kan udskyde din menstruation, hvis du straks fortsætter med en ny blisterpakning uden at holde en p-pillefri periode. Udskydelse af menstruationen kan fortsætte så længe som ønsket indtil slutningen af den anden pakke. Når du ønsker at få din menstruation, stopper du med at tage p-pillerne. I perioden hvor du udskyder din menstruation, kan du få gennembrudsblødninger eller pletblød-ninger, mens du tager p-pillerne. Start med den næste blisterpakning efter den sædvanlige 7-dages p-pille fri periode.

... du ønsker at ændre ugedagen for din 1. blødningsdag?

Hvis du tager dine p-piller som foreskrevet, vil du få din menstruation på samme ugedag hver 4. uge. Hvis du ønsker at ændre denne, skal du forkorte (aldrig forlænge) den p-pille fri periode. Hvis din menstruation f.eks. starter på en fredag, og du fremover ønsker, at den skal starte på en tirsdag (3 dage tidligere); start da på din næste blisterpakning 3 dage tidligere end du plejer. Hvis den p-pillefri periode bliver forkortet til 3 dage eller mindre, vil du måske ikke få din menstruation. Du kan få gennembrudsblødninger eller pletblødninger, mens du tager den næste blisterpakning.

... du får uventede blødninger?

I de første par måneder kan alle typer p-piller give uregelmæssige blødninger (pletblødninger eller gennembrudsblødninger) mellem menstruationerne. Måske får du brug for at anvende hygiejnebind/tamponer, men fortsæt med at tage dine p-piller.

Uregelmæssige blødninger stopper sædvanligvis, når din krop har vænnet sig til p-pillerne (normalt efter 3 måneder). Hvis blødningerne fortsætter, bliver kraftigere eller kommer igen, så kontakt din læge.

... du ikke får din menstruation?

Hvis du har taget alle dine p-piller korrekt, og du ikke har kastet op eller haft kraftig diarré eller taget anden medicin, er det meget usandsynligt, at du er blevet gravid.

Fortsæt med at tage dine Femelle®, som du plejer.

Hvis du ikke får din menstruation to gange i træk, er du måske gravid. Kontakt da din læge. Start ikke på din næste blisterpakning, før din læge har kontrolleret, at du ikke er gravid.

Hvis du holder op med at tage Femelle®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4. BIVIRKNINGER

Femelle® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirknin-ger.

Alvorlige bivirkninger

Alvorlige bivirkninger som kan skyldes p-pillerne samt de dertil hørende sympto-mer er beskrevet i afsnittene: ”P-piller og blodpropper” og ”P-piller og kræft”. Læs venligst disse afsnit for yderligere information og kontakt din læge om nødvendigt.

Meget sjældne bivirkninger:

- Blodpropper med smerter i brystet, åndenød, koldsved og besvimelse eller lammelser og taleforstyrrelser. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Udslæt med ømme, røde knuder oftest på ben og arme. Kontakt lægen.
- Overfølsomhedsreaktioner, f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger:

- Uregelmæssig blødning.

Almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Vægtøgning.
- Nedtrykthed, humørsvingninger.
- Hovedpine, svimmelhed, nervøsitet, kvalme, mavesmerter.
- Bumser (akne).
- Brystspænding, smerter i brysterne, menstruationssmerter.
- Symptomer af psykisk karakter op til forventet menstruation (præmenstruelt syndrom, PMS).
- Udebleven menstruation.

Ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Væskeophobning.
- Nedsat sexlyst.
- Migræne.
- Forhøjet blodtryk.
- Opkastninger, diarré.
- Udslæt, nældefeber.
- Vækst af brystvæv.

Sjælden– meget sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

- Vægttab.
- Øget sexlyst.
- Nedsat dannelse af tårevæske (problemer med kontaktlinser).
- Uregelmæssige, skjoldede pigmenteringer i ansigtet.
- Ændringer i udflåd fra skeden.
- Udflåd fra brystet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Femelle® efter den udløbsdato, som er anført på pakningen. Du kan opbevare Femelle® ved almindelig temperatur. Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Aktive stoffer: Desogestrel 150 mikrogram og ethinylestradiol 30 mikrogram. Øvrige indholdsstoffer: Kartoffelstivelse, stearinsyre, propylenglycol, α-tocopherol, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, kolloid vandfri silica, hypromellose, polyvidon og macrogol 6000.

Udseende og pakningsstørrelse

Tabletterne er runde og 6 mm i diameter. Tabletterne er mærket med RG på den ene side og P8 på den anden side. Tabletten er hvid.

Pakningsstørrelse: Blisterpakning indeholdende 3 x 21 stk.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V.

Femelle® svarer til Desorelle®

Denne indlægseddell blev sidst revideret februar 2012