

Rhinocort® Turbohaler® næsepudder, 100 mikrogram/dosis

Læs denne information godt igennem før De begynder at bruge medicinen

- Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Rhinocort® Turbohaler® til Dem personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

1. Virkning og anvendelse:

Hvidt pulver til lokal behandling i næsen. Rhinocort® Turbohaler® indeholder et hormon, som forhindrer hævelse og irritation i næsen på grund af allergi (kløe, tilstoppet og/eller løbende næse). De kan bruge Rhinocort® Turbohaler® lokalt i næsen til: Forebyggelse af høfeber og helårssnue. Behandling af polypper i næsen. Forebyggelse af nye polypper efter operation.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som skal læses før De bruger Rhinocort® Turbohaler®:

Brug ikke Rhinocort® Turbohaler® hvis:

De er overfølsom over for budesonid.

Særlige forholdsregler:

Fortæl Deres læge hvis De har eller har haft lunge-tuberkulose.

Graviditet og amning:

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De tager nogen form for medicin.

Graviditet: Hvis De er gravid, skal De altid rådføre Dem med Deres læge, inden De bruger Rhinocort® Turbohaler®.

Amning: De kan bruge Rhinocort® Turbohaler®, selvom De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed:

Rhinocort® Turbohaler® påvirker ikke arbejds-sikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin:

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal De bruge Rhinocort® Turbohaler®

Dosering:

Forebyggelse af høfeber og helårssnue:

Voksne: 2 sug i hvert næsebor om morgenen. Når den ønskede virkning er opnået, kan De prøve at nedsætte dosis til et sug i hvert næsebor om morgenen.

De bør bruge den laveste dosis, der virker.

For at forebygge høfeber bør De så vidt muligt starte behandlingen med Rhinocort® Turbohaler®, før pollen-sæsonen starter.

De skal altid bruge Rhinocort® Turbohaler® regelmæssigt, som lægen har ordineret.

Hvis næsen er stoppet, kan medicinen ikke fordele sig godt nok, hvor den skal virke. For at få effekt kan det derfor være en god ide også at bruge næsedråber mod tilstoppet næse de første 2-3 dage.
Børn: Rhinocort® Turbohaler® bør ikke anvendes til børn.

Behandling eller forebyggelse af næsepolypper:

Voksne: 1 sug i hvert næsebor to gange dagligt (morgen og aften).

Børn: Rhinocort® Turbohaler® bør ikke anvendes til børn.

Brugsanvisning:

Puds næsen. Skru beskyttelseshætten af.

Hold Rhinocort® Turbohaler® lodret med det grå bundstykke nedad. Drej bundstykket en gang frem og tilbage. Det er underordnet, om der drejes til højre eller til venstre først.

Anbring næsestykket helt tæt til det ene næsebor og luk det andet næsebor med en finger. Træk vejret hurtigt og kraftigt ind (i ca. et halvt sekund).

Før De puster ud igen, skal De fjerne inhalatoren fra næsen.

Gentag i det andet næsebor.

Hvis der er ordineret yderligere dosis i hvert næsebor, gentages ovenstående.

Skru beskyttelseshætten på igen.

Vigtigt:

Pust aldrig ud gennem næsestykket og skru altid beskyttelseshætten på efter brug.

Rhinocort® Turbobahaler® afgiver altid den rigtige dosis, også hvis der er blevet drejet flere gange på bundstykket.

De kan hverken lugte eller smage medicinen.

Rengøring:

Rengør næsestykkets yderside 2-3 gange om ugen med en tør klud.

Obs! Næsestykket må ikke rengøres med vand.

Hvornår er Rhinocort® Turbobahaler® tom?

Når De kan se et rødt mærke øverst i dosisindikatoren, er der ca. 20 doser tilbage. Når det røde mærke når bunden af dosisindikatoren, er Rhinocort® Turbobahaler® tom, og De skal kassere den.

Den lyd De kan høre, når De ryster Rhinocort® Turbobahaler®, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren.

De skal være opmærksom på, at Rhinocort® Turbobahaler® ikke virker lige med det samme. Der kan godt gå et par dage, før De får det bedre.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har De brugt for meget Rhinocort® Turbobahaler®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har brugt mere Rhinocort® Turbobahaler®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas.

Der er dog ingen akut risiko forbundet ved at tage for meget Rhinocort® Turbobahaler® en enkelt gang.

Har De glemt at bruge Rhinocort® Turbobahaler®?

De skal ikke tage en ekstra dosis, men blot fortsætte med den planlagte dosering. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger:

Rhinocort® Turbobahaler® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvortige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): Hævelse i mund og svælg. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Dannelse af hul i næseskillevæggen. Søg læge.

Ikke alvortige bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede): Irritation i næsen i form af tørhed og nysen, umiddelbart efter brugen, samt næseblod.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede): Hudreaktioner i form af nældefeber, udslæt, kløe og betændelseslignende tilstande.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Sårdannelse i næsen.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem, der står i informationen, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Opbevaring:

Rhinocort® Turbobahaler® skal opbevares utilgængeligt for børn.

Rhinocort® Turbobahaler® skal opbevares tørt. Anvend ikke Rhinocort® Turbobahaler® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information:

Afllever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Rhinocort® Turbobahaler® indeholder:

- Rhinocort® Turbobahaler®, næsepulver 100 mikrogram/dosis.
- Det virksomme indholdsstof i Rhinocort® Turbobahaler® er budesonid.
- Der er ingen hjælpestoffer.

Markedsføring i Danmark:

2care4 ApS, Esbjerg V.

Rhinocort® og Turbobahaler® er registrerede varemærker, der tilhører AstraZeneca AB koncernen.