

Indlægseddell: Information til brugeren

Serevent® 50 mikrogram/dosis inhalationspulver, afdelt i Diskos® Salmeterol

05-2015
P119575-7

Læs denne indlægseddell grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægseddellen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægseddellen kan findes på www.indlaegsseddell.dk

Oversigt over indlægseddellen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Serevent®
3. Sådan skal du bruge Serevent®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Serevent® inhalationspulver, der er afdelt i Diskos®, består af det aktive stof og lactose (mælkesukker). Diskos® er en pulverinhalator, der bliver aktiveret af indåndingen.

Serevent® inhalationspulver indeholder et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene og herved ophæver forsnavningen i bronkierne. Denne optræder pludseligt i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.

Du kan bruge Serevent® til

- Forebyggelse af astma, herunder natlig astma, som tillægsbehandling, hvor tilstrækkelig kontrol ikke opnås med inhalationssteroider.
- Forebyggelse af anstrengelsesudløst astma.
- Behandling af rygerlunger (KOL).

Det er vigtigt, at du tager din medicin hver dag. Du skal bruge Serevent® morgen og aften – også når du ikke har symptomer.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Serevent®

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Serevent®:

- hvis du er allergisk over for salmeterol eller lactose.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Serevent®.

Serevent® er en forebyggende behandling og virker ikke på pludselige anfald af åndenød. Mod dette skal du bruge din korttidsvirkende anfaldsmedicin, som du altid bør have på dig.

Gå jævnlige til lægen, så du får Serevent® i den dosis, der passer til sværhedsgraden af din astma. Du skal helst ikke have anfald eller vågne om natten af din astma. Tal med lægen, hvis du bruger mere anfaldsmedicin end du plejer. Du bør kun ændre eller stoppe behandlingen efter aftale med din læge.

Hvis du samtidig lider af diabetes, forøget hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen (tyreotoksikose) eller hjerte-kar-sygdom bør Serevent® tages med forsigtighed.

Hvis du har en svær astma, er der risiko for, at kalium i blodet bliver for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin eller binyrebarkhormoner.

Serevent® bør ikke anvendes (og er ikke tilstrækkelig) som førstevalgsbehandling ved astma, og behandlingen bør ikke påbegyndes under akut svær forværring af din astma.

Ved pludselig og tiltagende forværring af din astma eller ved opståen af alvorlige bivirkninger, skal du fortsætte behandlingen, og hurtigst muligt kontakte din læge, da behandlingen muligvis skal ændres. Du kan eventuelt dagligt måle peak-flow.

Hvis du er af afrikansk eller afrocaribisk oprindelse har du større risiko for alvorlige vejrtrækningsrelaterede hændelser.

Brug af anden medicin sammen med Serevent®

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du kan bruge Serevent® sammen med anden medicin, men tal først med lægen hvis du er i behandling med:

- medicin mod hjerte-karsygdomme (betablokkere).
- anden medicin mod astma (xantinderivater).
- binyrebarkhormoner (kortikosteroider).
- vanddrivende medicin.
- medicin mod svamp (ketoconazol, itraconazol).
- medicin mod HIV (ritonavir).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke bruge Serevent®. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Serevent® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Serevent® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Serevent® indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Serevent®.

3. Sådan skal du bruge Serevent®

Brug altid Serevent® nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Serevent® er kun til inhalation og skal bruges regelmæssigt. Den fulde effekt indtræder først efter inhalation af flere doser. Da der kan være bivirkninger forbundet med overdreven brug af denne slags medicin, bør dosis og doseringshyppighed kun øges efter aftale med lægen.

Dosering ved astma:

Voksne og unge fra 12 år:

Den sædvanlige dosis er 1 sug (50 mikrogram) 2 gange daglig. Ved mere alvorlig astma kan lægen ordinere, at dosis øges til 2 sug (100 mikrogram) 2 gange daglig.

Børn over 4 år:

Den sædvanlige dosis er 1 sug 50 mikrogram 2 gange daglig.

Serevent® bør ikke anvendes til børn under 4 år.

Dosering ved kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL):


Voksne:

Den sædvanlige dosis er 1 sug (50 mikrogram) 2 gange daglig.

Brugervejledning

Klargør doserne umiddelbart før brug.


Diskos® i åben position.




1. Åbn Diskos® ved at skubbe fingergrebet i bund indtil du kan høre et klik.



2. Skub dernæst dosis-knappen i bund og lad den blive i bund. Dosis er nu klar.



3. Ånd ud ved siden af Diskos® og luk dernæst mund og læber omkring mundstykket. Sug ind så hurtigt og dybt som muligt. Hold vejret nogle få sekunder. Sug evt. en ekstra gang.



4. Hvis du har taget dosis rigtigt kan du smage pulveret (lactosen). Luk Diskos® efter hver dosering ved at skubbe fingergrebet tilbage på plads, så er mundstykket beskyttet mod snavs.

Hvis du skal tage mere end 1 sug (1 dosis), gentag så pkt.1-3. Serevent® skal inhaleres helt ned i lungerne for at virke. Tælleren på siden af Diskos® viser hvor mange doser, der er tilbage. Når der er 5 doser tilbage bliver tallene røde. Når de 60 doser er brugt, skal du smide den tomme Diskos® ud. Rengør mundstykket med en let fugtig klud.

Børn kan have brug for hjælp fra en voksen.

Hvis du har brugt for meget Serevent®
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Serevent®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering:
Rysten, svimmelhed, forhøjet blodtryk, hovedpine, hurtig puls og lavt kaliumindhold i blodet.

Hvis du har glemt at bruge Serevent®
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Serevent®
Spørg lægen eller apotekpersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Kortåndethed / Vejtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.
- Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hovedpine.
- Rysten.
- Hjertebanken.
- Muskelkramper.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Hurtig puls eller uregelmæssig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Nervøsitet.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
- Søvnløshed/søvnforstyrrelser.
- Svimmelhed.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Vand i kroppen. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose). Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Allergiske reaktioner, f.eks. udslæt (kløe og rødme).
- Svælgerirritation.
- Kvalme.
- Smerte i leddene.
- Uspecifikke brystsmerte.
- Ekstra hjerteslag.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også milde bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Serevent® utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Brug ikke Serevent® efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Serevent® 50 mikrogram/dosis inhalationspulver indeholder:

- Aktivt stof: Salmeterol (som salmeterolxinafoat).
- Øvrigt indholdsstof: Lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser

Diskos® er en plastikbeholder med pvc-lamineret folieblisterbånd.

Serevent® 50 mikrogram/dosis fås i pakninger á 60 doser inhalationspulver afddelt i Diskos®.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Zcare4
Tømmervej 9
6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

Zcare4
Tømmervej 9
6710 Esbjerg V.

Serevent® og Diskos® er registrerede varemærker, som tilhører Glaxo Group Limited.

Denne indlægsseddel blev senest revideret maj 2015.