

Tertensif® Retard, 1,5 mg depottabletter

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Tertensif® Retard til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Tertensif® Retard svarer til lægemidlet NatriliX® Retard.

Oversigt over indlægssedlen

1. Tertensif® Retards virkning og hvad du skal bruge det til
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tertensif® Retard
3. Sådan skal du tage Tertensif® Retard
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer du Tertensif® Retard
6. Yderligere oplysninger

1. Tertensif® Retards virkning og hvad du skal bruge det til

- Tertensif® Retard depottabletter virker længere end almindelige tabletter.
- Tertensif® Retard virker vanddrivende og nedsætter blodtrykket.
- Du kan bruge Tertensif® Retard til behandling af for højt blodtryk.

Lægen kan have givet dig Tertensif® Retard til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Tertensif® Retard

Tag ikke Tertensif® Retard hvis du

- er overfølsom over for indapamid eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- er overfølsom over for medicin mod blærebetændelse (sulfonamider).
- har alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion.
- har en meget alvorlig leversygdom med ændret bevidsthed, træthed, søvnløshed, uro, rysten (hepatisk encefalopati).
- har lavt kalium i blodet.

Vær ekstra forsigtig med at tage Tertensif® Retard

Tal med lægen, inden du tager Tertensif® Retard, hvis du

- har nedsat leverfunktion eller alvorlig leversygdom (cirrose).
- har nedsat nyrefunktion.
- har dårligt hjerte.
- er underernæret.
- har sukkersyge. Hvis du har sukkersyge, er det vigtigt, at du måler dit blodsukker.
- har urinsyregigt (gout).
- har forhøjet kalk (calcium) i blodet.

Oplys altid ved blod- og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Tertensif® Retard. Det kan påvirke prøveresultaterne.

Tertensif® Retard står på dopinglisten og kan medføre diskvalifikation ved sportskonkurrence. Spørg lægen.

Brug af anden medicin

Tal med din læge, hvis du tager

- medicin mod mani-depressiv sygdom (lithium).

- medicin mod depression (tricykliske antidepressiva f.eks. amitriptylin, nortriptylin).
- medicin mod psykoser (f.eks. chlorpromazin, sulpirid, haloperidol).
- medicin mod allergi (mizolastin).
- medicin mod infektion (moxifloxacin).
- medicin mod smerter (f.eks. ibuprofen, celecoxib, diclofenac, acetylsalicylsyre i høje doser).
- medicin for hjertet eller blodtrykket (digoxin eller ACE-hæmmer (f.eks. perindopril, ramipril, trandolapril).
- medicin mod forstyrrelser i hjerterytmen (f.eks. sotalol, amiodaron).
- vanddrivende medicin.
- medicin mod sukkersyge (metformin).
- medicin mod spastiske sygdomme (baclofen).
- afføringsmidler.
- binyrebarkhormon.
- medicin efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus).

Hvis du skal have indsprøjtning af antibiotikum (erythromycin), svampemiddel (amphotericin B) eller kontrastmidler ved røntgenundersøgelse, skal du fortælle lægen, at du tager Tertensif® Retard.

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Brug af Tertensif® Retard sammen med mad og drikke

Du kan tage Tertensif® Retard i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apotek til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du må ikke tage Tertensif® Retard, hvis du er gravid.

Amning

Du må ikke tage Tertensif® Retard, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Brug af Tertensif® Retard kan måske give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Tertensif® Retard

Tertensif® Retard indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager tabletterne, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Tertensif® Retard

Tag altid Tertensif® Retard nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: 1 tablet 1 gang daglig om morgenen (for at undgå vandladning om natten).
Du må ikke tygge depottabletten, men skal synke den hel. Husk at drikke et glas vand.

Nedsat lever- og nyrefunktion

Du må ikke tage Tertensif® Retard, hvis du har alvorligt nedsat lever- eller nyrefunktion. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Tertensif® Retard

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Tertensif® Retard, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.
Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering er kvalme, opkastning, svimmelhed på grund af for lavt blodtryk, kramper, sløvhed, forvirring, meget stor, evt. aftagende eller ophørt vandladning.

Hvis du har glemt at tage Tertensif® Retard

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Tertensif® Retard

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.
Fortæl det straks til lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandling med Tertensif® Retard er stoppet.

4. Bivirkninger

Tertensif® Retard kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 100 patienter):

- Svaghed og kraftsløse muskler på grund af nedsat kaliumindhold i blodet. Kontakt læge eller skadestue.
- Nyrsvigt

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Almen sløvhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt straks læge.
- Uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Betændelse i bugspytkirtlen med voldsomme mavesmerter og feber. Kontakt straks læge eller skadestue.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Hvis du har nedsat leverfunktion, kan du udvikle en hjernesygdom (hepatisk encefalopati) med træthed, søvnløshed, uro og rysten. Kontakt straks læge.
- Hvis du har lupus erythematosus disseminatus (en sygdom med led- og muskelsmerter, feber og udslæt), kan din sygdom blive forværret.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Udslæt bestående af pletter og små knuder (makulopapulært udslæt)

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

- Allergiske reaktioner, især hududslæt eller små-blødninger i hud og slimhinder, hvis du i forvejen har eller er disponeret for astma eller allergi.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Svimmelhed på grund af lavt blodtryk. Træthed, hovedpine.
- Prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.
- Kvalme. Forstoppelse. Mundtørhed.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos 1 ud af 10.000 patienter):

- Udslæt, som kan vise sig som periodisk optrædende lokale hævelser af hud, slimhinde og andre kropsdele
- Nældefeber, afskalning af hud eller Steven-Johnsons syndrom (hududslæt og slimhindebetændelse)

Hyppigheden er ikke kendt:

- Ændret smagssans, mavesmerter og utilpashed på grund af forstyrrelser i væske- og saltbalancen.
- Mulig forværring af eksisterende lupus erythematosus disseminatus (en hudsygdom af autoimmune natur forbundet med hududslæt, ledgener, nyreforstyrrelser og forandringer af de hvide blodlegemer)
- Øget lysfølsomhed

Tertensif® Retard kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. leverprøver og blodsukker, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan også selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.laegemiddelstyrelsen.dk/

5. Sådan opbevarer du Tertensif® Retard

Opbevar Tertensif® Retard utilgængeligt for børn. Brug ikke Tertensif® Retard efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Afllever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Tertensif® Retard 1,5 mg, depottabletter indeholder:

Aktivt stof: Indapamid.

Det virksomme indholdsstof i Tertensif® Retard er indapamid 1,5 mg.

De øvrige indholdsstoffer er: Kolloid vandfri silica, hypromellose, lactose, magnesiumstearat, povidon, glycerol, macrogol 6000, titandioxid (E 171).

Pakningsstørrelser

Tertensif® Retard 1,5 mg depottabletter findes i pakningsstørrelser à 30 stk., 60 stk. og 90 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Importeret og ompakket af:

2care4 ApS
Tømrervej 10
6710 Esbjerg V.

Tertensif® er et registreret varemærke, som tilhører Biofarma, Frankrig