

Indlægsseddel: Information til brugeren
Airflusan Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram
inhalationspulver, afdelt
salmeterol/fluticasonpropionat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Airflusan Forspiro.
3. Sådan skal du bruge Airflusan Forspiro.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram/dosis anvendes til at behandle:

- Astma
- Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
- Denne sygdom er kendetegnet ved vedvarende vejrtrækningsproblemer på grund af indsnævrede luftveje, ofte ledsaget af hoste og slim. Dette lægemiddel nedsætter antallet af opblussende KOL-symptomer.

Dette lægemiddel indeholder to aktive stoffer.

- Salmeterol: et langtidsvirkende stof, der udvider luftvejene
- Fluticason: et binyrebarkhormon, der mindsker hævelse og inflammation (en betændelseslignende tilstand) i lungerne.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Airflusan Forspiro

Brug ikke Airflusan Forspiro

- hvis du er **allergisk** over for salmeterol, fluticason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Airflusan Forspiro (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Airflusan Forspiro, hvis du har:

- hjertesygdom, herunder uregelmæssigt eller hurtigt hjerteslag
- overaktiv skjoldbruskkirtel
- forhøjet blodtryk
- sukkersyge (Airflusan Forspiro kan forhøje dit blodsukker)
- lavt indhold af kalium i blodet
- nuværende eller tidligere tuberkulose eller andre infektioner i lungerne.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Airflusan Forspiro forebygger åndenød og hvæsende vejrtrækning. Vær opmærksom på, at lægemidlet ikke virker ved pludselig opstået åndenød eller hvæsende vejrtrækning.

Hvis du får sådan et **anfald med åndenød**, skal du bruge en hurtigtvirkende anfaldsmedicin, såsom salbutamol.

Kontakt omgående lægen, hvis din astma eller vejrtrækning bliver værre. Du kan eventuelt føle, at:

- din hvæsende vejrtrækning forværres
- du får trykken for brystet oftere end normalt
- du får øget behov for din hurtigtvirkende anfaldsmedicin.

Hvis noget af ovennævnte sker for dig, skal du fortsætte med at bruge Airflusan Forspiro, men du må ikke øge antallet af inhalationer. Din lungesygdom kan forværres, og du kan blive alvorligt syg. Kontakt lægen. Du kan have brug for yderligere behandling.

Børn og unge

Airflusan Forspiro anbefales ikke til børn under 12 år.

Brug af andre lægemidler sammen med Airflusan Forspiro

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nyligt har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Følgende lægemidler kan påvirke Airflusan Forspiro eller blive påvirket af Airflusan Forspiro:

- β -blokkere (f.eks. atenolol, propranolol og sotalol). β -blokkere bruges primært mod forhøjet blodtryk eller andre hjertesygdomme.
- lægemidler til behandling af infektioner (såsom ketoconazol, itraconazol og erythromycin) herunder nogle lægemidler til behandling af hiv (såsom produkter, der indeholder ritonavir eller cobicistat). Nogle af disse typer af lægemidler kan øge mængden af fluticasonpropionat eller salmeterol i kroppen. Dette kan øge risikoen for bivirkninger ved Seretide, herunder uregelmæssig hjerterytme, eller det kan forværre bivirkninger. Din læge kan vælge at følge dig tæt, hvis du tager disse lægemidler
- binyrebarkhormoner, der indtages gennem munden eller via indsprøjtning: lægemidler til behandling af inflammation (en betændelseslignende tilstand) eller forebyggelse af afstødning af et transplanteret organ.
- diuretika, også kendt som "vanddrivende medicin", til behandling af forhøjet blodtryk.
- andre bronkodilatatorer (f.eks. salbutamol)
- medicin, der indeholder xanthiner. Disse bruges ofte til at behandle astma.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Lægen vil vurdere, om du i så fald kan bruge Airflusan Forspiro.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Airflusan Forspiro vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Airflusan Forspiro indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Denne mængde lactose giver dog normalt ikke problemer hos patienter med lactose-intolerans.

3. Sådan skal du bruge Airflusan Forspiro

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Airflusan Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram/dosis:

- **Astma**

Den anbefalede dosis til **voksne og børn på 12 år og derover** er:

En inhalation to gange dagligt.

Lægen vil regelmæssigt kontrollere dine astmasymptomer.

- **Kronisk obstruktiv lungesygdom**

Den anbefalede dosis til **voksne** er:

En inhalation to gange dagligt.

Hvis du opnår kontrol over dine symptomer med to inhalationer af Airflusan Forspiro om dagen, vil lægen eventuelt nedsætte din dosis til én inhalation om dagen:

- én inhalation om aftenen, hvis du har symptomer om natten
- én inhalation om morgenen, hvis du har symptomer om dagen.

Lægen vil regelmæssig kontrollere dine symptomer, hvis du tager Airflusan Forspiro mod astma.

Kontakt straks lægen, hvis din astma forværres eller din vejrtrækning bliver dårligere. Hvis din vejrtrækning er blevet mere hvæsende, du oftere får en fornemmelse af, at din brystkasse snævrer sig sammen, eller du har brug for mere af din hurtigtvirkende behovsmedicin, skal du fortsætte med Airflusan Forspiro, men uden at øge antallet af inhalationer, da det kan føre til en forværring af din tilstand og du kan blive alvorlig syg. Kontakt lægen, da du måske har brug for yderligere behandling.

Anvendelse

Brug Airflusan Forspiro hver dag efter lægens anvisninger, helst **lige før et måltid** om morgenen og/eller om aftenen.

Skyl munden med vand efter brug.


Hvis du ikke bruger Airflusan Forspiro rigtigt eller efter lægens anvisninger, kan dine vejrtrækningsproblemer forværres. For at få det bedste behandlingsresultat skal du bruge Airflusan Forspiro hver dag, også selvom du ikke har nogen symptomer.

Brugervejledning

Lægen, sundhedspersonalet eller apotekspersonalet vil vise dig, hvordan du skal bruge inhalatoren, og regelmæssigt kontrollere, at du bruger den korrekt.


Inhalatoren indeholder 60 doser med medicin i pulverform i en sammenrullet foliestrip. Inhalatoren har en dosistæller, der viser, hvor mange doser du har tilbage, og som tæller ned fra 60 til 0. Når du når til de sidste 10 doser, vises tallene på en rød baggrund.

Inhalatoren kan ikke genfyldes. Når den er tom, skal du bortskaffe den og erstatte den med en ny.



Inden brug af inhalatoren

- Åbn den gennemsigtige låge til kammeret på siden af inhalatoren.
- Fjern foliestrippen fra kammeret: Riv forsigtigt hele foliestrippen af mod 'tænderne' ved kammeret, som vist nedenfor. **Undgå at trække eller hive** i strippen.



- Luk lågen til kammeret og bortskaf strippen.

Vigtigt:


Efterhånden som du bruger inhalatoren, vil kammeret gradvist blive fyldt op med brugte strips. Det stykke af foliestrippen, der har **sorte streger, indeholder ikke medicin**. På et tidspunkt vil de nummererede dele af strippen komme til syne i kammeret på siden af inhalatoren.

Lad ikke mere end 2 stykker af foliestrippen samle sig i kammeret, da det kan blokere inhalatoren. Riv forsigtigt strippen af, som vist ovenfor, og bortskaf den på sikker vis.

Brug af inhalatoren


Hold inhalatoren i hænderne, som vist på billederne.

1. Åbn




- **Åbn beskyttelseshætten i nedadgående retning**, så mundstykket kommer til syne
- Tjek hvor mange doser, der er tilbage på dosistælleren.

2. Klargør dosis



- **Løft kanten af det hvide topstykke op**. Sørg for, at sidekammeret er lukket.

Husk: Du skal først løfte det hvide topstykke op, når du er klar til at inhalere en dosis af medicinen. Hvis du klargør en dosis uden at inhalere, kan dosis gå tabt.



- **Åbn: Før det hvide topstykke helt til siden**, indtil **du hører et klik**. Denne bevægelse sætter en ny dosis på plads med et nyt tal på toppen.



- **Luk: Luk det hvide topstykke helt**, så det **klikkes** tilbage til udgangspositionen. Inhalatoren er nu klar til øjeblikkelig brug.

3. Inhalér

- Hold inhalatorens mundstykke på afstand af munden, og pust ud, så meget du kan, uden ubehag. **Pust aldrig direkte ind i inhalatoren**, da det kan påvirke dosis.
- Hold inhalatoren vandret med **beskyttelseshætten pegende nedad**.
- Luk læberne godt sammen om mundstykket.
- Tag en **jævn** og **dyb indånding** gennem inhalatoren, ikke gennem næsen.



- Fjern inhalatoren fra munden og **hold vejret i 5-10 sekunder**, eller så længe du kan uden ubehag.
- Ånd så langsomt ud, **men ikke ind i inhalatoren**.
- Luk beskyttelseshætten over mundstykket.
- Skyl munden med vand, og spyt det ud. Dette kan være med til at forebygge hæshed og svampeinfektion i mund og svælg.

Rengøring

- Tør om nødvendigt ydersiden af mundstykket af med en ren og tør serviet.
- Forsøg ikke at skille inhalatoren ad for at rengøre den eller af nogen anden årsag!
- Brug ikke vand eller vådservietter til at rengøre inhalatorens dele, da fugt kan påvirke dosis!
- Indfør aldrig nåle eller andre skarpe genstande i mundstykket eller nogen anden del, da det kan beskadige inhalatoren.

Hvis du har brugt for meget Airflusan Forspiro

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Airflusan Forspiro, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomerne på overdosering er:

- svimmelhed
- hovedpine
- hurtig puls
- muskelsvaghed
- ledsmerter
- rysten/skælven.

Hvis du har brugt større doser over en længere periode, skal du kontakte lægen eller apotekspersonalet. Det skyldes, at store doser af Airflusan Forspiro kan nedsætte den mængde af steroidhormoner, der bliver dannet i binyrerne.

Hvis du har glemt at bruge Airflusan Forspiro

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag din næste dosis som normalt.

Hvis du holder op med at bruge Airflusan Forspiro

Du må ikke pludseligt stoppe med at anvende Airflusan Forspiro eller nedsætte dosis uden lægens tilladelse, da det kan forværre dine vejtrækningsproblemer og i meget sjældne tilfælde medføre bivirkninger.

Disse omfatter:

- mavesmerter
- træthed og manglende appetit, kvalme
- opkastning og diarré
- vægttab
- hovedpine eller døsighed
- lavt indhold af sukker i blodet
- lavt blodtryk og krampeanfald.

Hvis du får en infektion eller er udsat for ekstreme belastninger (f.eks. en operation eller efter en alvorlig ulykke), kan du i meget sjældne tilfælde få lignende bivirkninger. For at forebygge sådanne symptomer vil lægen eventuelt ordinere yderligere kortikosteroider (såsom prednisolon).

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner: Du kan opleve, at din vejtrækning bliver dårligere efter inhalation af AirFluSan Forspiro. Du kan få meget hvæsende vejtrækning og hoste. Du kan også opleve kløe, udslæt (nældefeber) og hævelse (oftest af ansigt, læber, tunge eller svælg) eller du kan muligvis opleve, at dit hjerte slår meget hurtigt eller du føler dig svimmel og ør (kan føre til kollaps eller besvimelse). **Hvis du oplever disse bivirkninger, eller de indtræder pludseligt, efter at du har brugt AirFluSan Forspiro, skal du omgående kontakte lægen.** Allergiske reaktioner på AirFluSan Forspiro er ikke almindelige (de kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede).

Andre bivirkninger kan forekomme med følgende hyppigheder:

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

- hovedpine - Denne bivirkning aftager som regel, når behandlingen fortsættes.
- øget antal forkølelser hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

- svamp (ømmе, hvidgullige, hævede pletter) i mund og svælg, ømhed i tunge, hæshed og irritation i svælget. Dette kan afhjælpes ved straks at skylle munden med vand og spytte ud og/eller børste dine tænder lige efter hver dosis medicin. Lægen kan ordinere medicin til behandling af svamp
- ømme, hævede led og muskelsmerter
- muskelkramper.

Der er desuden indberettet følgende bivirkninger hos patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) lungebetændelse (pneumoni)

- Kontakt lægen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, mens du tager AirFluSan Forspiro. Det kan være tegn på lungebetændelse:
 - øget slimproduktion
 - ændringer i slimets farve
 - feber
 - kulderystelser
 - tiltagende hoste
 - tiltagende vejtrækningsvanskeligheder
- blå mærker og knoglebrud hvor som helst på kroppen
- bihulebetændelse
- lavt indhold af kalium i blodet (du kan få uregelmæssig puls, muskelsvaghed og/eller kramper)

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

- meget hurtig puls (takykardi)
- rysten og hurtig eller uregelmæssig puls (hjerteranken). Dette er som regel harmløst og aftager ved fortsat behandling.
- angst (denne bivirkning optræder primært hos børn)
- øgede blodsukkerniveauer. Hvis du har sukkersyge, kan det være nødvendigt at kontrollere dit blodsukker hyppigere og eventuelt justere doseringen af din sukkersygemedicin.
- søvnforstyrrelser
- allergisk udslæt
- brystmerter
- sløret syn (grå stær).

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter)

- **vejrtrækningsproblemer** eller **forværring af hvæsende vejrtrækning** umiddelbart efter inhalation af AirFluSan Forspiro. **Stop med at bruge** AirFluSan Forspiro hvis dette skulle ske, og brug din hurtigtvirkende anfallsmedicin som hjælp til din vejrtrækning. **Kontakt omgående lægen.**
- unormal produktion af visse hormoner, særligt hvis du bruger høje doser af denne medicin i længere tid.

Tegnene herpå er:

- langsommere vækst hos børn og unge
- knogleskørhed
- øget tryk i øjet (grøn stær)
- vægtøgning
- rundt fuldmåneansigt (Cushings syndrom).

Du skal gå til regelmæssig kontrol for disse bivirkninger hos lægen, der vil sørge for, at du får den lavest mulige dosis af AirFluSan Forspiro.

- adfærdsændringer, såsom usædvanligt høj aktivitet eller irritabilitet Disse bivirkninger optræder primært hos børn.
- uregelmæssige eller ekstra hjerteslag
Kontakt lægen, men stop ikke brugen af AirFluSan Forspiro, medmindre lægen anviser det.
- en svampeinfektion i øsofagus (spiserøret), som kan forårsage synkebesvær.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt, men som kan forekomme:

- depression eller aggression. Disse bivirkninger optræder primært hos børn.
- sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller din pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Airflusan Forspiro indeholder:

AirFluSan Forspiro 50 mikrogram/500 mikrogram inhalationspulver, afdelt:

- Aktive stoffer: salmeterol og fluticason. Hver afmålt dosis af AirFluSan Forspiro afgiver 50 mikrogram salmeterol (som salmeterol-xinafoat) og 500 mikrogram fluticasonpropionat. Dette svarer til en leveret dosis på:
- 45 mikrogram salmeterol (som salmeterolxinafoat) og 465 mikrogram fluticasonpropionat.
- Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser:

I den lilla plastinhalator til tørpulver er der en aluminiumblister indeholdende 60 doser hvid, homogen pulverblanding.

Hver dosis er afdelt.

Pakningsstørrelser:

Airflusan Forspiro fås i:

Airflusan Forspiro 50mikrogram/500 mikrogram i pakninger med 60 doser og 3 x 60 doser.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Tlf.: +45 6395 2700

Fremstiller

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Airflusan Forspiro også som Airflusal Forspiro.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 01/2022.

1000107278-001-04