

ATROVENT®

Inhalationsspray, opløsning 20 mikrogram/dosis

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Lægen har ordineret Atrovent® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Atrovent®.
3. Sådan skal du bruge Atrovent®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse.

Virkning og anvendelse

- Atrovent® inhalationsspray indeholder en opløsning. Inhalationssprayen forstøver opløsningen til meget små inhalérbare dråber.
- Atrovent® inhalationsspray afslapper muskulaturen omkring de små bronkier i lungerne og udvider derved bronkierne. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.
- Du kan bruge Atrovent® inhalationsspray ved astma og kroniske lungesygdomme som rygerlunger (KOL).

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Atrovent®.

Brug ikke Atrovent® hvis

Du er overfølsom (allergisk) over for ipratopiumbromid (det aktive indholdsstof), atropin-lignende stoffer eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

Særlige forholdsregler

- Hvis du har grøn stær (glaukom) eller anlæg for grøn stær, eller hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostata) eller besvær med at lade vandet, bør du tale med lægen, før du bruger Atrovent®.
- Har du cystisk fibrose, kan Atrovent® give fordøjelsesbesvær.
- Undgå at få medicinen i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt vand fra vandhanen.
- Umiddelbart efter inhalation kan der opstå overfølsomhedsreaktioner, som f.eks nældefeber, hævelse under huden og i slimhinderne, hududslæt, astma-lignende anfald, væskeansamling i mundhulen og anafylaksi.
- Opstår der symptomer fra øjnene, bør lægen omgående kontaktes.

Hvis du bruger mere Atrovent® end foreskrevet af lægen, kan det være tegn på, at sygdommen er forværret, og du bør snarest kontakte din læge.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

- Hvis du er gravid, må du kun bruge Atrovent® efter lægens anvisning.

Amning:

- Hvis du ammer, må du kun bruge Atrovent® efter lægens anvisning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Atrovent® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

- Virkningen samt bivirkninger af Atrovent® kan forstærkes af antikolinerge lægemidler (midler mod visse mavesygdomme), og beta-adrenerge stoffer og xantinderivater (andre midler, der anvendes i astmabehandling). Spørg lægen eller apoteket.
- Hvis du har grøn stær, kan det øge faren for akut grøn stær, hvis du får Atrovent® sammen med visse andre typer inhalationsmedicin. Spørg lægen eller apoteket.
- Da lægemidlet indeholder ethanol, er der en teoretisk risiko for interaktion hos særligt følsomme patienter, der behandles med disulfiram (behandling af alkoholmisbrug) eller metronidazol (middel mod infektion).

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du bruge Atrovent®.

Dosering

Voksne og børn over 7 år:

Doseringen er individuel. Anbefalet dosis er 2 pust (40 mikrogram) fire gange dagligt.

Den daglige dosering bør normalt ikke overstige 12 pust.

Børn:

Børn må kun bruge Atrovent® under opsyn af en voksen.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Brugsanvisning

Inden du bruger sprayen første gang, skal du trykke metalbeholderen ned 2 gange.


1. Fjern beskyttelseshætten. Hold inhalationssprayen mellem tommel- og pegefinger. Pust helt ud.
2. Luk mund og læber omkring mundstykket.
3. Tag en rolig, dyb indånding og tryk samtidig på beholderen, indtil du har udløst et pust. Hold vejret nogle få sekunder.
4. Hvis det er nødvendigt med mere end ét pust, skal du gentage proceduren.

Hvis sprayen ikke har været brugt i 3 dage, skal du trykke metalbeholderen ned én gang.

Sæt beskyttelseshætten på mundstykket efter brug.

Du skal inhalere Atrovent® helt ned i lungerne, for at det kan virke.

Opbevar beholderen med ventilen nedad. Børn har ofte brug for hjælp fra en voksen. Rengøring: Skyl hylsteret i håndvarmt vand og lad det tørre. Du kan kontrollere hvor mange doser, der er tilbage i inhalationssprayen ved at lægge selve metalbeholderen i vand og se, hvor højt den flyder.



Har du taget for meget Atrovent®

Kontakt lægen eller skadestuen, hvis du har brugt mere Atrovent®, end der står i denne vejledning, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas. Hvis du får en for stor dosis, kan du få mundtørhed, synsforstyrrelser og hjertebanken.

Har du glemt at tage Atrovent®

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkeltdoser. Fortsæt blot med den anbefalede enkeltdosis.

4. Bivirkninger.

Atrovent® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Åndedrætsbesvær lige efter brug af sprayen. Kontakt lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

- Grøn stær (forhøjet tryk i øjet). Viser sig ved øjensmerter, nedsat syn, ringe omkring lyse genstande. Kræver omgående lægehjælp.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Viser sig ved pludseligt hududslæt, krampes i svelget med vejrtrækningsbesvær, besvimelse eller hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hurtig, evt. uregelmæssig puls. Kontakt lægen.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hovedpine, svimmelhed, inhalationsudløst hoste og halsirritation/betændelse.

- Mundtørhed og fordøjelsesbesvær.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

- Nældefeber, hurtig puls, hududslæt, hudkløe og uskarpt syn.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Hjertebanken, kvalme, besvær med at lade vandet og store pupiller.

Bivirkninger som uskarpt syn, hjertebanken, hurtig evt. uregelmæssig puls, kvalme og besvær med at lade vandet svinde som regel ved fortsat brug.

Risiko for besvær med at lade vandet formodes øget ved eksisterende forsnævring af urinvejene.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver

ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Opbevaring.

- Opbevar Atrovent® utilgængeligt for børn.
- Anvend ikke Atrovent® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information.

Atrovent® inhalationsspray, opløsning, 20 mikrogram/dosis indeholder

Det virksomme indholdsstof er:

Ipратropиumbromid 20 mikrog./dosis.

De øvrige indholdsstoffer er:

Vandfri citronsyre, rensed vand, vandfri ethanol og norfluran (drivgas).

Markedsføring i Danmark

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Afløber altid eventuelle medicinrester på apoteket.

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Atrovent® er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.



(03) 1042901

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2500