

Symbicort® Mite Turbuhaler®

80 mikrogram/4,5 mikrogram/dosis inhalationspulver

Budesonid/formoterolfumaratdihydrat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Symbicort® Mite Turbuhaler® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

- Virkning og anvendelse
- Det skal du vide, før du begynder at bruge Symbicort® Mite Turbuhaler®
- Sådan skal du bruge Symbicort® Mite Turbuhaler®
- Bivirkninger
- Opbevaring
- Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Symbicort® Mite Turbuhaler® er en inhalator, der anvendes til behandling af astma hos voksne, unge og børn i alderen 6 år og derover. Den indeholder to forskellige lægemidler: Budesonid og formoterolfumaratdihydrat.

- Budesonid tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes "kortikosteroider". Det virker ved, at det dæmper og forebygger den betændelseslignende tilstand, som er i lungerne.
- Formoterolfumaratdihydrat tilhører den gruppe lægemidler, som kaldes "langtidsvirkende beta₂-adrenoceptoragonister" eller "bronkodilatorer". Det virker ved, at det får de små muskler i luftvejene til at slappe af. Derved får du lettere ved at trække vejret.

Anvendes hvor det er hensigtsmæssigt med kombination:

- Anvendes hos patienter, der ikke er velkontrolleret på inhalationskortikosteroider og korttidsvirkende β₂-adrenoceptoragonister ved behov.
- Anvendes hos patienter, der er velkontrolleret på inhalationskortikosteroider og langtidsvirkerende β₂-adrenoceptoragonister.

Dette lægemiddel er ikke beregnet til personer med svær astma. Den kan bruges på to måder til behandling af astma:

- a) Nogle personer bruger 2 astmainhalatorer: Symbicort® Mite Turbuhaler® og en separat inhalator med anfaldsmedicin.**
- De bruger Symbicort® Mite Turbuhaler® hver dag. Dette forebygger astmasymptomer.
 - De bruger deres inhalator med anfaldsmedicin, når de får astmasymptomer, for at gøre det lettere at trække vejret igen.
- b) Nogle personer bruger Symbicort® Mite Turbuhaler® som deres eneste astmainhalator.**
- De bruger Symbicort® Mite Turbuhaler® hver dag. Dette forebygger astmasymptomer.
 - De bruger også Symbicort® Mite Turbuhaler®, når de har brug for ekstra doser til lindring af astmasymptomer, for at gøre det lettere at trække vejret igen. De har ikke behov for en separat inhalator til dette.

Lægen kan have givet dig Symbicort® Forte Turbuhaler® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE SYMBICORT® MITE TURBUHALER®

Brug ikke Symbicort® Mite Turbuhaler®

- hvis du er overfølsom (allergisk) overfor budesonid, formoterol eller et af de øvrige indholdsstoffer, se punkt 6, hvilket er lactose (som indeholder små mængder mælkeproteiner).

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge før du bruger Symbicort® Mite Turbuhaler® hvis du:

- har sukkersyge.
- har en lungeinfektion.
- har alvorligt højt blodtryk, eller hvis du har eller har haft hjerteproblemer (inklusi v uregelmæssig hjertebanken, meget hurtig puls, fortykkelse af hjertemuskulaturen, arterieforsnævring eller hjertestop).
- har problemer med skjoldbruskirtelen eller binyrerne.
- har ubehandlet lavt indhold af kalium i blodet.
- har alvorlige problemer med leveren.
- tidligere har fået nedsat binyrebarkfunktion, ved brug af systemiske steroider.
- er i en stresset periode, da stress kan nedsætte binyrebarkfunktionen.

Behandlingen med Symbicort® Mite Turbuhaler® bør ikke opstartes under en forværring, en voldsom eller akut forværring af din astma. Hvis behandlingen ikke er effektiv eller overstiger den højest anbefalede dosis, skal du kontakte lægen. Du bør altid have din inhalationsspray med dig.

Ved langtidsbehandling af børn, bør barnets vækst jævnligt følges.

Stop af behandling eller dosisjustering til laveste effektive dosis, bør ske ved gradvis nedtrapning i samråd med din læge eller astmasygeplejerske.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger et af følgende lægemidler:

- Beta-blokkere (f.eks. atenol eller propranolol mod for højt blodtryk) inklusiv øjendråber (f.eks. timolol mod glaukom).
- Lægemidler mod hurtig eller uregelmæssig hjertebanken (f.eks. quinidin).
- Lægemidler som digoxin, som ofte anvendes til behandling af hjertestop.
- Diuretika, også kendt som vanddrivende midler (f.eks. furosemid). Disse anvendes til behandling af højt blodtryk.
- Steroider som indtages gennem munden (f.eks prednisolon).
- Xanthin lægemidler (f.eks. theophyllin og aminophyllin). Disse anvendes ofte til behandling af astma.

- Andre bronkodilatorer (f.eks. salbutamol).
- Tricykliske antidepressiva (f.eks. amitriptylin).
- Phenothiazin lægemidler (anvendes primært i antipsykotika, f.eks. chlorpromazin eller prochlorperazin).
- Lægemidler, som kaldes proteasehæmmere (f.eks. ritonavir) til behandling af HIV-infektion.
- Lægemidler, som anvendes til behandling af svampeinfektioner (f.eks. itrakonazol og ketokonazol).
- Lægemidler til Parkinson's sygdom (f.eks. levadopa).
- Lægemidler til problemer med skjoldbruskirtelen (f.eks. levothyroxin).
- Ve-stimulerende lægemidler indeholdende oxytocin.
- Lægemidler mod allergi (antihistaminer).
- Lægemidler mod depression (MAO-hæmmere) og midler med lignende virkning.
- Lægemidler mod infektion (f.eks. claitromycin, telithromycin, furazolidon).
- Inhalations-anæstesi (halogenerede hydrocarboner).
- Lægemiddel mod kræft (procarbazin).
- Alkohol.

Hvis ovenstående gælder for dig, eller hvis du er usikker, så tal altid med din læge eller apotekspersonalet, inden du tager Symbicort® Mite Turbuhaler®.

Fortæl også lægen eller apotekspersonalet, hvis du skal have bedøvelse i forbindelse med operation eller hos tandlægen.

Graviditet, amning og fertilitet

- Hvis du er gravid eller forsøger at blive gravid, bør du tale med din læge, før du tager Symbicort® Mite Turbuhaler®. Symbicort® Mite Turbuhaler® bør kun anvendes under graviditet, hvis fordelene overstiger risikoen ved anvendelse.
- Hvis du bliver gravid, mens du bruger Symbicort® Mite Turbuhaler®, må du ikke stoppe behandlingen, men kontakte lægen med det samme.
- Hvis du ammer, bør du tale med din læge, før du bruger Symbicort® Mite Turbuhaler®. Budesonid udskilles i modermælken og kan have en påvirkning på barnet og bør derfor kun gives til ammende kvinder, hvis fordelene for moderen overstiger risikoen for barnet.

Trafik- og arbejdsikkerhed

Symbicort® Mite Turbuhaler® påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Symbicort® Mite Turbuhaler®

Symbicort® Mite Turbuhaler® indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE SYMBICORT® MITE TURBUHALER®

Brug altid Symbicort® Mite Turbuhaler® nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

- Det er vigtigt, at bruge Symbicort® Mite Turbuhaler® hver dag, også selvom du ikke har nogen astmasymptomer.
- Din læge vil regelmæssigt tjekke dine astmasymptomer.

Hvis du hidtil har taget steroidtabletter mod astma eller KOL, kan lægen vælge at nedsætte det antal tabletter, som du skal tage, når du begynder på Symbicort® Mite Turbuhaler®. Hvis du har taget steroid i tabletforn i længere tid, kan lægen foreslå løbende blodprøvekontrol. Når du begynder at tage færre steroidtabletter, vil du måske få generel utilpashed, også selvom dine luftvejssymptomer er i bedring. Du kan få symptomer såsom tilstoppet næse eller snue, svækkelse, muskel- og ledsmerter eller udslæt (eksem). Kontakt straks lægen, hvis et af disse symptomer bliver generende, eller hvis du får symptomer såsom hovedpine, træthed, kvalme eller opkastning. Du skal måske have anden medicin, hvis du får symptomer på allergi eller gigt. Tal med lægen, hvis du er usikker på, om du bør fortsætte med at bruge Symbicort® Mite Turbuhaler®.

Din læge vil måske overveje at give dig steroidtabletter ud over din sædvanlige behandling i perioder med stress (f.eks. hvis du har en luftvejsinfektion eller før en operation).

Vigtig information vedrørende dine astmasymptomer

Hvis du føler, at du får åndenød eller hvæser, når du bruger Symbicort® Mite Turbuhaler®, skal du fortsætte med at bruge Symbicort® Mite Turbuhaler®, men kontakte din læge hurtigst muligt, da du kan have brug for yderligere behandling.

Kontakt straks lægen hvis:

- Din åndenød bliver forværret, eller du ofte vågner om natten med astmasymptomer.
- Dit bryst føles tungt om morgenen, eller hvis tunghedsfølelsen varer længere end normalt.

Disse tegn kan betyde, at din astma ikke er kontrolleret godt nok, og du kan have behov for en anden eller yderligere behandling med det samme.

Astma

Symbicort® Mite Turbuhaler® kan bruges på to måder til behandling af astma. Den mængde Symbicort® Mite Turbuhaler® som skal bruges, og hvornår den skal tages, afhænger af, hvordan den er blevet ordineret til dig.

- Hvis du har fået ordineret Symbicort® Mite Turbuhaler® og en separat inhalator med anfaldsmedicin, skal du læse afsnittet "a) Brug Symbicort® Mite Turbuhaler® og en separat inhalator med anfaldsmedicin".
- Hvis du har fået ordineret Symbicort® Mite Turbuhaler® som din eneste inhalator, skal du læse afsnittet "b) Brug Symbicort® Mite Turbuhaler® som din eneste astmainhalator".

a) Brug Symbicort® Mite Turbuhaler® og en separat inhalator med anfaldsmedicin.

Brug din Symbicort® Mite Turbuhaler® hver dag. Dette forebygger astmasymptomer.

Voksne (fra 18 år)

- Den normale dosis er 1 eller 2 inhalationer 2 gange dagligt.
- Din læge kan øge dosis til 4 inhalationer 2 gange dagligt.
- Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil din læge måske bede dig om kun at tage din medicin én gang dagligt.

Unge (12 til 17 år)

- Den normale dosis er 1 eller 2 inhalationer 2 gange dagligt.
- Hvis dine symptomer er velkontrollerede, vil din læge måske bede dig om kun at tage din medicin én gang dagligt.

Børn (6 til 11 år)

- Den normale dosis er 2 inhalationer 2 gange dagligt.

Børn under 6 år bør normalt ikke bruge Symbicort® Mite Turbuhaler®.

Din læge (eller astmasygeplejerske) vil hjælpe dig med at håndtere din astma. De vil justere dosis til den laveste, der kan kontrollere din astma. Dosis må ikke justeres uden, at du først har talt med din læge (eller astmasygeplejerske).

Brug din separate inhalator med anfaldsmedicin til behandling af astmasymptomer, når de opstår. Du bør altid have din inhalator med anfaldsmedicin på dig, så du kan bruge den, når du får behov for det. Anvend ikke Symbicort® Mite Turbuhaler® til at behandle astmasymptomerne – anvend din inhalator med anfaldsmedicin.

b) Brug Symbicort® Mite Turbuhaler® som din eneste astmainhalator Du må kun bruge Symbicort® Mite Turbuhaler® på denne måde, hvis din læge har ordineret det, og du er 12 år eller derover.

Brug Symbicort® Mite Turbuhaler® hver dag. Dette forebygger astmasymptomer.

Du kan bruge:

- 1 inhalation om morgenen og 1 inhalation om aftenen **eller**
- 2 inhalationer om morgenen **eller**
- 2 inhalationer om aftenen.

Brug også Symbicort® Mite Turbuhaler® til behandling af astmasymptomer, når de opstår.

- Hvis du får astmasymptomer, så tag 1 inhalation og vent et par minutter.
- Hvis du ikke har fået det bedre, så tag endnu en inhalation.
- Tag ikke mere end 6 inhalationer på én gang.

Du bør altid have Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator på dig, så du kan bruge den, når du får behov for det.

Der er normalt ikke behov for mere end 8 inhalationer om dagen. Din læge kan dog tillade op til 12 inhalationer i en begrænset periode.

Hvis du regelmæssigt har behov for 8 eller flere inhalationer, skal du kontakte lægen. Du har måske brug for at få ændret behandlingen.

Brug ikke mere end 12 inhalationer over 24 timer.

Hvis du dyrker motion og får astmasymptomer, så brug Symbicort® Mite Turbuhaler® som beskrevet her. Du må dog ikke anvende Symbicort® Mite Turbuhaler® lige før motion for at forebygge astmasymptomer.

Bør ikke anvendes til børn under 12 år.

Specielle patientgrupper:

Der er ikke behov for dosisjustering, hvis du er ældre. Der er ingen data i forhold til patienter med nedsat lever- eller nyrefunktion, men der kan være behov for dosisjustering hos patienter med levercirrose (skrumpelever pga. alkohol).

Klargøring af din nye Symbicort® Mite Turbuhaler®

Før du bruger en **ny** Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator for første gang, skal du gøre den klar til brug på følgende måde:

- Skru beskyttelseshætten af. Det kan være, at du hører en raslende lyd.
- Hold din Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator lodret med det røde bundstykke nedad.
- Drej bundstykket én gang frem og tilbage (det er underordnet, om der drejes til højre eller venstre først). Du vil høre en klikkende lyd.
- Gentag ovenstående, drej det røde bundstykke i begge retninger.
- Din Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator er nu klar til brug.

Sådan tages en inhalation

Du skal følge instruktionen nedenfor, hver gang du tager en inhalation.



- Skru beskyttelseshætten af. Det kan være, at du hører en raslende lyd.
- Hold din Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator lodret** med det røde bundstykke nedad.
- Hold ikke om mundstykket, når du klargør din Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator. Drej bundstykket én gang frem og tilbage (det er underordnet, om der drejes til højre eller til venstre først). Du vil høre en klikkende lyd. Din Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator er nu klar til brug. Klargør kun din Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator, når du har brug for den.
- Hold din Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator væk fra munden. Pust roligt ud (så længe det er behageligt). Pust ikke ud gennem din Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator.
- Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne. Luk læberne. Tag så kraftig og dyb en indånding som muligt. Tyg eller bid ikke i mundstykket.
- Fjern din Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator fra munden. And derefter langsomt ud.** Den mængde medicin som inhaleres er meget lille. Det er derfor muligt, at du ikke kan smage det efter inhalation. Hvis du har fulgt instruktionen, kan du dog være sikker på, at du har inhaleret din dosis, og at medicinen nu er i dine lunger.
- Hvis du skal tage en inhalation mere, skal du gentage punkt 2 til 6.



8. Skru beskyttelseshætten på efter brug.
9. Skyl munden grundigt med vand efter de faste inhalationer morgen og/eller aften og spyt ud.

Forsøg ikke at fjerne eller vride mundstykket. Det er fastgjort til din Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator og må ikke tages af. Anvend ikke din Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator, hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket er faldet af.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 1 gang ugentligt med en tør klud. Brug ikke vand eller andre væsker.

Hvornår tages en ny Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator i brug

- Dosisindikatoren fortæller, hvor mange doser (inhalationer) der er tilbage i din Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator. Når den er fuld, starter den på enten 60 eller 120 doser.
 - Dosisindikatoren er inddelt i intervaller á 10 doser. Den viser derfor ikke hver enkelt dosis.
 - Når du første gang ser et rødt mærke i toppen af dosisindikatorens område, er der ca. 20 doser tilbage. For de sidste 10 doser er baggrunden i dosisindikatorens vindue rød. Når mærket "0", på den røde baggrund, har nået midten af dosisindikatorens område, skal du tage en ny Turbuhaler® i brug.
- OBS:
- Bundstykket vil stadig kunne drejes og sige klik, selvom din Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator er tom.
 - Den lyd der kan høres, når du ryster din Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator, stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremiddel i bunden af inhalatoren. Derfor fortæller lyden ikke noget om, hvor meget medicin, der er tilbage i din Symbicort® Mite Turbuhaler® inhalator.
 - Hvis du ved en fejl drejer på bundstykket mere end én gang frem og tilbage, før du tager din dosis, vil du stadig kun få én dosis. Dog vil dosisindikatoren registrere alle de klargjorte doser.

Hvis du har taget for meget Symbicort® Mite Turbuhaler®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Symbicort® Mite Turbuhaler®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas). Tag pakningen med. De mest almindelige symptomer som kan forekomme, hvis du har taget mere Symbicort® Mite Turbuhaler®, end du bør, er rysten, hovedpine eller hurtig hjertebanken.

Hvis du har glemt at tage Symbicort® Mite Turbuhaler®

- Hvis du glemmer at tage en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis det er tæt på at være tid til den næste dosis, så vent bare indtil da.
- Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Symbicort® Mite Turbuhaler®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjælden (sker hos færre end 1 ud af 10.000):

- Kortåndethed, vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, åndenød pga. paradoks bronkospasme. Kontakt straks lægen eller ring 112.

Sjælden (sker hos færre end 1 ud af 1.000 personer):

- Bronkospasme (sammenstrækning af musklerne i luftvejene som medfører hvæsen). Hvis der pludselig opstår hvæsen efter brug af Symbicort® Mite Turbuhaler®, så stop med at tage Symbicort® Mite Turbuhaler® og kontakt straks lægen.
- Hævelse af ansigtet, særligt omkring munden (tunge og/eller svælg og/eller synkebesvær) eller kløende udslet sammen med vejrtrækningsbesvær (angioødem) og/eller pludselig følelse af besvimelse. Dette kan være tegn på, at du har en allergisk reaktion.

Andre bivirkninger:

Almindelig (sker hos færre end 1 ud af 10 personer):

- Palpitationer (opmærksom på din hjertebanken), skælven og rysten. Hvis dette forekommer, er det sædvanligvis mildt og forsvinder, når du fortsætter med at bruge Symbicort® Mite Turbuhaler®.
- Svampeinfektion i munden. Skyl munden med vand efter du har brugt din inhalator.
- Let irritation i halsen, hoste og hæshed.
- Hovedpine, rysten.

Ikke almindelig (sker hos færre end 1 ud af 100 personer):

- Ekstrem rastløshed ledsaget af øget motorisk aktivitet (f.eks. muskelspasmer, rysten, trækninger), truende, evt. voldelig adfærd.
- Angst.
- Søvnforstyrrelser.
- Svimmelhed.
- Kvalme.
- Hurtig hjertebanken.
- Blå mærker.
- Muskelkrampe.

Sjælden (sker hos færre end 1 ud af 1.000 personer):

- Udslæt, kløe.
- Lavt indhold af kalium i blodet.
- Hjerterytmeforstyrrelser. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Meget sjælden (sker hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

- Depression, ændret adfærd (mest hos børn).
- Brystsmerter eller tæthedsfølelse i brystet (angina pectoris), forlænget QTc-interval. Kan være alvorligt. Kontakt lægen.
- Forhøjet sukkerindhold (glucose) i blodet.
- Smagsforstyrrelser.
- Varierende blodtryk.
- Sløring af øjets linse (grå stær), hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. øget tryk i øjet (grøn stær). Kontakt lægen.
- Rødt, rundt "måneansigt", tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i nakken. Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat binyrebarken. Kontakt lægen.
- Nedsat væksthastighed hos børn og unge.
- ændring i knoglemarvsdensiteten (knoglerne bliver tyndere).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via: Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30°C.

Hold beholderen/hætten tæt tillukket for at beskytte mod fugt.

Brug ikke inhalatoren efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Symbicort® Mite Turbuhaler® indeholder

- De aktive stoffer er budesonid og formoterolfumaratdihydrat. Hver inhaleret dosis indeholder 80 mikrogram budesonid og 4,5 mikrogram formoterolfumaratdihydrat.
- Øvrige indholdsstof: lactosemonohydrat (som indeholder mælkeproteiner).

Udseende og pakningsstørrelse

Symbicort® Mite Turbuhaler® er en inhalator, som indeholder din medicin. Inhalationspulveret er hvidt. Hver inhalator indeholder enten 60 eller 120 doser og har en hvid krop med et rødt bundstykke.

Symbicort® Mite Turbuhaler® er tilgængelig i pakninger á 1, 2, 3, 10 eller 18 inhalatorer a 60 (eller 120) doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelse, ompakket og frigivet af

EuroPharmaDK
Oddesundvej 39
6715 Esbjerg N

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Symbicort® og Turbuhaler® er registrerede varemærker, der tilhører AstraZeneca AB.