

CAPOZIDE®

Tabletter

| |

Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Lægen har ordineret Capozide® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Capozide®.
3. Sådan skal du tage Capozide®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse.

Virkemåde

- Kombinationslægemiddel der virker blodtryksnedsættende og vanddrivende.
- Captopril (det ene virksomme indholdsstof) hører til en gruppe af lægemidler, der hedder ACE-hæmmere. Disse lægemidler hæmmer mængden af et bestemt hormon, og dette medfører, at blodkarrene udvides, og blodtrykket falder. Det andet virksomme indholdsstof, hydrochlorthiazid, normaliserer vand- og saltudskillelsen gennem nyrerne, hvilket medfører blodtryksfald.

Medicinen anvendes til

Behandling af forhøjet blodtryk, der ikke kan behandles tilfredsstillende med kun ét af de virksomme indholdsstoffer i lægemidlet.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Capozide®.

Tag ikke Capozide® hvis

- Du er overfølsom over for captopril, hydrochlorthiazid, et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Capozide®, ACE-hæmmere (lægemidler mod forhøjet blodtryk) eller sulfonamidderivater (syntetisk anti-biotika).
- Du i forbindelse med tidligere behandling med ACE-hæmmere (lægemidler mod forhøjet blodtryk) har lidt af hævelse under huden og i slimhinderne.
- Du lider af arvelige eller pludseligt opståede tendenser til anfaldsvis optrædende væskeophobninger lokaliseret i underhudsbindevævet og slimhinderne.
- Du har svært nedsat nyre- eller leverfunktion.
- Du er gravid i 2. eller 3. trimester

Særlige forholdsregler

- Der er i sjældne tilfælde set for lavt blodtryk i forbindelse med behandlingen. Risikoen for dette er større for patienter, der lider af væske- og/eller saltmangel, er på diæt med saltfattig kost, har diarre, opkastning eller er i hæmodialyse.
- Væskeansamlinger under huden i ekstremiteter (arme og ben), i ansigtet, læber, slimhinder, tunge, svælg eller strube kan forekomme, specielt inden for den første uge af behandlingen. I sjældne tilfælde kan der, efter langtidsbehandling med ACE-hæmmere (lægemidler mod forhøjet blodtryk), udvikles svære tilfælde af væskeansamlinger. Behandlingen bør omgående afbrydes, og lægen kontaktes.
- Der er sjældent rapporteret væskeansamlinger i mave-tarmregionen. Hvis du får smerter i maveregionen, med eller uden kvalme og opkastning, skal du kontakte lægen.
- Tør hoste er observeret i forbindelse med behandling med ACE-hæmmere (lægemidler mod forhøjet blodtryk). Hosten forsvinder sædvanligvis efter ophør med behandlingen.
- Du skal henvende dig til lægen, hvis du udvikler gulsot.
- Behandling med thiazider (vanddrivende midler) kan forårsage glukoseintolerans, forhøjet kolesterol- og fedtindhold i blodet, forhøjet mængde af urinstof i blodet og podagraanfald.
- Du skal jævnligt have undersøgt salt- og væskebalancen i blodet, når du er i behandling med Capozide®.
- Symptomer på salt- eller væskeforstyrrelser kan være mundtørhed, tørst, svaghed, sløvhed, døsighed, rastløshed, muskelsmerter eller krampes, muskeltræthed, for lavt blodtryk, nedsat urinnmængde, hurtig hjerterytme og symptomer fra mave-tarmkanalen så som kvalme og opkastning. Risikoen for lavt indhold af kalium i blodet er størst hos patienter med skrumpelever, hyppig vandladning, der ikke får tilstrækkeligt med salte gennem kosten, samtidig behandling med binyrebarkhormon eller hypofyseforlaphormonet corticotropin (ACTH) samt hos patienter, der får utilstrækkeligt med salt gennem kosten.
- Thiazider (vanddrivende lægemidler) øger udskillelsen af magnesium.
- Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.
- Capozide® bør ikke anvendes i det første trimester af graviditeten, se "Graviditet og amning".
- Samtidig brug af Capozide® og litium (middel mod mani/depression) anbefales ikke, da der er øget risiko for forgiftning med litium, se "Brug af anden medicin".
- I visse tilfælde kan det være nødvendigt med regelmæssige undersøgelser. Du skal være særlig opmærksom hvis:
 - Du har nedsat nyrefunktion.
 - Du har, eller tidligere har haft, en nyresygdom.
 - Du har sukkersyge. Doseringen på din medicin skal muligvis justeres.
 - Du får kaliumbesparende, vanddrivende medicin, kaliumtilskud eller kaliumholdig salterstatning.
 - Du får anden medicin, der er forbundet med øget indhold af kalium i blodet.
- I visse tilfælde bør der udvises forsigtighed ved brug af Capozide®. Dette gælder hvis:
 - Du har visse hjerteproblemer.
 - Du lider af en bindevævssygdom.
 - Du er i immunundertrykkende behandling.
 - Du får allopurinol (lægemiddel der nedsætter mængden af urinsyre i urinen).

- Du får procainamid (middel mod forstyrrelser i hjerterytmen).
- Du skal være særlig opmærksom hvis du samtidig er i allergibehandling med hvepsegift.
- Du skal i hæmodialyse.
- Du skal have foretaget større kirurgiske indgreb eller er i behandling med bedøvende medicin.
- Du har nedsat leverfunktion
- Doping: Hvis det virksomme indholdsstof forekommer i urinen ved kontrol, vil det medføre diskvalifikation af den sportsudøvende.

Brug af Capozide® sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Capozide® sammen med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Capozide®

Dette lægemiddel indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du lider af intolerance over for nogle sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Capozide®.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

- Du må ikke bruge Capozide®, hvis du er gravid. Når en graviditet er planlagt eller bekræftet, skal du skifte til alternativ behandling så hurtigt som muligt.

Amning:

- Hvis du ammer, må du ikke bruge Capozide®.
- Capozide® udskilles i modermælken, og mælkemængden nedsættes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det kan ikke udelukkes, at brug af Capozide® kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejder med maskiner.

Brug af anden medicin

Hvis flere lægemidler anvendes samtidig, kan de påvirke effekten af hinanden. Kontakt lægen, hvis du anvender et af følgende lægemidler samtidig med Capozide®, da dosis eventuelt skal justeres:

- Kaliumbesparende vanddrivende medicin eller kaliumtilskud.
- Tidligere behandling med vanddrivende medicin.
- Anden blodtrykssænkende medicin.
- Nitroglycerin, andre nitrater eller lægemidler, der virker udvidende på blodkar.
- Midler mod depression eller psykiske lidelser.
- Allopurinol (middel til behandling af urinsyreigt), procainamid (middel til behandling af forstyrrelser i hjerterytmen), cytostatika eller immunundertrykkende stoffer.
- Karsammentrækkende midler.
- Antidiabetika (midler til behandling af sukkersyge)
- Amphotericin B (antibiotika), carbenoxolon (mavesårsmedicin), kortikosteroider (binyrebarkhormon), corticotropin (hormon) eller stimulerende afføringsmidler.
- Calciumsalte.
- Jern.
- Alkohol, barbiturater (medicin til behandling af søvnløshed og epilepsi) og narkotiske analgetika (smertestillende medicin).
- Glykosider (hjertemedicin).
- Kolesterol- og fedtstofsænkende midler.
- Visse muskelafslappende midler (f.eks. tubocurarinklorid).
- Visse lægemidler til behandling af uregelmæssig hjerterytme.
- Lithium.
- Visse smertestillende midler (non-steroide antiinflammatoriske midler).

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du tage Capozide®.

Dosering

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl). Capozide® kan gives én eller to gange dagligt.

Voksne:

Individuel dosering.

Sædvanlig dosering er 1 tablet dagligt om morgenen eller 1/2 tablet 2 gange dagligt.

Børn:

Sikkerhed og virkning af Capozide® hos børn er ikke fastslået.

Ældre:

Begyndelsesdosis er 25/12,5 mg (1/2 tablet) en gang dagligt. Denne dosering gælder også for diabetespatienter og for patienter, der lider af salt- og væskemangel.

Nedsat nyrefunktion:

Dosis skal justeres/reduceres. Lægens anvisninger skal følges.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for mange Capozide®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere af Capozide®, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Symptomer:

Øget vandladning, forstyrrelser i blodets indhold af salte, meget lavt blodtryk, svækkelse af bevidstheden (inklusive koma), krampetækninger, muskellammelser, hjerterytmeforstyrrelser, langsom puls og nyresvigt.



Har du glemt at tage Capozide®

Fort­sæt med almindelig dosering. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger.

Capozide® kan som al anden medicin give bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er kvalme, svimmelhed, kløe og hoste.

Bivirkninger

- Captopril (det ene virksomme indholdsstof).**
Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):
- Søvnforstyrrelser.
 - Smagsforstyrrelser og svimmelhed.
 - Tør iritationshoste, se ”Særlige forholdsregler”, og åndenød.
 - Kvalme, opkastning, maveirritation, smerter i maven, diarré, forstoppelse og mundtørhed.
 - Hudkløe med eller uden hududslæt, udslæt og hårtab.
 - Brystsmerter, træthed, utilpashed.

- Sjældne bivirkninger** (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):
- Anoreksi.
 - Døsighed, hovedpine og fornemmelse af snurren og prikken på huden.
 - Betændelse i mundslimhinden og sårdannelse på tungen.
 - Ændret nyrefunktion, nyresvigt, forøget urinmængde, formindsket vandladning og øget urinfrekvens.

- Meget sjældne bivirkninger** (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):
- Ændringer i blodbilledet, især hos patienter med nyreproblemer, blodmangel, nedsat antal blodplader, lymfeknude­lidelse, forøgelse af bestemte hvide blodlegemer, autoimmunsygdomme (sygdomme hvor immunforsvaret angriber kroppens egne celler) og cellenedbrydning, se ”særlige forholdsregler”.
 - Forhøjet indhold af kalium i blodet og for lavt blodsukker.
 - Forvirring og depression.
 - Blodpropper i hjernen, slagtilfælde.
 - Sløret syn.
 - Hjertestop og stærkt nedsat hjer­teaktivitet.
 - Kramper i luftvejene, helårssnue og allergisk lungebetændelse.
 - Betændelse i tungen, mavesår og betændelse i bugspytkirtlen.
 - Nedsat leverfunktion, galdeophobning i leveren, gulsot, leverbetændelse, vævsdød i leveren, forhøjet antal lever­enzymer og bilirubin.
 - Nældefeber, Steven Johnson syndrom (sygdom med symptomerne feber, blæreformet udslæt samt betændelse ved én eller flere af legemets åbninger), hududslæt specielt i ansigt, på arme og ben, lysfølsomhed, hudsygdom, hvor huden bliver rød, øm og væskende, hudlidelse med store spændte blærer og eksem.
 - Muskel- og ledsmerter.
 - Forhøjet indhold af protein i urinen.
 - Impotens og udvikling af kvindeligt brystvæv hos mænd.
 - Feber.

- Usædvanlig**
- For hurtig hjer­tefrekvens, hjerterytme­forstyrrelser, hjer­tekramper og hjer­tebank­en.
 - For lavt blodtryk, se ”Særlige forholdsregler”, Raynauds syndrom (hvide fingre og/eller tæer på grund af lidelse i blod­omløbet), rødmen og bleg­hed.
 - Hævelse under huden og i slimhinderne, se ”Særlige forholdsregler”.

- Hydrochlorthiazid (det andet virksomme indholdsstof).**
- Spytkirtelbetændelse.
 - Ændringer i blodbilledet, blodmangel og knoglemarvsdepression.
 - Anoreksi, forhøjet blodsukker, udskillelse af glukose i urinen, forhøjede mængder af urinstof i blodet, forstyrrelser i blodets indhold af salte, forhøjet kolesterol og fedt i blodet.
 - Rastløshed, depression og søvnforstyrrelser.
 - Appetitløshed, fornemmelse af snurren og prikken på huden og let svimmelhed.
 - Synet kan blive påvirket, så ting får et gulligt skær, og der kan opstå forbigående sløret syn.
 - Svimmelhed udløst fra det indre øre.
 - For lavt blodtryk og forstyrrelser i hjerterytmen.
 - Betændelse i blod- eller lymfekar og betændelse i kar i huden.
 - Vejtrækningsbesvær, lungebetændelse og vand i lungerne.
 - Irritation i maveregionen, diarré, forstoppelse og betændelse i bugspytkirtlen.
 - Gulsot.
 - Lysfølsomhedsreaktioner, udslæt, betændelse i huden, nældefeber, kraftige allergiske reaktioner og hudlidelse med afskalning af det øverste hudlag.
 - Muskelkramper.
 - Nedsat funktion af nyrerne og betændelse i nyrerne.
 - Feber og svækkelse.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring.

- Capozide® skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Ingen særlige opbevaringsbetingelser.
- Anvend ikke Capozide® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information.

Capozide® indeholder

Det virksomme indholdsstof i Capozide® er:
Captopril 50 mg og hydrochlorthiazid 25 mg.
Andre indholdsstoffer:
Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, stivelse, magnesiumstearat og stearinsyre.

Markedsføring i Danmark

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Capozide® er et registreret varemærke, der tilhører E.R. Squibb & Sons, L.L.C.

