

INDLÆGSSEDDEL**Albionic 10+33 mg/ml
intramammær opløsning til
mælkeydende køer**

Se den nyeste indlægsseddel på
www.indlaegsseddel.dk

**1. NAVN OG ADRESSE
PÅ INDEHAVEREN AF
MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF
VIRKSOMHEDSGODKENDELSE,
SOM ER ANSVARLIG FOR
BATCHFRIGIVELSE, HVIS
FORSKELLIG HERFRA**

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerpen
Belgien

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Biovet Joint Stock Company
39, Petar Rakov Str.
4550 Peshtera
Bulgarien

**2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS
NAVN**

Albionic

**3. ANGIVELSE AF DE
AKTIVE STOFFER OG ANDRE
INDHOLDSSTOFFER**

10 ml opløsning indeholder 330 mg
lincomycin som lincomycinhydrochlorid,
100 mg neomycin som neomycinsulfat og
5 mg dinatriumedetat.

Hjælpestof

Vand til injektionsvæsker ad 10 ml.

4. INDIKATIONER

Til behandling af lakterende køer
med klinisk mastitis (yverbetændelse)
forårsaget af neomycin/lincomycin
følsomme mikroorganismer.

5. KONTRAINDIKATIONER

Må ikke gives til dyr, der før har vist sig
at være overfølsomme over for enten
lincomycin eller neomycin.

6. BIVIRKNINGER

Der er ingen kendte bivirkninger.
Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer
bivirkninger. Dette gælder også
bivirkninger, der ikke allerede er anført
i denne indlægsseddel eller hvis du
mener, at dette lægemiddel ikke har
virket efter anbefalingerne.
Alternativt kan du indberette observerede
bivirkninger via det nationale
bivirkningssystem
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

7. DYREARTER

Lakterende køer.

**8. DOSERING FOR
HVER DYREART,
ANVENDELSESMÅDE OG
INDGIVELSESVej**

1 applikator (10 ml) sprøjtes ind i
hver angreben kirtel. Gentag denne
behandling umiddelbart efter de næste
to malkninger (12 timers interval), så hver
angreben kirtel i alt behandles tre gange.
Ved intramammær injektion under
aseptiske forholdsregler. Om nødvendigt
vaskes patterne grundigt med varmt
vand tilsat et egnet desinfektionsmiddel
og aftørres grundigt. Udmalk yveret
fuldstændigt. Desinficér pattespidsen
med en alkoholholdig klud eller et
egnet desinfektionsmiddel. Bestem den
ønskede kanylélængde (fuld eller delvis)
og sæt spidsen ind i pattekanalen. Skub
stempel ind for at frigive alt indhold og
massér området for at fordele produktet i
mælkecisternen. Efter injektion anbefales
det at dyppe alle patter i et godkendt
pattedyp.
Vær opmærksom på, at dyrlægen kan
have foreskrevet anden anvendelse eller
dosering end angivet i denne information.
Følg altid dyrlægens anvisning og
oplysningerne på doseringsetiketten.

**9. OPLYSNINGER OM
KORREKT ANVENDELSE**

Kan anvendes ved drægtighed og
diegivning.

Dette produkt bør ikke bruges sammen med makrolider, for eksempel erythromycin, da lincomycin og makroliderne modvirker hinanden ved effekten på den 50S ribosomale subenhed.

14. DATO FOR SENESTE REVISION AF INDLÆGSSEDLEN

Marts 2019

10. TILBAGEHOLDELSESTID

Slagtning: 3 døgn efter sidste
behandling.

Mælk: 84 timer (3,5 døgn) efter
sidste behandling.

11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige
forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel
efter den udløbsdato, der står på
pakningen efter Anv. før.

12. SÆRLIGE ADVARSLER

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brug af præparatet bør baseres på
følsomhedstest og tage hensyn til officiel
og lokal antibiotikapolitik.

Overdosis

Produktet tolereres godt. I tilfælde
af en fejlagtig overdosering er det
usandsynligt, at der vil fremkomme en
systemisk eller lokal skadelig påvirkning
af dyret. Dog bør ethvert tegn på unormal
effekt øjeblikkelig rapporteres til den
ansvarlige dyrlæge.

Uforligeligheder

Ingen kendte.

13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinærlægemidler samt
affald heraf bør destrueres i henhold til
lokale retningslinjer.