

COLIFOAM®

Rektalskum 100 mg/dosis

Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Lægen har ordineret Colifoam® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Colifoam®
3. Sådan skal du bruge Colifoam®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Virkemåde

Colifoam® er et svagt virkende binyrebarkhormon, der hæmmer betændelsesagtige tilstande.

Medicinen anvendes til

Behandling af betændelse af endetarmens slimhinder.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Colifoam®

Brug ikke Colifoam® hvis

- Du er overfølsom over for hydrocortison eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Colifoam®.
- Du er forstoppet.
- Du har hul eller bylder i tarmvæggen.
- Du har svampe, virus- eller bakterieinfektioner i endetarmen.
- Du er blevet opereret i tarmen for nylig.
- Du lider af omfattende fistler (rørformede kanaler mellem organer eller fra de indre organer f.eks. tarmen til huden).

Særlige forholdsregler

- Tal med din læge, hvis du bruger Colifoam® til børn eller over en længere periode.
- Tal med din læge inden du bruger Colifoam®, hvis du lider af mavesår.
- Hvis du har betændelse (pga. svampe, virus eller bakterier), skal betændelsen behandles før eller samtidig med, du bruger Colifoam®.
- Doping: Hvis det virksomme indholdsstof forekommer i urinen ved kontrol, vil det medføre diskvalifikation af den sportsudøvende.

Brug af anden medicin

Ingen kendte problemer.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Colifoam®

Colifoam® indeholder methylparahydroxybenzoat (E 218) og propylparahydroxybenzoat (E 216), der kan give allergiske reaktioner, samt propylenglykol, som kan give irritation af huden.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun bruge Colifoam® efter lægens anvisning.

Amning:

Du kan amme, selv om du bruger Colifoam®.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Colifoam® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Colifoam®

Dosering

Voksne:

1 dosis (1 fyldt sprøjte) i endetarmen én til to gange dagligt i to til tre uger. Derefter hver anden dag i to til tre uger.


Børn:

Samme dosis som angivet under "Voksne".


Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Brugsanvisning


1. Ryst beholderen kraftigt i ca. 30 sekunder før brug.




2. Det blå stempel trækkes ud til målestregen, ca. 1 cm fra kanten af sprøjten.




3. Sæt beholderens mundstykke lodret på sprøjten.




4. Tryk forsigtigt beholderens mundstykke ned, så skummet fylder ca. $\frac{1}{4}$ af sprøjten og slip derefter mundstykket.



5. Vent et par sekunder til skummet ikke udvides mere.




6. Gentag processen, tryk/vent til skummet udvides og netop når målestregen. Tryk ikke vedvarende for at fylde sprøjten på én gang.



7. Før sprøjtespiden ind i endetarmen og tryk stemplet i bund så sprøjten tømmes.

OBS! Beholderen må aldrig bruges direkte i endetarmen.

Rengøring:
Sprøjten skilles ad efter brug og rengøres grundigt.



Har du brugt for meget Colifoam®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Colifoam®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Har du glemt at bruge Colifoam®

Glemmer du at tage en dosis, fortsættes med almindelig dosering. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Colifoam® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Bivirkninger

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 1.000 patienter):

- Diaré.
- Lokal brændende følelse.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring

- Opbevar Colifoam® utilgængeligt for børn.
- Opbevar Colifoam® ved stuetemperatur (15-25 °C).
- Beskyt Colifoam® mod sollys og temperaturer over 50 °C og under 0 °C, da beholderen indeholder en brandfarlig drivgas.
- Efter brug må beholderen ikke brændes eller punkteres.
- Anvend ikke Colifoam® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information

Colifoam® indeholder

Det virksomme indholdsstof i Colifoam® er:

Hydrocortisonacetat 100 mg/dosis.

De øvrige indholdsstoffer er:

Propylenglycol, ethoxylet stearylalkohol, cetylalkohol, polyoxyethylen(10)stearylether, methylparahydroxybenzoat (E 218), propylparahydroxybenzoat (E 216), triethanolamin, rensset vand, isobutan og propan.

Produktets styrke og pakningsstørrelse:

Colifoam® 100 mg/dosis fås i pakninger med 20,8 gram rektalskum.

Markedsføring i Danmark

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Colifoam® er et registreret varemærke, der tilhører Meda AB.



(01) 2768901

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700