

COMBIVENT®

Inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkeltdosisbeholder
0,5 mg + 2,5 mg/beholder

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Lægen har ordineret Combivent® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Combivent®.
3. Sådan skal du bruge Combivent®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Virkning

Combivent® inhalationsvæske til nebulisator er en klar farveløs væske, der i forstøvet form bliver inhaleret helt ned i lungerne ved hjælp af et inhalationsapparat.

Combivent® inhalationsvæske afslapper muskulaturen omkring de små bronkier i lungerne og udvider bronkierne. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.

Anvendelse

Du kan bruge Combivent® inhalationsvæske til kroniske lungesygdomme som rygerlunger (KOL) når behandling med ét enkelt virksomt stof ikke er tilstrækkeligt.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Combivent®

Brug ikke Combivent® hvis

Du er overfølsom (allergisk) over for ipratropiumbromid, salbutamol (de aktive indholdsstoffer), atropin-lignende stoffer eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

Særlige forholdsregler

- Tal med lægen, hvis du har sukkersyge, for højt stofskifte, for nylig haft blodprop i hjertet og/eller alvorlige hjerte-kar-sygdomme, for højt blodtryk, høj uregelmæssig puls eller svulst i binyremarven.
- Hvis du har grøn stær (glaukom) eller anlæg for grøn stær, eller hvis du har forstørret blærehalskirtel (prostata) eller besvær med at lade vandet, bør du tale med lægen, før du bruger Combivent®.
- Har du cystisk fibrose, kan Combivent® give fordøjelsesbesvær.
- Undgå at få medicinen i øjnene. Skulle det alligevel ske, skyl da straks øjnene med koldt vand fra vandhanen.
- Tal med lægen hvis du får øjensmerter eller -ubehag, sløret syn, synsforstyrrelser der viser sig som ringe eller farvede pletter i forbindelse med røde øjne/blodansamling i øjet eller væskeophobning i hornhinden.
- Overfølsomhedsreaktioner kan i sjældne tilfælde forekomme umiddelbart efter du har brugt Combivent®. Symptomer kan være nældefeber, hævelse under huden og i slimhinderne, hududslæt, astmalignende anfald, væskeansamlinger i svelget og overfølsomhed. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hvis du har en svær astma, er der risiko for, at kalium i blodet bliver for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astma-medicin med theofyllin eller lignende stoffer eller binyrebarkhormoner.
- Søg straks læge hvis du får akut åndenød eller hurtig forværring af åndenød.
- Hvis du bruger mere Combivent® end foreskrevet af lægen, kan det være tegn på, at sygdommen er forværret, og du bør snarest kontakte din læge.

Brug af anden medicin

- Du kan bruge Combivent® sammen med anden medicin, men tal med din læge, hvis du får medicin mod:
 - Forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta-blokkere, spørg din læge).
 - Grøn stær (visse øjendråber, spørg din læge).
 - Øget hjerterytme eller hvis du er i behandling med binyrebarkhormoner, vanddrivende midler eller andre midler til behandling af astma og kroniske lungesygdomme.
 - Depression (tricykliske antidepressive midler og MAO-hæmmere).
 - Forstyrrelser i hjerterytmen (digitalis eller digoxin).

Fortæl lægen før en evt. bedøvelse, at du bruger Combivent®– måske skal du ophøre med brugen af Combivent® før bedøvelse.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

- Hvis du er gravid, må du kun bruge Combivent® efter lægens anvisning.
- Combivent® kan hæmme veerne under fødslen.

Amning:

- Hvis du ammer, må du kun bruge Combivent® efter lægens anvisning.
- Salbutamol bliver udskilt i modermælk.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Combivent® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Combivent®

Dosering

Enkeltdosisbeholderen med 2,5 ml skal du bruge ufortyndet.

Voksne og børn over 12 år:

1 enkeltdosisbeholder tre til fire gange dagligt.

Børn under 12 år:

Børn under 12 år må ikke bruge Combivent®, da erfaringen med behandling af børn under 12 år er utilstrækkelig.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Brugsanvisning

Enkeltdosisbeholderen er kun beregnet til inhalation med et passende inhalationsudstyr, og du må ikke bruge den på anden måde.

1. Gør inhalationsudstyret klar til brug.
2. Tag ampullerne ud af æsken og afriv en ampul ved at vrikke lidt og trække den nedefter.
3. Hold fast i ampullens nederste ende og vrid topstykket af mens ampullen drejes rundt.
4. Placer ampullens åbne ende i inhalationsbeholderens skål og klem forsigtigt på ampullen, mens den tømmes. Sørg for at få hele mængden ud af ampullen.

5. Saml inhalationsudstyret og anvend det som foreskrevet for det pågældende apparat.
6. Skyl eventuelle rester af opløsningen ud efter brug, og rengør inhalationsbeholderen som anbefalet.

Da enkelt-dosisbeholderen ikke indeholder konserveringsmiddel, er det vigtigt, at du bruger indholdet straks efter åbning, og at du anvender en ny beholder for hver dosis.

Har du brugt for meget Combivent®

Kontakt lægen eller skadestuen, hvis du har brugt mere Combivent®, end der står i denne vejledning, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Hvis du får en for stor dosis, kan du få hjertebanken, hurtig puls, rysten, ændringer i blodtrykket, trykken for brystet, hjertesmerter, uregelmæssig hjerterytme, rødmen, indre uro, kvalme og svimmelhed. Desuden forbigående mundtørhed og synsforstyrrelser (besvær med at se skarpt).

Har du glemt at bruge Combivent®

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for glemte enkelt-doser. Fortsæt blot med den anbefalede enkelt-dosis.

4. Bivirkninger

Combivent® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

- Hurtig puls, meget uregelmæssig hjerterytme. Hvis hjertesymptomer som hjertebanken eller uregelmæssig hjerterytme er vedvarende, kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Det viser sig ved pludseligt hududslæt, kramper i svælget med vejrtrækningsbesvær, besvimelse eller hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Grøn stær, forhøjet tryk i øjet. Det viser sig ved øjensmerter, nedsat syn, ringe omkring lyse genstande. Kræver omgående lægehjælp.
- Nedsat kaliumindhold i blodet (hypokaliæmi).
- Åndedrætsbesvær lige efter brug af inhalationsvæsken. Kontakt lægen.

Ikke-alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hovedpine og hoste.
- Mundtørhed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

- Indre uro.
- Svimmelhed, stemmesvigt og rysten.
- Hjertebanken.
- Irritation i svælget.
- Kvalme.
- Besvær med at lade vandet.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Nældefeber.
- Psykiske forstyrrelser.
- Øjensmerter og udvidelse af pupillerne.
- Opkastning og fordøjelsesbesvær.
- Hududslæt og svedudbrud.
- Muskelkramper, muskelsvaghed og muskelsmerter.
- Ændringer i blodtrykket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring

- Opbevar Combivent® utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Combivent® over 25 °C.
- Opbevar Combivent® i den ydre karton.
- Brug ikke Combivent® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information

Combivent® indeholder

De virksomme indholdsstoffer i Combivent® 2,5 ml er:

Ipratropiumbromid 0,5 mg og salbutamolsulfat svarende til salbutamol 2,5 mg.

De øvrige indholdsstoffer er:

Natriumchlorid, saltsyre og renset vand.

Produktets styrke og pakningsstørrelse:

Combivent® inhalationsvæske til nebulisator, opløsning, enkelt-dosis-beholder fås i pakninger med 60x2,5 ml.

Markedsføring i Danmark

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Combivent® er et registreret varemærke, der tilhører Boehringer Ingelheim.



(01) 2585601

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2500