

ELOCOM®

Creme 0,1%

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Lægen har ordineret Elocom® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Elocom®.
3. Sådan skal du bruge Elocom®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Virkemåde

- Elocom® creme indeholder et stærkt binyrebarkhormon.
- Elocom® dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.

Medicinen anvendes til

Behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Elocom®

Brug ikke Elocom® hvis

- Du er overfølsom over for det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Elocom® creme.
- Du har betændelse i huden, som skyldes bakterier eller svampe, med mindre betændelsen bliver behandlet samtidig.

Brug ikke Elocom® mod:

- En betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næse, kinder, hage og pande (rosacea).
- Betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- Bumser eller på områder med bumser.
- Sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelssår, skoldkopper og helvedesild).
- Hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Særlige forholdsregler

- Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.
- Du bør ikke bruge binyrebarkhormon længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
- Du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
- Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
- Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
- Du bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- Du bør ikke bruge Elocom® rundt om øjnene.
- Undgå at få Elocom® i øjnene.
- Hvis du har brugt Elocom® i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.

- Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Elocom® i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Elocom® creme, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Elocom® creme.

Brug af anden medicin

Du kan bruge Elocom® sammen med anden medicin.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Elocom®

Elocom® creme indeholder propylenglycolmonopalmitostearat, der kan give irritation af huden.

Elocom® creme indeholder stearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

- Du må kun bruge Elocom® creme efter lægens anvisning.

Amning:

- Du kan bruge Elocom® creme i korte perioder, selv om du ammer. Spørg lægen.
- Du bør ikke bruge Elocom® creme på brystet mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Elocom® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Elocom®

Dosering

Voksne:

Påsmør et tyndt lag én gang dagligt.

Cremen bruges på meget tør, skællet og sprukken hud.

Børn:

Du må kun bruge Elocom® til børn efter lægens anvisning.

Når du har fået den ønskede virkning af Elocom® creme, bør du gradvist trappe ud af behandlingen efter vejledning fra din læge.

Vask hænder efter påsmøring, med mindre du skal behandle hænderne. Du kan eventuelt bruge handsker til påsmøring. Undgå at få Elocom® i øjnene.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du brugt for meget Elocom®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Elocom® creme, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

I sjældne tilfælde efter langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i



huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

Har du glemt at bruge Elocom®

Smør et tyndt lag Elocom® creme på, så snart du kommer i tanke om det, og fortsæt derefter som lægen har anvist.

4. Bivirkninger

Elocom® creme kan som al anden medicin give bivirkninger.

Bivirkninger kommer især hvis du bruger lufttæt forbindelse og ved lang tids behandling.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 1000 behandlede):

- Binyrebarkhæmning. Bivirkninger forbundet med binyrebarkbehandling i tabletform kan også forekomme efter anvendelse af binyrebarkhormoner til lokalt brug, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af store hudområder. Dette gælder særligt børn og nyfødte. Spørg lægen.

Hyppighed er ikke kendt:

- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Betændelse i det behandlede område.
- Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker.
- Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme på næse, kinder, pande og hage (steroid-rosacea).
- Små punktformede eller større blødninger i huden.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 1000 behandlede):

- Uønsket hårvækst, overfølsomhed over for det aktive stof i Elocom®.

Meget sjældne bivirkninger (det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Prikken/svien, kløe.

Hyppighed er ikke kendt:

- Sløring af betændelse i huden, forværring af betændelse i huden.
- Udvidelse af de små blodkar i huden.
- Rødme.
- Udslæt med bumser.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring

- Opbevar Elocom® utilgængeligt for børn.
- Brug ikke Elocom® efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Elocom® indeholder

Det virksomme indholdsstof i Elocom® er:
Mometasonfuroat 1 mg/g
De øvrige indholdsstoffer er:
Hvid vaselin, hvidt voks, propylenglycolmonostearat, stearylalkohol og cetareth-20, hexylenglycol, aluminiumstivelseoctenylsuccinat, phosphorsyre, titandioxid (E 171) og rensset vand.

Produktets styrke og pakningsstørrelse:
Elocom® creme 0,1 % fås i tuber med 20 g og 60 g.

Det er ikke sikkert at begge pakningsstørrelser markedsføres.

Markedsføring i Danmark

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com

Elocom® svarer til Elocon®.

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.



(02) 1957701

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2500