

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ESERTIA®

10 mg, 15 mg og 20 mg filmovertrukne tabletter

Escitalopram

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at æse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Esertia® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Esertia®.
3. Sådan skal du tage Esertia®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Esertia® er et middel mod depression. Det tilhører en gruppe af medicin, som kaldes SSRI.

Esertia® virker ved at øge mængden af et vigtigt stof (serotonin) i hjernen. Forstyrrelser i hjernens serotoninssystem er en vigtig faktor ved depression og beslægtede sygdomme.

Du kan få Esertia® til behandling af moderat til svær depression, panikangst, socialangst (også kaldet socialfobi), generaliseret angst, tvangstanker og tvangshandlinger.

Lægen kan have givet dig Esertia® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Esertia®

Tag ikke Esertia®

- hvis du er overfølsom over for escitalopram, eller et af de øvrige indholdsstoffer.
- hvis du tager en type medicin kaldet MAO-hæmmere, som også bruges mod depression (f.eks. moclobemid), mod infektioner (linezolid) eller Parkinsons sygdom (selegilin).
- hvis du er født med eller har haft tilfælde af unormal hjerterytme(set på EKG; en undersøgelse til evaluering af, hvordan hjertet fungerer).
- hvis du tager medicin, mod et hjerterytmeproblem eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen (se også afsnittet "Brug af anden medicin" nedenfor).

Vær ekstra forsigtig med at tage Esertia®

- Hvis du lider af eller har lidt af hjerteproblemer eller for nylig har haft hjerteanfald.
- Hvis du har en lav hvilepuls, og/eller du ved, at du kan have saltmangel som følge af langvarig alvorlig diarré og opkastning (kvalme) eller brug af diuretika (vanddrivende medicin).
- Hvis du oplever hurtig eller uregelmæssig hjertebanken, besvimelse, kollaps eller svimmelhed, når du rejser dig op. Dette kan tyde på unormal hjerterytme.

Inden du tager Esertia® skal du fortælle lægen, hvis du har:

- epilepsi,
- mani/hypomani (unormal opstemthed og uro),
- sukkersyge,
- dårlig lever, f.eks. skrumpelever,
- dårlige nyrer,
- blødningsforstyrrelser (blødning fra hud og slimhinder).
- hjertesygdom,
- nedsat natrium i blodet.

Du bør også fortælle lægen, hvis du får ECT behandlinger (elektrochok) eller hvis du tager et naturlægemiddel med prikbladet perikon (Hypericum perforatum).

Kontakt straks lægen, hvis:

- Du får uregelmæssig puls på grund af ekstraslag. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning.
- Du får feber, muskelstivhed eller rysten, forvirring, irritation, sygelig opstemthed og uro. Tilstanden kan være livsfarlig. Kontakt derfor straks læge eller skadestue.
- Du bliver manisk (sygeligt opstemt og urolig).
- Du bliver rastløs på en ubehagelig måde i de første uger af behandlingen.
- Du får kramper eller din epilepsi bliver værre. Behandling med Esertia bør stoppes, hvis du får anfald for første gang, eller hvis anfaldshyppigheden stiger.

Børn og unge under 18 år

Børn og unge under 18 år bør normalt ikke få Esertia®. Lægen kan dog vælge at ordinere Esertia® til patienter under 18 år, hvis han mener fordelene opvejer risikoen ved behandlingen. Ved behandling af børn og unge under 18 år med Esertia® skal du være særligt opmærksom på symptomer som selvmordstanker og fjendtlighed (især aggressiv, trodsig opførsel og vrede). Hvis du oplever disse symptomer eller bemærker en forværring, kontakt da straks lægen, da der er en øget risiko for selvmordsforsøg hos unge, når de får medicin mod depression.

Det er usikkert, hvordan Esertia® påvirker børns og unges vækst, modning, intelligens- og adfærdsmæssige udvikling.

Selvmodstanker og forværring af din depression eller angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du få selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når du begynder at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen er et stykke tid om at virke. Det kan ofte tage omkring 14 dage, men nogle gange længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

- Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv.
- Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist, at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord eller tanker om at gøre skade på dig selv, **bør du straks kontakte din læge eller hospitalet.**

Det kan måske være en hjælp at fortælle en ven eller pårørende, at du er deprimeret eller angst, og bede dem om at læse denne indlægsseddel.

Du kan eventuelt bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver bekymrede over ændringer i din opførsel.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Esertia®, og/eller Esertia® kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

TAG IKKE Esertia®, hvis du får medicin mod problemer med hjerterytmen eller medicin, der kan påvirke hjerterytmen, f.eks. klasse IA og III antiarytmika, antipsykotika (f.eks. fentiazinderivater, pimozid, haloperidol), tricykliske antidepressiva, visse antimikrobielle midler (f.eks. sparfloracin, moxifloxacin, erythromycin IV, pentamidin, malariabehandling, især halofantrin), visse antihistaminer (astemizol, mizolastine). Hvis du har spørgsmål til dette, så kontakt din læge.

Du bør undgå at tage Esertia® samtidig med anden medicin mod depression, f.eks. MAO-hæmmere. Hvis du skal skifte mellem de to typer af medicin, skal der være en pause på 7-14 dage. Spørg lægen hvor lang pausen skal være.

Tal med din læge, hvis du tager:

- en type medicin kaldet MAO-hæmmere, som også bruges mod depression (f.eks. moclobemid), mod infektioner (linezolid) eller Parkinsons sygdom (selegilin). Du må normalt ikke tage mere end 10 mg selegilin dagligt, mens du får Esertia®.
- Medicin mod stærke smerter (tramadol).
- Medicin mod migræne (f.eks. sumatriptan og andre triptaner).
- Medicin mod sindslidelser (f.eks. fentiazin, haloperidol, risperidon, thioridazin).
- Medicin mod mani og depression (lithium).
- Medicin mod for meget mavesyre og mavesår (omeprazol, esomeprazol, cimetidin, lansoprazol).
- Medicin mod infektioner (f.eks. sparfloracin, moxifloxacin, erythromycin, pentamidin).
- Medicin mod malaria (mefloquin).
- Blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin).
- Anden medicin mod depression (f.eks. fluvoxamin, clomipramin, desipramin og nortriptylin).
- Visse proteindrikke mod nedsat appetit eller kosttilskud, som indeholder aminosyren tryptophan.
- Medicin til at lindre smerter eller fortynde blodet (nonsteroidale antiinflammatoriske midler (NSAID)).
- Hjertemedicin og medicin for blodtrykket (flecainid, propafenon og metoprolol).
- Medicin til rygeafvænnning (bupropion).
- Naturlægemidler, som indeholder prikbladet perikon (Hypericum perforatum).

Anvender du medicin, som er kendt for at forlænge QT- intervallet, må du ikke samtidigt tage Esertia.

Der skal udvises forsigtighed ved anvendelse af Esertia, hvis du tillige får medicin, som kan nedsætte hhv. kalium eller magnesium i blodet.

Brug af Esertia® sammen med mad og drikke

- Du kan tage Esertia® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
- Du bør ikke indtage alkohol, mens du er i behandling med Esertia®.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

- Hvis du er gravid, må du kun tage Esertia® efter aftale med lægen.
- Hvis du tager Esertia® under de sidste 3 måneder af graviditeten, skal du være opmærksom på, at det kan indebære følgende virkninger for den nyfødte: Åndedrætsbesvær, blålig hud, uregelmæssig vejtrækning med vejtrækningspauser, kramper, temperatursvingninger, spiseproblemer, opkastning, lavt blodsukker, stive eller slappe muskler, voldsomme reflekser, skælven, nervøsitet, irritabilitet, apati, vedvarende gråd, søvnighed og søvnbesvær. Kontakt omgående lægen, hvis dit nyfødte barn har nogle af disse symptomer.
- Fortæl din jordemoder og/eller læge, at du tager Esertia®. Når medicin som Esertia® tages under graviditeten, især i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer starter normalt inden for 24 timer efter fødslen. Hvis dette sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller læge.
- Hvis du tager Esertia®, mens du er gravid, må du ikke stoppe behandlingen brat.
- Citalopram (et lægemiddel lig escitalopram) har i dyreforsøg nedsat sædkvaliteten. Teoretisk set kan dette påvirke fertiliteten, men der er ikke set en påvirkning af fertiliteten hos mennesker.

Amning:

- Hvis du ammer, må du kun tage Esertia® efter aftale med lægen.
- Esertia® går over i modermælken. Du bør stoppe med at amme, hvis behandling med Esertia® er nødvendig. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er uvist, om Esertia® påvirker arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Du skal derfor være opmærksom på, hvordan medicinen påvirker dig. Der er en mulig risiko for, at Esertia® kan påvirke din evne til at køre bil og betjene maskiner.

3. Sådan skal du tage Esertia®

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Du skal tage Esertia® tabletter én gang dagligt.

Tabletterne fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine tabletter til alle de anførte doseringer.

Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.

Den sædvanlige dosis er Voksne:

Moderat til svær depression

Den sædvanlige dosis er 1 tablet på 10 mg dagligt. Din læge kan øge denne dosis til højst 1 tablet på 20 mg dagligt. Der går som regel 2-4 uger før virkning indtræffer, og det er bedst at fortsætte behandlingen i mindst 6 måneder efter symptomerne er forsvundet.

Panikanøst

Den sædvanlige startdosis er 1 tablet på 5 mg dagligt i den første uge. Herefter bliver dosis øget til 1 tablet på 10 mg dagligt. Din læge kan øge denne dosis til højst 1 tablet på 20 mg dagligt. Der går som regel 3 måneder før du får den bedste virkning, og det er bedst at fortsætte behandlingen i adskillige måneder. Tal med lægen.

Socialanøst

Den sædvanlige dosis er 1 tablet på 10 mg dagligt. Din læge kan efter 2-4 uger vælge at nedsætte dosis til 1 tablet på 5 mg eller øge dosis til højst 1 tablet på 20 mg. Der går som regel 2-4 uger før virkning indtræffer, og behandlingen varer normalt 12 uger. Din læge kan vælge at forlænge behandlingen for at forhindre tilbagefald.

Generaliseret anøst

Den sædvanlige startdosis er 1 tablet på 10 mg dagligt. Din læge kan øge denne dosis til højst 1 tablet på 20 mg dagligt. Din læge kan vælge at forlænge behandlingen for at forhindre tilbagefald.

Tvangstanker og tvangshandlinger

Den sædvanlige startdosis er 1 tablet på 10 mg dagligt. Din læge kan øge denne dosis til højst 20 mg dagligt. Da lidelsen er en kronisk tilstand, bør man behandles i tilstrækkelig lang tid for at sikre, at man er symptomfri.

Ældre (over 65 år):

Det anbefales at starte med en dosis på 5 mg, der tages én gang dagligt. Lægen kan øge dosis til 10 mg én gang dagligt.

Børn og unge (under 18 år):

Esertia® bør ikke anvendes til behandling af børn og unge under 18 år.

Nedsat nyrefunktion:

Ved let eller moderat nedsat nyrefunktion er det normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Ved alvorlig nedsat nyrefunktion skal Esertia® anvendes med forsigtighed. Tal med lægen.

Nedsat leverfunktion:

Den sædvanlige startdosis er på 5 mg dagligt i de første 2 uger, hvis du har mild til moderat nedsat leverfunktion. Din læge kan vælge at øge dosis til 10 mg. Ved alvorlig nedsat leverfunktion skal Esertia® anvendes med forsigtighed. Tal med lægen.

Tag altid Esertia® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Hvis du har taget for mange Esertia®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Esertia®, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer:

Svimmelhed, rysten, rastløs uro, for lavt blodtryk, forstyrrelser i hjerterytmen med hurtig eller uregelmæssig puls, kvalme/opkastning, forstyrrelser i salt- og væskebalance. I sjældne tilfælde er der set kramper, koma og serotonin syndrom med symptomerne ophidselse, forvirring, muskelrykninger, forstærkede reflekser, problemer med at styre arme og ben, rystelser, feber, øget sved og diaré.

Hvis du har glemt at tage Esertia®

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis. Tal med lægen, hvis du har glemt at tage flere doser i træk.

Hvis du holder op med at tage Esertia®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.

Du bør undgå pludseligt at stoppe med at tage Esertia®.

Når du skal stoppe med at tage Esertia®, bør det ske gradvist over mindst 1-2 uger, for at nedsætte risikoen for ophørssymptomer. Risikoen er større efter langtidsbrug af Esertia® eller ved store doser eller for hurtig nedtrapning af dosis. De fleste oplever, at symptomerne er milde og aftager af sig selv i løbet af to uger. Hos nogle patienter kan de dog være generende eller langvarige (2-3 måneder eller længere). Kontakt lægen, hvis du får svære ophørssymptomer, når du holder op med at tage Esertia®.

Ophørssymptomer:

Svimmelhed, føleforstyrrelser inklusive prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden og følelse af at få elektrisk stød, søvnforstyrrelser (voldsomme drømme, søvnløshed), rastløs uro eller angst, kvalme og/eller opkastning, rysten, forvirring, svedtendens, hovedpine, diaré, hjertebanken, følelsesmæssig uligevægtighed, irritabilitet og synsforstyrrelser.

Kontakt straks lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Esertia® er stoppet.

4. Bivirkninger

Esertia® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkninger forekommer hyppigst i løbet af den første eller anden uge af behandlingen og aftager i intensitet og hyppighed, når du fortsætter behandlingen.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Søvnigende bevidsthedssvækkelse. Kontakt lægen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Blodig opkastning og/eller sort afføring på grund af blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Ophidselse, rysten, muskelkrampe, feber, koma (serotonerg syndrom). Kontakt læge eller skadestue, ring evt. 112.
- Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er rapporteret under behandling med Esertia® eller kort efter behandlingsophør (se pkt.2). Kontakt læge eller skadestue, ring evt. 112.
- Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.
- Krampe. Kontakt læge eller skadestue, ring evt. 112.
- Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt straks læge.
- Vedvarende, ofte smertefuld rejsning af penis. Kontakt læge eller skadestue.

Hvis du oplever nogle af følgende symptomer, skal du stoppe med at tage Esertia® og kontakte din læge eller hospitalet omgående:

- Hurtige, uregelmæssige hjerteslag, besvimelse, som kan være symptom på en livstruende tilstand, der kaldes Torsade de Pointes.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Kvalme.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Nedsat appetit, øget appetit, vægtøgning.
- Forstoppelse, opkastning, diarré.
- Angst, uro, unormale drømme.
- Nedsat sexlyst hos både mænd og kvinder, manglende orgasme hos kvinder, manglende sædafgang, impotens.
- Træthed, søvnløshed, rysten, svimmelhed.
- Bihulebetændelse, gaben, feber, øget svedtendens.
- Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i tænderne. Hvis du tager Esertia® i mere end 2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du ikke får huller i tænderne. Tal evt. med din tandlæge.
- Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden, ledsmerter, muskelsmerter.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Tænderskæren, rastløs uro, forvirring, nervøsitet, panikanfald.
- Smagsforstyrrelser, søvnforstyrrelser, besvimelse.
- Synsforstyrrelser, stor pupil, susen for ørerne (tinnitus), næseblod.
- Nældefeber, udslæt, hudkløe, hårtab, vægttab.
- Vand i kroppen.
- Kvinder: Uregelmæssig, kraftig blødning, længere og/eller kraftigere menstruationer.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Aggressivitet, uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person.

Nogle patienter har rapporteret (frekvens kan ikke estimeres ud fra tilgængelige data):

- Ændring af hjerterytmen (kaldet 'forlænget QT-interval', som kan ses på et elektrokardiogram (EKG) - hjertets elektriske aktivitet.
- Sygelig opstemthed (mani).
- Bevægelsesforstyrrelser som f.eks. ufrivillige bevægelser.
- Svimmelhed, evt. besvimelse når du rejser dig fra siddende eller liggende stilling pga. lavt blodtryk.
- Blodudtrædning under huden.
- Besvær med at lade vandet, evt. vandladningsstop. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Mælkeflåd.
- Nedsat udskillelse af antidiuretisk hormon (ADH).
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring, pga. for lavt natriumindhold i blodet. For lavt natrium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med muskelkrampe og koma. Tal med lægen.
- En forøget risiko for knoglebrud er set hos patienter, som tager denne type medicin.
- Appetitmangel/madlede.
- Rokkende, vridende bevægelser især med benene.

Esertia® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. levertal, som igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via adressen Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk eller E-mail: sss@sst.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

- Opbevar Esertia® utilgængeligt for børn.
- Tag ikke Esertia® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Esertia® 10 mg, 15 mg og 20 mg filmovertukne tabletter indeholder:

Aktivt stof:

Escitalopramoxalat svarende til escitalopram 10 mg, 15 mg eller 20 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Mikrokrystallinsk cellulose, kolloid vandfri silica, talcum, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat.

Filmovertrek: Hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E 171).

Pakningsstørrelser:

Esertia® fås i:

Esertia® 10 mg i pakninger med 28, 56, 98 og 196 filmovertukne tabletter.

Esertia® 15 mg i pakninger med 28 og 98 filmovertukne tabletter.

Esertia® 20 mg i pakninger med 28, 56 og 98 filmovertukne tabletter.

I Danmark markedsføres Esertia® også som Ciprtalex®.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 06/2013

24362-01-08