

FUCIDIN®

Crema 2 %

Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Lægen har ordineret Fucidin® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Fucidin®.
3. Sådan skal du bruge Fucidin®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Virkemåde

Fucidin® indeholder et antibiotikum, der virker på bakterier, der kan give betændelse i huden.

Medicinen anvendes til

Du kan bruge Fucidin® mod betændelse, der skyldes bakterier, som Fucidin® virker på.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Fucidin®

Brug ikke Fucidin® hvis

Du er overfølsom over for fusidinsyre eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin®.

Brug af anden medicin

Du kan bruge Fucidin® sammen med anden medicin.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Fucidin®

Denne medicin indeholder butylhydroxyanisol E320, cetylalkohol og kaliumsorbat E202, der kan give lokalt hududslæt (fx kontakteksem). Butylhydroxyanisol E320 kan desuden give irritation af øjne og slimhinder.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun bruge Fucidin® efter lægens anvisning.

Amning:

Du kan amme, selv om du bruger Fucidin®. Du bør dog ikke smøre det på brystvorterne før amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Fucidin® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Fucidin®

Dosering

Voksne og børn:

Smør et tyndt lag Fucidin® på huden to til tre gange dagligt.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du brugt for meget Fucidin®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Fucidin®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Fucidin®.

Har du glemt at bruge Fucidin®

Glemmer du at bruge en dosis, fortsættes med almindelig dosering. Brug aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Fucidin® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppighed ikke kendt:

Hævelse af hud og slimhinder i ansigt, i munden og i svelget. Kontakt straks læge eller skadestue, ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Udslæt, irritation af huden, kløe, brændende eller stikkende fornemmelse på huden, rødmen af huden, tør hud.

Hyppighed ikke kendt:

Eksem, nældefeber, rødme af ansigt med hævelse omkring øjnene.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring

- Opbevar Fucidin® utilgængeligt for børn.
- Anvend ikke Fucidin® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information

Fucidin® indeholder

Det virksomme indholdsstof i Fucidin® er:

Fusidinsyre 20 mg/g.

De øvrige indholdsstoffer er:

Butylhydroxyanisol (E 320), cetylalkohol, glycerol, kaliumsorbat (E 202), paraffinolie, polysorbat 60, hvid vaselin og rensat vand.

Angivelse af pakningsstørrelse:

Fucidin® 2 % creme findes i 15 g og 30 g.

Det er ikke sikkert at begge pakningsstørrelser markedsføres.

Markedsføring i Danmark

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Fucidin® er et registreret varemærke, der tilhører LEO Pharma A/S



(03) 1030801

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2500