

Forzaar® 100 mg/25 mg filmovertrukne tabletter

losartankalium/hydrochlorthiazid

0219485905

Forzaar® markedsføres i Danmark af Merck sharp and Dohme som Cozaar® Comp. Forte

Forzaar® er et registreret varemærke, som tilhører E.I. du Nemours and Company, Wilmington, Delaware, USA

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Forzaar® til Dem personligt. Lad derfor være med at give Forzaar® til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Forzaar®'s virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Forzaar®
3. Sådan skal De bruge Forzaar®
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Forzaar®
6. Yderligere oplysninger

1. Forzaar®'s virkning og hvad De skal bruge det til

- Forzaar® er en kombination af en angiotensin II antagonist (losartankalium) og et vanddrivende middel (hydrochlorthiazid),
- De kan bruge Forzaar® til at sænke blodtrykket.

Lægen kan have foretaget anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Forzaar®

Tag ikke Forzaar® hvis De:

- er overfølsom overfor losartan, hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Forzaar®.
- er gravid eller planlægger at blive det.
- ammer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Forzaar®

Tal med lægen inden De bruger Forzaar®, hvis De har:

- sygdom i nyre- eller lever
- allergi
- mani og tager lithium
- diabetes

- urinsyreigt (arthritis urica)
- astma
- bindevævssygdom (SLE, systemisk lupus erythematosus)
- mangel på væske, fx hvis De bruger vanddrivende medicin
- haft diaré eller opkastning.

Oplys altid ved blod- og urinundersøgelser, at De bruger Forzaar®.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

De kan bruge Forzaar® sammen med anden medicin, men tal først med lægen, hvis De bruger:

- vanddrivende medicin
- medicin mod smerter og gigt (NSAID, COX-2 hæmmere)
- medicin mod mani (lithium)
- medicin mod epilepsi
- narkotiske stoffer eller drikker alkohol
- insulin eller tabletter mod diabetes (sulfonylurinstoffer)
- midler mod for meget fedt i blodet (colestipol, cholestyramin)
- binyrebarkhormoner (kortikosteroider)
- muskelafslappende medicin

De kan bruge Forzaar® sammen med anden medicin mod forhøjet blodtryk.

Kontakt lægen. Det er eventuelt nødvendigt at justere dosis.

Anden medicin kan ændre virkningen af Forzaar®, og Forzaar® kan ændre virkningen af anden medicin. Det er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis De ønsker yderligere oplysning.

Brug af Forzaar® sammen med mad og drikke

De kan bruge Forzaar® både sammen med eller uden mad og drikke.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De må ikke bruge Forzaar®, hvis De er gravid. Hvis De er gravid eller bliver gravid, mens De bruger Forzaar®, skal De afbryde behandlingen og kontakte lægen hurtigst muligt. Tal med Deres læge, hvis De planlægger at blive gravid.

Amning

Erfaringerne med Forzaar® er begrænsede. De bør derfor ikke bruge Forzaar®, hvis De ammer. Spørg lægen. Hvis behandling er nødvendig, skal De holde op med at amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Forzaar® kan hos enkelte give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Forzaar®

Forzaar® indeholder laktose. Kontakt lægen, før De bruger denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal De bruge Forzaar®

Brug altid Forzaar® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Dosering

Voksne: 1 tablet (100 mg) daglig. Højeste dosis er 1 tablet (100 mg) daglig. Som regel falder blodtrykket i løbet af de første 3 uger af behandlingen.

De skal tage tabletten på samme tid hver dag.

Ældre:

Det er ikke nødvendig at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

De skal ikke bruge Forzaar®, hvis Deres nyrer eller lever ikke fungerer normalt.

Hvis De har taget for mange Forzaar® filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Forzaar®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomer på overdosering er lavt blodtryk, hurtig eller langsom puls.

Hvis De har glemt at tage Forzaar®

Hvis De har glemt at tage en tablet, skal De springe den glemte tablet over. Tag ikke dobbelt dosis. Tag den næste tablet til sædvanlig tid.

Hvis De holder op med at tage Forzaar®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

4. Bivirkninger

Forzaar® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hvis De får alvorlige bivirkninger, skal De kontakte Deres læge.

Alvorlige bivirkninger:

Sjældnen til meget sjældnen (det forekommer hos færre end 1 ud af 1000 patienter):

- Forandringer i blodet, der kan vise sig ved blødning fra huden og slimhinder og blå mærker samt infektioner, feber, træthed og bleghed. Søg straks læge.
- Overfølsomhedsreaktion f.eks. pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær, besvimelse og feber. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hævelse af tunge, læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Betændelse i bugspytkirtlen (voldsomme mavesmerter og feber). Søg straks læge eller skadestue.
- Gulsot og leversygdom. Kontakt læge eller skadestue.
- Åndenød, hoste, smerter eller ubehag i brystet pga. vand i lungerne. Ring 112.
- Lungebetændelse. Kontakt læge.
- Alvorlig nyresygdom med nyresvigt. Kontakt lægen.

Hyppighed ikke oplyst:

- Kraftig afskalning eller afstødning af hud. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelig til meget almindelig (det forekommer hos flere end 1 ud af 100 patienter):

- Hovedpine, svimmelhed, træthed,
- Væskeophobninger, hjertebanken,
- Hoste, bihulebetændelse,
- Mavesmerter,
- Udslæt,
- Rygsmerter.

Ikke almindelig (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter):

- Muskelsvaghed, forvirring, talebesvær pga. for højt eller for lavt kaliumindhold i blodet. For højet eller for lavt kaliumindhold i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
- Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga. for lavt natriumindhold i blodet. For lavt natriumindhold i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt med forstyrrelser i hjertets rytme. Tal med lægen.
- Uregelmæssig puls pga. for lavt magnesiumindhold i blodet.

For lavt magnesiumindhold i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorligt med forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.

- Tørst, nedsat kraft i arme og ben, træthed og forstoppelse pga. for højt kalkindhold i blodet. For højet kalkindhold i blodet kan medføre beskadigelse af nyrerne. Tal med lægen.
- Gigt.
- Hyppig vandladning, tørst, træthed pga. højt blodsukker (blodglukose) hos diabetikere. Det kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med lægen.
- Svimmelhed, når De rejser Dem op.
- Appetitmangel, irritation i maven, krampe.
- Kvalme, opkastning, anfaldsvise mavesmerter, forstoppelse.

Sjældnen til meget sjældnen (det forekommer hos færre end 1 ud af 1000 patienter):

- Feber, træthed, sløvhed pga. betændelse i blodkar. Kan være alvorligt. Kontakt læge.
- Migræne.
- Føleforstyrrelser/prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.
- Forbigående sløret syn.
- Nældefeber, sygelig rødfarvning af huden.
- Øget hudfølsomhed for lys, kløe.
- Impotens.

Hyppighed ikke oplyst:

- Forøget mængde af fedt i blodet, gulsyn, betændelse i blodkar (nekrotisk angitis), betændelse i en spytkirtel.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger som ikke er nævnt her.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved eller er generende. Nogle bivirkninger kræver behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. Sådan opbevarer De Forzaar®

Opbevar Forzaar® utilgængeligt for børn.

Brug ikke Forzaar® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Forzaar® 100 mg/25 mg fillovertrukne tabletter indeholder:

Aktive stoffer: Losartankalium 100 mg og hydrochlorthiazid 25 mg.
Øvrige indholdsstoffer: MikrokrySTALLINSK cellulose, lactosemonohydrat, magnesiumstearat, pregelantineret stivelse, carnaubavoks, hydroxypropylcellulose, hypromellose, chinolingult (E 104) og titanoxid (E 171).

Forzaar®s udseende og pakningsstørrelse:

Forzaar® er en lysegul, oval fillovertrukken tablet mærket 747 på den ene side.

Forzaar® findes i pakningsstørrelserne 28 stk. og 98 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Paranova Danmark A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Industriparken 23-25, 2750 Ballerup

Denne indlægsseddel blev senest revideret juli 2008