

svarende til henholdsvis 4,56 mg eller 9,12 mg donepezil.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat, majsstivelse, mikrokrystallinsk cellulose, hydroxy-propylcellulose, magnesiumstearat, talkum, macrogol, hypromellose, titandioxid (E 171),
10 mg tabletten indeholder derudover jernoxid (E 172).

Pakningsstørrelser:

Memac® fås i:

Memac® 5 mg i pakninger med 28 og 98 tabletter.

Memac® 10 mg i pakninger med 28 og 98 tabletter.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com

I Danmark markedsføres Memac® også som Aricept®.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

MEMAC®

5 mg og 10 mg filmovertrukne tabletter

Donepezilhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Memac® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkningen af Memac® og hvad du skal bruge det til.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Memac®.
3. Sådan skal du tage Memac®.
4. Bivirkninger.
5. Sådan opbevarer du Memac®.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkningen af Memac® og hvad du skal bruge det til

- Memac® er et middel mod Alzheimers demens. Memac® tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes acetylcholinesterasehæmmere.
- Memac® virker ved at hæmme aktiviteten i et bestemt område af hjernen, som har betydning for symptomerne ved demens.
- Du skal tage Memac® mod Alzheimers demens i mild til mellemsvær grad.

Lægen kan have givet dig Memac® til anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Memac®

Tag ikke Memac®

- hvis du er overfølsom over for donepezilhydrochlorid, anden medicin af samme type (piperidinderivater) eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Memac®

Tal med lægen, inden du tager Memac®, hvis du

- har rytmeforstyrrelser i hjertet eller anden sygdom i hjertet.

- har eller har haft mavesår.
- har eller har haft astma eller anden lungesygdom.
- har problemer med kredsløbet.
- tager medicin mod smerter eller gigt (af typen NSAID fx ibuprofen eller diclofenac)

Kontakt lægen, hvis du får

- krampe eller besvimelsesanfald. Det kan være tegn på påvirkning af hjertet.
- problemer med vandladningen.
- bevægelsesforstyrrelser.

Vær opmærksom på

- Hvis du skal bedøves, skal du på forhånd fortælle lægen, at du tager Memac®.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Memac®. Det kan have betydning for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin


Tal med lægen, hvis du tager medicin mod

- svamp (ketoconazol, itraconazol)
- infektion (erythromycin)
- depression (fluoxetin)
- tuberkulose (rifampicin)
- epilepsi (phenytoin)
- epilepsi og ansigtsnervesmerter (carbamazepin)
- Parkinsons sygdom (muskelfaslappende stoffer og andre stoffer, som blokerer muskel- og nervefunktioner)
- samt medicin, som påvirker hjerterytmen (betablokkere).

Vær opmærksom på:

Hvis du skal bedøves (i narkose), skal du fortælle lægen, at du tager Memac®.

Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Memac®.



Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Memac®, og/eller Memac® kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette er normalt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Brug af Memac® sammen med mad og drikke

- Du kan tage Memac® i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.
- Du skal tage Memac® filmovertrukne tabletter med et glas vand.
- Du skal undgå at drikke alkohol, når du tager Memac®.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

- Hvis du er gravid, må du kun tage Memac® efter aftale med lægen.

Amning:

- Hvis du ammer, må du kun tage Memac® efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Memac® kan hos enkelte give bivirkninger som træthed, svimmelhed og muskelkrampe især i begyndelsen af behandlingen og ved øgning af dosis, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Memac®

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Memac®.

3. Sådan skal du tage Memac®

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Det er bedst at tage Memac® om aftenen lige inden sengetid.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Den sædvanlige startdosis: 1 tablet på 5 mg 1 gang daglig.
Efter en måneds tid vil lægen normalt vurdere, om dosis skal ændres.

Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis: 1 tablet på 10 mg 1 gang daglig.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Børn

Memac® anbefales ikke til børn.

Memac®, filmovertrukne tabletter fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine filmovertrukne tabletter til alle de anførte doseringer.

Tag altid Memac® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Hvis du har taget for mange Memac®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Memac®, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer:

- Alvorlig kvalme, opkastning, øget spyt-mængde, øget svedtendens, langsom puls, lavt blodtryk, nedsat vejrtrækning, kollaps og krampe.

- Øget muskelsvaghed er en mulighed, og denne kan være dødelig, hvis vejrtrækningsmusklerne er påvirket.

Hvis du har glemt at tage Memac®

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage Memac®

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.

4. Bivirkninger

Memac® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

- Ulykkestilfælde. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter)

- Krampeanfald. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Blodig opkastning og/eller sort afføring på grund af blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- Meget langsom puls. Tendens til besvimelse. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Påvirkning af leveren, evt. leverbetændelse og gulsot. Kontakt læge.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter)

- Diarre, kvalme, hovedpine.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

- Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge eller skadestue.
- Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.
- Rastløs uro, truende evt. voldelig adfærd. Kan være alvorlig tal. med lægen.

- Snue, nedsat appetit.
- Svimmelhed, søvnløshed.
- Opkastning, kvalme, forstyrrelser i mave/tarmkanalen.
- Udslæt, kløe.
- Muskelkrampe.
- Ufrivillig vandladning.
- Træthed, smerte.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 patienter)

- Langsom puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget langsom puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

- Bevægelsesforstyrrelser.

Memac® kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse blodprøver. De bliver normale igen, når behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. Sådan opbevarer du Memac®

- Opbevar Memac® utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Memac® over 30 °C.
- Tag ikke Memac® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Memac®, 5 mg og 10 mg filmovertrukne tabletter indeholder:
Donepezilhydrochlorid 5 mg eller 10 mg