

Indlægsseddel

FEBRIVAC DE VET

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension Vaccine mod virusenteritis og hvalpesyge hos mink.

Deklaration

1 ml (1 dosis) indeholder:

Aktivt stof

Minkparvovirus, stamme E-mink Fl, inaktiveret

mindst $10^{4,0}$ TCID₅₀

Distempervirus, stamme D 84/1, levende, attenueret

mindst $10^{3,7}$ TCID₅₀

Adjuvans

Aluminiumhydroxid

7,5 mg

Sterilt vand til 1 ml

Indikationer

Vaccination af mink mod hvalpesyge og virus enteritis.

Dyreart

Mink

Kontraindikationer

Dyr i dårlig almen tilstand bør ikke vaccineres.

Interaktioner

Vaccination tidligere end 6-8 ugers alder kan medføre at maternelle antistoffer forstyrrer aktiv immunisering via vaccination.

Sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug af andre vacciner er ikke undersøgt. Det anbefales derfor, at der ikke foretages andre vaccinationer 14 før og 14 dage efter vaccination med FEBRIVAC DE VET.

Dosering

Dosis: 1 ml subkutan.

Hvalpe efter uvaccinerede mødre vaccineres ved 4 - 6 ugers alderen.

Hvalpe efter vaccinerede mødre vaccineres efter 8 - 9 ugers alderen.

Årlig revaccination af avlsdyr mindst 1 måned før parring.

Ved hjælp af den vedlagte dobbeltkanyale overføres indholdet i suspensionsflasken til flasken med pulver.

Advarsel

- Vaccinen må ikke anvendes efter udløbsdato.
- Brugsfærdig vaccine bør anvendes inden for 1 time.
- Vaccinen må ikke fryses.
- Omrystes før brug.

Tillbageholdelse tid

0 dage.

Opbevaring

Vaccinen skal opbevares ved +2 °C til +8 °C.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Pakningsstørrelser

Htgl. 1 x 100 ds

Htgl. 1 x 250 ds

Htgl. 4 x 250 doses

Registreringsindehaver

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

D-06861 Dessau-Roßlau

Tyskland

Repræsentant:

NordVacc Läkemedel Danmark

Korskildelund 6

2670 Greve

Danmark