

REQUIP®

Filmovertrukne tabletter 1 mg, 2 mg og 5 mg

Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Lægen har ordineret Requip® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Requip®.
3. Sådan skal du tage Requip®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse

Virkemåde

- Requip® virker ved at påvirke balancen mellem forskellige signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og acetylkolin.
- Requip® øger dopamins virkning, hvorved muskelstivhed og rysten mindskes.

Medicinen anvendes til

Behandling af Parkinsons sygdom, alene eller i kombination med anden medicin til behandling af Parkinsons sygdom, for at gøre behandlingen mere effektiv.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Requip®

Tag ikke Requip® hvis

- Du er overfølsom over for ropinirol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Requip®.
- Du har svært nedsat nyrefunktion eller nedsat leverfunktion.

Særlige forholdsregler

- I sjældne tilfælde er behandling med ropinirol (det virksomme indholdsstof) mod Parkinsons sygdom sat i forbindelse med udtalt søvnighed og episoder, hvor patienten pludselig falder i søvn, i nogle tilfælde uden forudgående advarselssignaler. Dette skal man være opmærksom på, hvis man skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. Nedsættelse eller ophør af behandlingen bør overvejes. Spørg lægen.
- Hvis du lider af hjertesygdomme bør du regelmæssigt få målt dit blodtryk, navnlig i begyndelsen af behandlingen.
- Patienter med psykiatriske eller psykotiske sindslidelser, bør kun behandles med Requip® såfremt fordelene opvejer risici.
- Sygelig spilletrang og øget seksualitet er set hos patienter i behandling med Requip® mod Parkinsons sygdom. Dette er især set ved høje doser og er generelt forsvundet ved nedsættelse af dosis eller ved behandlingsophør.
- Hvis du tidligere har haft tvangshandlinger fremkaldt af tvangstanter, skal du tale med lægen inden du tager Requip®.
- Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se "Brug af anden medicin".

Brug af anden medicin

- Du kan tage Requip® sammen med anden medicin, men tal med din læge, hvis du får:
 - Neuroleptika og andre central aktive dopamin agonister såsom sulpirid eller metoclopramid (medicin mod sindslidelser, kvalme og opkastning). Spørg lægen.
 - Østrogener (hormoner).
 - Ciprofloxacin og enoxacin (mod infektion).
 - Fluvoxamin (mod depression).

Fortæl lægen om du påbegynder eller ophører med rygning, da det kan være nødvendigt at justere dosis.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Requip®

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Requip®.

Brug af Requip® sammen med mad og drikkevarer

Det er bedst at tage Requip® sammen med maden.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du må kun tage Requip® efter lægens anvisning.

Amning:

Du må ikke amme hvis du tager Requip®.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Requip® kan give bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Patienter, der har oplevet udtalt søvnighed eller episoder, hvor de pludselig falder i søvn, skal undlade at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3. Sådan skal du tage Requip®

Dosering

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Voksne:

Startdosis er 0,25 mg tre gange dagligt i én uge. Derefter kan dosis forøges i spring på 0,25 mg tre gange dagligt på følgende måde:

Uge 1 tages 0,25 mg tre gange dagligt.

Uge 2 tages 0,5 mg tre gange dagligt.

Uge 3 tages 0,75 mg tre gange dagligt.

Uge 4 tages 1 mg tre gange dagligt.

Efter opstart af behandlingen, kan dosis øges ugentligt med 0,5 mg-1 mg tre gange dagligt.

Hvis der ikke opnås tilstrækkelig virkning kan dosis øges til maksimalt 24 mg/dag.

Requip® kan også kombineres med anden medicin mod Parkinsons sygdom.

Behandlingsstop skal foregå gradvist over en periode på en uge. Spørg lægen.

Børn og unge:

Du bør ikke bruge Requip® til børn og unge under 18 år, da sikkerhed og effekt ikke er undersøgt.

Ældre:

Det er her nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens anvisninger.

Mild til moderat nedsat nyrefunktion:

Det er ikke nødvendigt at justere dosis. Du skal følge lægens anvisninger.

Ikke alle doseringsanbefalinger kan følges med Requip® 1 mg, 2 mg eller 5 mg.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for mange Requip®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Requip®, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Har du glemt at tage Requip®

Glemmer du at tage en dosis, fortsættes med almindelig dosering. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger

Requip® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Tilstand af søvnliggende bevidsthedssvækkelse, hvorfra personen kun kan vækkes delvist og forbigående ved kraftig tiltale.
- Besvimelse.
- Ufrivillige bevægelsesforstyrrelser.
- Kvalme.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hallucinationer.
- Forvirring.
- Svimmelhed.
- Mavesmerter, opkastning og halsbrand.
- Væskeophobning i benene.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Psykiske reaktioner (andre end hallucinationer) inklusive delirium, vrangforestillinger og paranoia.
- Udtalt træthed i dagtimerne og episoder, hvor patienten pludselig falder i søvn.
- Lavt blodtryk samt ved stillingsskift pludseligt opstået lavt blodtryk, der i nogle tilfælde fører til besvimelse.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

- Lever reaktioner og øgede leverenzzymer.

Der er yderligere set sygelig spilletrang og øget seksualitet samt leverreaktioner (især forhøjede leverenzzymer).

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring

- Opbevar Requip® utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Requip® over 25 °C.
- Opbevares i original emballage for at beskytte lægemidlet mod lys og fugt.
- Tag ikke Requip® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information

Requip® indeholder

Det virksomme indholdsstof i Requip® er:

Ropinirolhydrochlorid svarende til ropinirol 1 mg, 2 mg eller 5 mg.

De øvrige indholdsstoffer er:

Lactosemonohydrat, mikrokrySTALLinsk cellulose, natriumcroscarmellose, magnesiumstearat, hydroxypropylmethylcellulose, polyethylenglykol og titandioxid (E 171).

Yderligere i 2 mg:

Jernoxid (E 172).

Yderligere i 5 mg:

Indigotin I (E 132) og polysorbat 80 (E 433).

Markedsføring i Danmark

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Requip® er et registreret varemærke, der tilhører The GlaxoSmith-Kline Group of Companies.



(03) 1083601

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700