

SEMAP®

Tabletter 20 mg

Læs denne information godt igennem før du begynder at tage medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
Lægen har ordineret Semap® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Semap®.
3. Sådan skal du tage Semap®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse.

Virkemåde

- Semap® er et middel mod psykoser.
- Virker beroligende og antipsykotisk.

Medicinen anvendes til

Psykotiske tilstande, dog ikke depressioner.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du tager Semap®.

Tag ikke Semap® hvis

Du er overfølsom over for penfluridol (det virk-somme stof) eller et eller flere af de øvrige ind-holdsstoffer i Semap®.

Særlige forholdsregler

- Ved behandling med Semap® bør der udvises forsigtighed ved grøn stær og forstørrelse af blærehalskirtlen.
- Der vil være risiko for nedsættelse af krampe-tærskel.
- Kombination med stoffer, som virker sløvende, specielt alkohol og visse beroligende og kram-pestillende midler (barbiturater), bør undgås.

Brug af Semap® sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Semap® sammen med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Semap®

Dette lægemiddel indeholder lactose og sac-charose. Hvis din læge har fortalt dig at du lider af intolerance over for nogle sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Semap®

Graviditet og amning

Åf vejledning hos lægen eller på apoteket før du tager nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan tage Semap® under graviditet.

Amning:

Du kan amme, selv om du tager Semap®.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Semap® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Hvis flere lægemidler anvendes samtidig, kan de påvirke effekten af hinanden. Kontakt lægen, hvis du anvender et af følgende læge-midler samtidig med Semap®, da dosis eventuelt skal justeres:

- Visse midler mod depression (tricycliske antidepressiva).
- Levodopa (middel mod parkinsonisme).
- Dopamin (hjertestimulerende middel).

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du tage Semap®.

Dosering

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Voksne:

1-3 tabletter én gang ugentligt. Dosering er individuel.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for mange Semap®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Semap®, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet.

Symptomer:

Bevidsthedssvækkelse stigende til koma og evt. hæmning af vejtrækningen. Endvidere epilepsilignende krampe, for lavt blodtryk, hjerterytme-forstyrrelser, hurtig hjerterefrekvens, mundtørhed og synsforstyrrelser.

Har du glemt at tage Semap®

Glemmer du at tage en dosis, fortsættes med almindelig dosering. Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger.

Semap® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Antikolinerge symptomer (hurtig hjerterefrekvens, synsforstyrrelser, vandladningsbesvær og mundtørhed).
- Ufrivillige bevægelsesforstyrrelser (ekstrapyramidale symptomer) i form af rastløshed, muskelstivhed, rysten samt øget spytproduktion.
- Årelang behandling kan fremkalde blivende bivirkninger i nervesystemet.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Efter længerevarende behandling kan der forekomme ufrivillige unormale bevægelser (tardive dyskinesier).

- Brystspænding, mælkeflod og udebliven af menstruation.
- Lavt blodtryk, der opstår ved skift fra liggende til stående stilling.
- Lysfølsomhed.
- Vægtøgning.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Leverpåvirkning.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring.

- Opbevar Semap® utilgængeligt for børn.
- Ingen særlige opbevaringsbetingelser.
- Anvend ikke Semap® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information.

Semap® indeholder

Det virksomme indholdsstof i Semap® er: Penfluridol 20 mg.

De øvrige indholdsstoffer er:

Lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon, talcum, saccharose, magnesiumstearat, quinolin-gult (E 104) og indigotin I (E 132).

Markedsføring i Danmark

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.



(02) 100073

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2500