

SERENASE® DEKANOAT

Injektionsvæske, opløsning 100 mg/ml

Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek. Lægen har ordineret Serenase® Dekanoat til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Serenase® Dekanoat.
3. Sådan skal du bruge Serenase® Dekanoat.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

1. Virkning og anvendelse.

Virkemåde

- Serenase® Dekanoat anvendes til psykotiske tilstande bortset fra depressioner, hvor tabletbehandling ikke kan anvendes.
- Serenase® Dekanoat ændrer aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, hvorved overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes.

Medicinen anvendes til

Behandling af psykotiske tilstande.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Serenase® Dekanoat.

Brug ikke Serenase® Dekanoat hvis

- Du er overfølsom over for haloperidol eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Serenase® Dekanoat.
- Du har dårligt hjerte og/eller hjerterytmeforstyrrelser.
- Du har forlænget periode mellem hjertets slag.
- Du har ubehandlet lavt kalium i blodet.
- Du samtidig får medicin som forlænger perioden mellem hjertets slag.

Særlige forholdsregler

I visse tilfælde bør der udvises forsigtighed ved brug af Serenase® Dekanoat. Dette gælder hvis:

- Du har snævervinklet grøn stær og/eller godartet forstørrelse af blærehalskirtlen.
- Risiko for nedsættelse af krampetærskel.
- Du er i behandling med medicin, der virker hæmmende på centralnervesystemet. Specielt barbiturater bør undgås.
- Du indtager alkohol.
- Du - eller én i din familie lider af forlængelse af perioden mellem hjertets slag.
- Du samtidig behandles med anden medicin mod psykotiske tilstande.

Brug af Serenase® Dekanoat sammen med mad og drikkevarer

Du kan bruge Serenase® Dekanoat sammen med mad og drikke. Alkohol bør undgås.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Serenase® Dekanoat

Dette lægemiddel indeholder sesamolie, som i sjældne tilfælde kan medføre svære allergiske reaktioner.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Du kan bruge Serenase® Dekanoat under graviditet.

Amning:

Du kan amme, selv om du bruger Serenase® Dekanoat.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Serenase® Dekanoat påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Hvis flere lægemidler anvendes samtidig, kan de påvirke effekten af hinanden. Kontakt lægen, hvis du anvender et af følgende lægemidler samtidig med Serenase® Dekanoat, da dosis eventuelt skal justeres:

- Midler mod depression af typen tricykliske antidepressiva.
- Antiparkinsonmiddel (levodopa).
- Hjertestimulerende middel (dopamin).
- Lægemidler som forlænger perioden mellem hjertets slag.
- Vanddrivende midler.
- Afføringsmidler.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du bruge Serenase® Dekanoat.

Dosering

Voksne:

Individuel, 50-300 mg i.m. (til injektion i muskel) med 3-4 ugers interval.

Må ikke blandes med andre injektionsvæsker.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har du brugt for meget Serenase® Dekanoat

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Serenase® Dekanoat, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomer:

- Bevidsthedssvækkelse stigende til koma, eventuelt vejrtrækningsbesvær.
- Epilepsilignende kramper.
- For lavt blodtryk, påvirkning af hjertemuskulaturen og hurtig hjerterefrekvens.
- Mundtørhed.
- Besvær med at indstille øjnene til at se skarpt.

4. Bivirkninger.

Serenase® Dekanoat kan som al anden medicin give bivirkninger.

Bivirkninger

- Mundtørhed, synsforstyrrelser, hurtig hjerterefrekvens og vandladningsbesvær.
- Ufrivillige bevægelser i form af rastløshed, muskelstivhed og øget spytksekretion.
- Lavt blodtryk, der opstår ved skift fra liggende/siddende til stående stilling.
- Brystspænding
- Mælkeflåd.
- Gentagen udeblivelse af menstruation.
- Vægtøgning.
- Øget lysfølsomhed af huden.
- Leverpåvirkning.
- Forlængelse af perioden mellem hjertets slag.
- Hjerterytmeforstyrrelser.
- Pludselig uforklarlig død, hjerrestop.

Efter længerevarende behandling kan der opstå ufrivillige bevægelsesforstyrrelser ofte særligt udtalte i ansigtet. I sjældne tilfælde kan der efter årelang behandling opstå uheldelig påvirkning af nervesystemet.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring.

- Opbevar Serenase® Dekanoat utilgængeligt for børn.
- Ingen særlige opbevaringsbetingelser.
- Anvend ikke Serenase® Dekanoat efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information.

Serenase® Dekanoat indeholder

Det virksomme indholdsstof i Serenase® Dekanoat er: Haloperidol 100 mg svarende til 141,04 mg haloperidol dekanat.

De øvrige indholdstoffer er:

Benzylalkohol 15 mg og sesamolie til 1 ml.

Markedsføring i Danmark

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Serenase® er et registreret varemærke, der tilhører Janssen Pharmaceutica N.V.



(02) 2103901

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2500