

- meget hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
 - Langvarige muskelkramper.
 - Hjertebanken.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Søvn- og adfærdsforstyrrelser som ophidselse, hyperaktivitet og rastløshed.
- Ekstra hjerteslag.
- Utilstrækkelig iltforsyning til hjertet.
- Kvalme.
- Nældefeber, hududslæt.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.melden-bivirkning.dk

5. Opbevaring

- Opbevar Terbasmin® Turbuhaler® utilgængeligt for børn.
- Opbevar Terbasmin® Turbuhaler® tørt og med beskyttelseshætten skruet tæt til.
- Brug ikke Terbasmin® Turbuhaler® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Terbasmin® Turbuhaler®, 0,5 mg/dosis, inhalationspulver indeholder:
Terbutalinsulfat.

Øvrige indholdsstoffer:
Terbasmin® Turbuhaler® indeholder ingen hjælpestoffer.

Pakningsstørrelser:
Terbasmin® Turbuhaler® inhalationspulver fås i: Terbasmin® Turbuhaler® inhalationspulver 0,5 mg/dosis i pakninger med 50 doser, 200 doser og 50x200 doser.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:
Orifarm Supply s.r.o.
Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Terbasmin® Turbuhaler® også som Bricanyl® Turbuhaler®.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 09/2014.

INDLÆGGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

TERBASMIN® TURBUHALER®

0,5 mg/dosis inhalationspulver

Terbutalinsulfat

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Terbasmin® Turbuhaler® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Terbasmin® Turbuhaler®.
3. Sådan skal du bruge Terbasmin® Turbuhaler®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

- Terbasmin® Turbuhaler® indeholder et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene og ophæver herved den pludselige forsnævring i bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Terbasmin® Turbuhaler® virker i løbet af få minutter, og virkningen holder sig i ca. 6 timer.
- Du kan bruge Terbasmin® Turbuhaler® til behandling af astmaanfald og andre former for vejrtrækningsbesvær. Du skal kun bruge Terbasmin® Turbuhaler®, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald. Brug ikke Terbasmin® Turbuhaler® som vedligeholdelsesbehandling.

Lægen kan have givet dig Terbasmin® Turbuhaler® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Terbasmin® Turbuhaler®

Brug ikke Terbasmin® Turbuhaler®

- hvis du er overfølsom over for terbutalinsulfat eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Terbasmin® Turbuhaler®

- Samtidig behandling med anden medicin kan medføre uønskede vekselvirkninger, se "Brug af anden medicin".
- Tal med lægen, inden du bruger Terbasmin® Turbuhaler®, hvis:
 - du har hjerte/karsygdomme. Kontakt lægen hvis du oplever bryst smerter eller andre symptomer på forværring af din hjertesygdom.
 - du har for højt blodtryk eller høj uregelmæssig puls, og du er i behandling med digoxin eller anden hjerte medicin, sukker syge eller for højt stofskifte (Basedow).
 - medicinen ikke har samme virkning som den plejer, og du får flere symptomer på astma, f.eks. hoste og åndenød eller dit forbrug af Terbasmin® Turbuhaler® stiger.
- Hvis du har en svær astma, er der risiko for, at kalium i blodet bliver for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astma medicin med theofyllin eller lignende stoffer eller binyrebarkhormoner.
- Doping: Der kræves en særlig dispensation, Therapeutic Use Exemption (TUE), ved behandling med Terbasmin® Turbuhaler®. TUE skal anmeldes til stævneledelsen før konkurrencer.

Brug af anden medicin

- Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
 - forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta-blokkere, spørg din læge).
 - Forstyrrelser i hjerterytmen (digitalis eller digoxin).
 - Grøn stær (visse øjendråber, spørg lægen).
 - Medicin der øger hjerterytmen, eller du er i behandling med binyrebarkhormoner, vanddrivende medicin eller anden medicin



110860105

til behandling af astma.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

- Du kan bruge Terbasmin® Turbuhaler® under graviditet.
- Terbasmin® Turbuhaler® kan hæmme veerne under fødslen.

Amning:

- Du kan bruge Terbasmin® Turbuhaler®, selvom du ammer, men rådfør dig med din læge.
- Terbutalinsulfat bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Terbasmin® Turbuhaler® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge Terbasmin® Turbuhaler®

Den sædvanlige dosis er

Dosis er individuel. Du skal bruge Terbasmin® Turbuhaler® i forbindelse med et astmaanfald og ikke som vedligeholdelsesbehandling. Terbasmin® Turbuhaler® er et inhalationspulver, der følger med indåndingsluften ned i lungerne, når du trækker vejret dybt gennem

mundstykket.

0,25 mg/dosis

Børn 3-10 år:

Sædvanligvis 1 sug (0,25 mg) tre gange dagligt. Hvis det er nødvendigt kan et barn tage op til 4 sug (1 mg) under samme anfald. Et barn bør ikke tage mere end 16 sug (4 mg) i døgnet.

0,5 mg/dosis

Voksne:

Sædvanligvis 1 sug (0,5 mg) fire gange dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan du tage op til 3 sug (1,5 mg) under samme anfald. Du bør ikke tage mere end 12 sug (6 mg) i døgnet.

Børn fra 10 år:

Sædvanligvis 1 sug (0,5 mg) to gange dagligt. Hvis det er nødvendigt kan et barn tage op til 2 sug (1 mg) under samme anfald. Et barn bør ikke tage mere end 8 sug (4 mg) i døgnet.


Terbasmin® Turbuhaler®, inhalationspulver fås i flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge din Turbuhaler® til alle de anførte doseringer.

Brug altid Terbasmin® Turbuhaler® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Ved hver inhalation kan noget af medicinen sætte sig inde i din mund og svælg. Det anbefales at du så vidt muligt skyller din mund med vand efter hver brug af Terbasmin® Turbuhaler®, for at mindske risikoen for bivirkninger.

Brugsanvisning

Læs brugsanvisningen nøje igennem før du bruger Terbasmin® Turbuhaler®. Turbuhaleren er indåndingsaktiveret, hvilket betyder, at lægemidlet følger med luften ned i lungerne, når man inhalerer gennem mundstykket.




1. Bryd forseglingen omkring bundstykket og beskyttelseshætten ved de røde pile. Skru beskyttelseshætten af.
2. Hold Turbuhaleren lodret og drej det blå bundstykke 1 gang frem og tilbage til der lyder et klik. Det er underordnet, om du drejer til højre eller venstre først, bare der har lydt et klik.
3. Sæt mundstykket for munden og tag en dyb og kraftig indånding. Tag Turbuhaleren fra munden og ånd langsomt ud. Hvis du skal have endnu en dosis, så gentag punkt 2-3. Skru beskyttelseshætten på efter brug.



Inhalationspulveret er meget følsomt over for fugt, undlad derfor at ånde ud i Turbuhaleren. Terbasmin® Turbuhaler® indeholder ingen hjælpestoffer. Du kan ikke smage eller mærke dose.

Når du kan se et rødt mærke øverst i dosisindikatoren, er der ca. 20 doser tilbage. Terbasmin® Turbuhaler® er tom, når det røde felt når bunden af dosisindikatoren (se figur A).



Selv om du drejer det blå bundstykke flere gange før en inhalation, er der kun én

dosis klar til inhalation. Man skal dog være opmærksom på, at dosisindikatoren tæller hver fremdrejning, og den vil derfor vise rødt (og dermed signalere at beholderen er tom) for tidligt.

Drej derfor kun det blå bundstykke frem og tilbage 1 gang umiddelbart før hver inhalation. Rengøring: Rengør mundstykkets yderside 2-3 gange om ugen med en serviet. Du må ikke skille Turbuhaleren ad. OBS: Brug aldrig vand

Hvis du har brugt for meget Terbasmin® Turbuhaler®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Terbasmin® Turbuhaler®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer:

Hjertebanken, evt. blodtryksfald (besvimelse), angst, rysten på hænderne og symptomer som beskrevet under bivirkninger.

Hvis du har glemt at bruge Terbasmin® Turbuhaler®

Terbasmin® Turbuhaler® anvendes ved behov og ikke som regelmæssig behandling.

Hvis du holder op med at bruge Terbasmin® Turbuhaler®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Terbasmin® Turbuhaler® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astmalignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Hovedpine, rysten.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får