

## INDLÆGSSEDDEL

FEBRIVAC HV Vet, lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension

### 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller af batchfrigivelse:

IDT Biologika GmbH  
Am Pharmapark  
D-06861 Dessau-Roßlau  
Tyskland

Repræsentant  
NordVacc Läkemedel Danmark  
Korskildelund 6  
2670 Greve  
Danmark

### 2. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

FEBRIVAC HV VET

Lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension  
Vaccine mod hvalpesyge hos mink.

### 3. ANGIVELSE AF DE AKTIVE STOFFER OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

1 ml (1 dosis) indeholder:

Aktivt stof

Distempervirus, stamme D 84/1, levende, attenueret

mindst  $10^{3,7}$  TCID<sub>50</sub>  
max.  $10^{5,2}$  TCID<sub>50</sub>

### 4. INDIKATIONER

Vaccination af mink mod hvalpesyge.

### 5. KONTRAINDIKATIONER

Dyr i dårlig almén tilstand bør ikke vaccineres.

### 6. BIVIRKNINGER

Ingen rapporteret.

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

Bevirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre. Dyrets ejer kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

De/du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted.

## **7. DYREARTER**

Mink

## **8. DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVÆJ(E)**

Dosis: 1 ml subkutant eller intramuskulært.

Hvalpe yngre end 10 uger, der med sikkerhed har maternale antistoffer, skal vaccineres 2 gange med 4-6 ugers interval.

Hvalpe ældre end 10 uger vaccineres én gang.

Årlig revaccination af avlsdyr mindst 1 måned før parring.

Ved hjælp af den vedlagte dobbeltkanyle overføres indholdet i suspensionsflasken til flasken med pulver.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

## **9 OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE**

Pulveret opløses lettest ved en temperatur mellem 12 og 15 °C.

Vaccination tidligere end 6-8 ugers alder kan medføre at maternale antistoffer forstyrrer aktiv immunisering via vaccination.

## **10. TILBAGEHOLDELSESTID**

0 dage.

## **11. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING**

Opbevares utilgængeligt for børn

Vaccinen skal opbevares ved +2 °C til +8 °C.

Vaccinen må ikke anvendes efter udløbsdato.

Brugsfærdig vaccine bør anvendes straks.

## **12. SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER**

Ingen

## **13. EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT**

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal modtageordning.

**14. DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN**

03/2008

**15. ANDRE OPLYSNINGER**

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre undtagen Febrivac ENT Vet.

**Pakningsstørrelser**

Htgl. 1 x 100 ds

Htgl. 1 x 250 ds

Htgl. 4 x 250 ds

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.