

TILAVIST®

Øjendråber, opløsning 20 mg/ml.

Udgave 2, P100762

Læs denne information godt igennem før du begynder at bruge medicinen. Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen. Ønsker du mere information, så kontakt læge eller apotek.
Lægen har ordineret Tilavist® til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse.
2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Tilavist®.
3. Sådan skal du bruge Tilavist®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere information.

Tilavist® indeholder

Det virksomme indholdsstof i Tilavist® er:
Natriumnedocromil 20 mg/ml.

De øvrige indholdsstof er:
Benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel) 0,1 mg/ml, natriumedetat, natriumchlorid og renset vand.

Markedsføring i Danmark

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com

1. Virkning og anvendelse.

Virkemåde

Tilavist® er et middel til lokal anvendelse i øjet. Tilavist® anvendes mod allergiske symptomer i øjnene.

Medicinen anvendes til

- Behandling af allergisk øjenkatarr.
- Behandling af forårskatar.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information, som du skal læse, før du bruger Tilavist®.

Brug ikke Tilavist® hvis

Du er overfølsom over for natriumnedocromil eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Tilavist®.

Særlige forholdsregler

Tilavist® bør, på grund af indholdet af konserveringsmiddel (benzalkoniumchlorid), ikke anvendes sammen med kontaktlinser. Efter at øjendråberne er dryppet i øjet, skal der gå 10 – 15 minutter, før kontaktlinserne sættes i igen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Tilavist®

Benzalkoniumchlorid kan give irritation af øjnene.
Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Kan misfarve bløde kontaktlinser.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet og amning:
Tilavist® kan anvendes.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Tilavist® påvirker ikke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Ingen kendte problemer.

3. Sådan skal du bruge Tilavist®.

Dosering

Voksne og børn over 6 år:

Allergisk øjenkatarr:

1 dråbe i hvert øje to gange dagligt, kan ved behov øges til fire gange dagligt.

Forårskatar:

1 dråbe i hvert øje fire gange dagligt.

Børn under 6 år:

0 må kun bruge Tilavist® til børn under 6 år efter lægens anvisning.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Brugsanvisning

1. Forseglingen fjernes, og låget skrues af.
2. Træk forsigtigt det underste øjenlåg ned, så der dannes en lille lomme.
3. Tryk på den vendte dråbeflaske for at dryppe en dråbe i øjenlommen. Der bør udvises forsigtighed med, at øjet ikke berøres af spidsen på flasken.
4. Slip det underste øjenlåg og blink nogle gange således, at øjendråben fordeles over hele øjet.
5. Samme fremgangsmåde anvendes for begge øjne.
6. Undgå at berøre spidsen af flasken. Skru hættten på efter brug.

OBS: Øjendråberne må højst anvendes 4 uger efter åbning.

Har du brugt for meget Tilavist®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Tilavist®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet.

Symptomer:

Ingen kendte problemer.

Har du glemt at bruge Tilavist®

Glemmer du at tage en dosis, fortsættes med almindelig dosering.
Tag aldrig dobbelt dosis.

4. Bivirkninger.

Tilavist® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Bivirkninger

Lokal irritation i øjet, samt bitter smag i munden.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk>

5. Opbevaring.

- Opbevar Tilavist® utilgængeligt for børn.
- Må kun anvendes 4 uger efter åbning.
- Der er ingen særlige opbevaringsbetingelser for Tilavist®.
- Anvend ikke Tilavist® efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information.

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

For yderligere oplysninger om dette lægemiddel og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.



(02) 100762

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2500