

ZADITEN®
0,25 mg/ml, øjendråber, opløsning
Ketotifen

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Zaditen® uden recept. For at opnå de bedste resultater, skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Zaditen®. Gem indlægssedlen, du kan få brug for at læse den igen. Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide. Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zaditen®.
3. Sådan skal du bruge Zaditen®.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

- Zaditen® er et antihistamin til brug i øjnene.
- Zaditen® virker ved at hæmme den allergiske reaktion.
- Du skal bruge Zaditen® mod symptomer på pollenallergi som f.eks. røde og kløende øjne.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Zaditen® for noget andet, skal du altid følge lægens anvisninger.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zaditen®**Brug ikke Zaditen®**

- hvis du er overfølsom over for ketotifen, eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Brug af anden medicin

Tal med lægen, inden du bruger Zaditen®, hvis du tager:

- medicin eller stoffer, der kan virke sløvende, f.eks. alkohol.
- anden medicin mod allergi eller høfeber (antihistaminer).

Hvis du udover Zaditen® behandles med andre øjendråber, bør der gå mindst 5 minutter mellem behandlingerne.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Brug af Zaditen® sammen med mad og drikke

Zaditen® kan muligvis øge virkningen af alkohol.

Graviditet og amning

Spørg lægen eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

- Hvis du er gravid, må du kun bruge Zaditen® efter aftale med lægen.

Amning:

- Du kan bruge Zaditen®, selvom du ammer. Zaditen® går over i mælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Tal med lægen hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zaditen® kan hos enkelte give bivirkninger (sløret syn og døsigthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Zaditen®

Zaditen® er konserveret med benzalkoniumklorid, som kan give irritation af øjnene, samt misfarve bløde kontaktlinser. Tag kontaktlinserne ud, inden øjendråberne bruges, og vent mindst 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i igen.

3. Sådan skal du bruge Zaditen®**Den sædvanlige dosis er**

Voksne, ældre, og børn fra 3 år:
1 dråbe i øjet to gange dagligt.

Bør ikke anvendes til børn under 3 år uden lægens anvisning.

Hvis din læge har ordineret Zaditen® til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brugsanvisning

1. Bøj hovedet bagover.
2. Træk det nederste øjenlåg nedad med en finger. Hold øjendråbeflasken i den anden hånd med spidsen nedad - et let tryk på flasken får en dråbe til at falde ned i øjet.
3. Dryp en dråbe i hvert øje. Lad ikke spidsen af flasken komme i berøring med nogen overflader for at undgå snavs og dermed infektion.
4. Luk øjet i ca. ét minut for at forhindre øjendråben i at løbe ned i næsen gennem tårekanalen.

Hvis du har brugt for meget Zaditen®

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Zaditen®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Der er ikke kendskab til tilfælde af overdosering.

Hvis du har glemt at bruge Zaditen®

Hvis du har glemt en dosis, så dryp øjnene så snart du kommer i tanker om det og fortsæt derefter med den anbefalede doseringshyppighed.

Hvis du holder op med at bruge Zaditen®

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.

4. Bivirkninger

Zaditen® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Smerter og uklart syn pga. skader på hornhinden. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

- Svie, øjensmerter.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

- Sløret syn efter inddrypning, tørre øjne, påvirkning af øjenlåget, lysfølsomhed, blødning i det hvide i øjet.
- Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.
- Hovedpine.
- Døsighed.
- Hududslæt, eksem, nældefeber.
- Tør mund.
- Allergisk reaktion.

Hyppigheden er ikke kendt:

- Kontakteksem, øjenhævelse, øjenlågsklø og væskeophobning.
- Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.
- Opblussen af eksisterende allergiske tilstande som astma og eksem.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk

5. Opbevaring

- Opbevar Zaditen® utilgængeligt for børn.
- Opbevar ikke Zaditen® ved temperaturer over 25 °C.
- Holdbarhed efter åbning af flasken: 4 uger.
- Brug ikke Zaditen® efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den anførte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Zaditen®, 0,25 mg/ml, øjendråber, opløsning indeholder:

Ketotifenfumerat svarende til ketotifen 0,25 mg/ml.

Øvrige indholdsstoffer:

Benzalkoniumchlorid, glycerol, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Pakningsstørrelser:

Zaditen® 0,25 mg/ml øjendråber, opløsning fås i pakninger med 5 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Mail: info@orifarm.com

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Zaditen® er et registreret varemærke, der tilhører Novartis AG.



285120104