



Kreon® Forte 25.000 hårde enterokapsler pankreatin

0213955909

Kreon® er et registreret varemærke, som tilhører Abbott Products GmbH.

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer

- De kan få Kreon® Forte uden recept. For at opnå den bedste behandling skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Kreon® Forte.
- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere De vil vide.
- Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal De vide, før De begynder at bruge Kreon® Forte
3. Sådan skal De bruge Kreon® Forte
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Kreon® Forte indeholder pancreasenzymmer. Pancreasenzymmer er fordøjelsesenzymer, som virker fremmende på fordøjelsen. Kreon® Forte anvendes ved tilstande, hvor kroppens egen produktion af enzymer til fordøjelse af føden er utilstrækkelig.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT BRUGE KREON® FORTE

Brug ikke Kreon® Forte, hvis:

- De er overfølsom overfor pancreasenzymmer eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kreon® Forte

Vær ekstra forsigtig med at bruge Kreon® Forte, hvis:

- De lider af cystisk fibrose

- De har mavetarmproblemer som kan skyldes andet end nedsat bugspytkirtelfunktion (fx betændelse i tarmen eller forsnævring af tarmen)

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Der er ingen kendt påvirkning af Kreon® Forte eller anden medicin ved samtidig brug.

Brug af Kreon® Forte sammen med mad og drikke

De skal tage Kreon® Forte sammen med tilstrækkelig væske og i forbindelse med et måltid.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De må kun tage Kreon® Forte efter aftale med lægen.

Amning:

De kan tage Kreon® Forte, selvom De ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kreon® Forte påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DE BRUGE KREON® FORTE

Hvis Deres læge har ordineret Kreon® Forte til Dem, skal De altid følge lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.

De skal synke enterokapslerne hele med tilstrækkelig væske under eller efter hvert måltid. Hvis De ikke kan synke kapslerne hele, kan De åbne dem og bruge indholdet som drys på mad, f.eks. yoghurt eller opslæmme indholdet i væske, f.eks. juice. De må ikke opslæmme indholdet i vand. De må ikke tygge eller knuse kapslerne.

Det er vigtigt, at De sørger for at indtage rigeligt væske under behandling med Kreon® Forte.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Individuel dosering i forbindelse med måltiderne.
Følg lægens anvisning.

Børn og unge

Individuel dosering i forbindelse med måltiderne.
Følg lægens anvisning.

Hvis De har taget for mange Kreon® Forte hårde enterokapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Kreon® Forte, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med.
Symptomer på overdosering er urinsyreforgiftning og øget urinsyre mængde i blodet.

Hvis De har glemt at tage Kreon® Forte

De må ikke tage en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis, men skal fortsætte med Deres sædvanlige dosering.

Hvis De holder op med at bruge Kreon® Forte

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Kreon® Forte kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

- Mavesmerter.

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter):

- Forstoppelse, diarré, kvalme, opkastning, oppustethed.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1.000 patienter):

- Udslæt.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

- Kløe, nældefeber.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger som ikke er nævnt her, bør indberettes til Sundhedsstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen. De finder skema og vejledning på Sundhedsstyrelsens netsted:
www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

- Kreon® Forte opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke opbevares ved temperaturer over 25° C.
- Brug ikke Kreon® Forte, efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
- Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kreon® Forte hårde enterokapsler indeholder:

- Aktive stoffer: Pankreatin (300 mg) svarende til amylase 18.000 EP-e, lipase 25.000 EP-e, protease 1.000 EP-e.
- Øvrige indholdsstoffer: Macrogol 4000, hypromellosephthalat, cetylalkohol, triethylcitrat, dimeticon, gelatine, titanoxid (E 171) samt jernoxid rød og gul (E 172), natriumlaurylsulfat.

Kreon® Fortes udseende og pakningsstørrelser:

Kreon® Forte hårde enterokapsler er røde og gennemsigtige kapsler, med beige farvet granulat indeni.

Kreon® Forte findes i pakningsstørrelserne 2x50 stk. og 100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen i

Danmark:

Paranova Danmark A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S
Marielundvej 46D, 2730 Herlev

Denne indlægsseddel blev senest revideret
juli 2012