Indlægsseddel: Information til brugeren

Zyban 150 mg depottabletter
bupropionhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Zyban til dig personligt. Lad derfor være med at give lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zyban
3. Sådan skal du bruge Zyban
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zyban er et lægemiddel, der kan hjælpe dig med at holde op med at ryge. Det bør anvendes samtidig med vejledning, eksempelvis i form af et støtteprogram.

Zyban vil være mest effektiv, hvis du er fast besluttet på at holde op med at ryge. Spørg lægen eller apotekspersonalet om råd om behandling og anden støtte til at holde op med at ryge.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zyban

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Zyban
- **hvis du er allergisk** over for bupropion eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6)
- **hvis du bruger andre lægemidler, som indeholder bupropion**
- **hvis du lider af eller tidligere har haft sygdomme med krampeanfald**, såsom **epilepsi**
- **hvis du har eller har haft spiseforstyrrelser** (f.eks. bulimi eller anorexia nervosa)
- **hvis du har en alvorlig leversygdom**, såsom *skrumpelever*
- **hvis du har eller har haft en hjernesvulst**
- **hvis du normalt drikker meget alkohol** og lige er holdt op, eller planlægger at holde op, mens du bruger Zyban
- **hvis du for nylig er holdt op med at bruge beroligende lægemidler eller lægemidler mod angst** (især *benzodiazepiner* eller lignende lægemidler), eller hvis du holder op, mens du tager Zyban

- **hvis du har eller har haft en maniodepressiv lidelse** (ekstreme humørsvingninger), da Zyban kan udløse en episode af denne lidelse
- **hvis du bruger lægemidler til behandling af depression** eller Parkinsons sygdom, kaldet *monoaminoxidase hæmmere (MAO-hæmmere)*, eller har brugt disse lægemidler indenfor de sidste 14 dage. Tal med lægen om, hvor lang tid der skal gå mellem behandling med de to typer lægemidler.
- **hvis du nogensinde har udviklet et alvorligt hududslæt eller hudafskalning, blærer og/eller mundsår** efter at have taget Zyban eller relaterede lægemidler.

➔ **Hvis noget af dette gælder for dig, skal du straks kontakte lægen og lade være med at tage Zyban.**

Advarsler og forsigtighedsregler
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du begynder at bruge Zyban, da nogle forhold kan øge risikoen for bivirkninger (*se også punkt 4*).

Alvorlige hudreaktioner
Dette lægemiddel kan forårsage alvorlige hudreaktioner. Stop med at bruge Zyban og søg straks lægehjælp, hvis du bemærker nogen af de symptomer, der er relateret til disse alvorlige hudreaktioner, der er beskrevet i punkt 4.

Brugada-syndrom
Hvis du har en tilstand kaldet Brugada-syndrom (et sjældent arveligt syndrom, der påvirker hjerterytmen), eller hvis hjertestop eller pludselig død er opstået i din familie.

Børn og unge
Zyban bør ikke anvendes til personer under 18 år.

Voksne
Krampeanfald
Krampeanfald er set hos ca. 1 ud af 1.000 personer, der tager Zyban (*se også "Brug af andre lægemidler sammen med Zyban" senere under dette punkt og punkt 4 "Bivirkninger" for yderligere oplysninger*). Krampeanfald er mere hyppige:

- **hvis du jævnligt drikker meget alkohol**
- **hvis du har sukkersyge** og er i behandling med insulin eller tabletter
- **hvis du har** eller tidligere har haft **en alvorlig hovedskade.**

Hvis noget af dette gælder for dig, må du ikke tage Zyban, medmindre du har talt med lægen og I er blevet enige om, at det er nødvendigt for dig at tage Zyban.
Hvis du får krampeanfald under behandlingen:
➔ **Stop med at tage Zyban. Kontakt lægen.**

Du kan have større risiko for bivirkninger:
- **hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion**
- **hvis du er over 65 år.**

Du vil have brug for at tage en lavere dosis (*se punkt 3*) og blive fulgt nøje af lægen, mens du tager Zyban.

Hvis du har eller har haft psykiske lidelser
Nogle personer, der tager Zyban har haft hallucinationer eller vrangforestillinger (ser, hører eller tror ting, der ikke er der), forstyrrede tanker eller ekstreme humørsvingninger. Disse bivirkninger ses oftere hos personer, der tidligere har haft psykiske lidelser.

Hvis du føler dig deprimeret eller får tanker om at gøre skade på dig selv eller selvmord
Nogle personer bliver deprimerede, når de holder op med at ryge; Sommetider kan de have tanker om at gøre skade på sig selv eller begå selvmord. Disse symptomer er set hos personer, der tager Zyban, oftest i de første par uger af behandlingen.

Hvis du bruger lægemidler mod depression
Hvis du bruger disse lægemidler sammen med Zyban kan det føre til serotoninsyndrom, en potentiel livstruende tilstand (se "Brug af andre lægemidler sammen med Zyban" under dette punkt).

Hvis du føler dig deprimeret eller får tanker om at begå selvmord:
➔ **Kontakt straks lægen eller tag straks på hospitalet.**

Forhøjet blodtryk og Zyban
Nogle personer i behandling med Zyban har udviklet forhøjet blodtryk, der kræver behandling. Hvis du allerede har forhøjet blodtryk, kan dette blive værre. Risikoen er større, hvis Zyban anvendes i kombination med **nikotinplastre** til rygeophør.

Du vil få målt dit blodtryk før du starter med og mens du bruger Zyban, især hvis du har forhøjet blodtryk i forvejen. Hvis du anvender nikotinplastre samtidig med Zyban, bør dit blodtryk kontrolleres ugentligt under behandlingen. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen med Zyban, hvis dit blodtryk stiger.

Brug af andre lægemidler sammen med Zyban
Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nylig har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. Dette gælder også lægemidler, som ikke er købt på recept.

Der kan være større risiko end normalt for krampeanfald, hvis du bruger:

- lægemidler mod **depression** eller **andre psykiske lidelser** *(se også "Brug ikke Zyban" i begyndelsen af punkt 2)*
- **theophyllin** mod **astma** eller **lungelidelser**
- **tramadol** (stærkt smertestillende lægemiddel)
- lægemidler mod **malaria**
- **stimulerende** eller **appetitnedsættende** midler
- **steroider** (undtagen cremer og lotion for øjen- og hudproblemer)
- **antibiotika** af typen **quinoloner**
- **nogle typer af antihistaminer**, der primært anvendes til behandling af allergi, som kan være sløvende
- lægemidler mod **sukkersyge.**

➔ **Kontakt straks lægen** inden du bruger Zyban, **hvis du bruger nogle af disse lægemidler** *(se punkt 3 "Nogle kan have behov for en lavere dosis")***.**

Andre lægemidler kan påvirke virkningen af Zyban eller øge risikoen for bivirkninger. Dette gælder for følgende:

- lægemidler mod **depression** (f.eks. desipramin, imipramin, paroxetin, citalopram, escitalopram, venlafaxin) eller **andre psykiske lidelser** (f.eks. risperidon, thioridazin). Zyban kan interagere med nogle lægemidler, der anvendes til behandling af depression og du kan opleve ændringer i den mentale tilstand (f.eks. rastløs uro, hallucinationer, koma) og andre påvirkninger såsom kropstemperatur over 38 °C, øget hjertefrekvens, ustabilt blodtryk og hyperaktive reflekser, muskelstivhed, mangel på koordination og/eller mave-tarm symptomer (f.eks. kvalme, opkastning, diarré)
- lægemidler mod **Parkinsons sygdom** (f.eks. levodopa, amantadin, eller orphenadrin)
- **carbamazepin, phenytoin** eller **valproat**, til behandling af **epilepsi** eller visse **psykiske lidelser**
- nogle typer af lægemidler til behandling af **kræft** (f.eks. cyclophosphamid, ifosphamid)
- **ticlopidin** eller **clopidogrel**, oftest anvendt til behandling af **hjertelidelser** eller **slagtilfælde**
- nogle **betablokkere** (f.eks. metoprolol), oftest anvendt til behandling af forhøjet blodtryk
- nogle typer af lægemidler til behandling af **hjertearytmier** (f.eks. propafanon, flecainid)
- **ritonavir** eller **efavirenz**, til behandling af hiv-infektion.

➔ **Kontakt lægen, hvis du tager nogle af disse lægemidler**. Lægen vil opveje de fordele og ulemper, der er for dig ved at tage Zyban, eller beslutte at ændre dosis af andre lægemidler, som du tager.

Zyban kan nedsætte virkningen af andre lægemidler:
- **hvis du tager tamoxifen til behandling af brystkræft**
  Kontakt lægen, hvis dette gælder for dig. Det kan være nødvendigt at skifte til en anden behandling for rygestop.
- **hvis du tager digoxin for dit hjerte**
  Kontakt lægen, hvis dette gælder for dig. Din læge kan overveje at justere din digoxin dosis.

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis af nogle typer lægemidler, når du holder op med at ryge
Når du ryger, kan de kemikalier der bliver optaget i kroppen medføre, at nogle typer lægemidler har nedsat virkning. Når du holder op med at ryge, kan det være nødvendigt at nedsætte dosis af disse typer lægemidler, da du ellers vil kunne få bivirkninger.

Kontakt lægen, hvis du tager andre lægemidler og oplever nye symptomer, som du tror, kan være bivirkninger.

Brug af Zyban sammen med alkohol
Nogle personer oplever, at de er mere følsomme overfor alkohol, når de bruger Zyban. Lægen kan råde dig til at holde dig fra alkohol, mens du bruger Zyban, eller til at prøve at drikke så lidt som muligt. Hvis du har et stort alkoholforbrug nu, bør du ikke stoppe pludseligt, da det kan øge risikoen for krampeanfald.

Laboratorieprøver
Zyban kan påvirke prøveresultater ved nogle typer af laboratorieanalyser til påvisning af andre stoffer. Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Zyban.

Graviditet og amning
Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Zyban. Nogle, men ikke alle undersøgelser, har vist en øget risiko for misdannelser, særligt hjertemisdannelser, hos børn hvis mødre brugte Zyban. Det vides ikke, hvorvidt disse misdannelser var forårsaget af Zyban.

Indholdsstofferne i Zyban går over i modermælken. Hvis du ammer, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Zyban.

Trafik- og arbejdssikkerhed
Zyban kan give bivirkninger (svimmelhed), der kan påvirke din koncentrationsevne og dømmekraft. **Hvis du bliver påvirket af lægemidlet, må du ikke køre bil eller motorcykel og lad være med at cykle eller arbejde med værktøj eller maskiner.**

3. Sådan skal du bruge Zyban

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

<table>
<tr><td colspan="3">Sådan starter du behandlingen og så meget skal du tage
• Påbegynd behandlingen med Zyban mens du stadig ryger.
• Fastsæt en Stop-Dag, hvor du holder op med at ryge, helst i anden uge af behandlingen.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Uge 1
Det er bedst at fortsætte med at ryge i uge 1</td><td>Dag 1 til 6</td><td>Tag 1 depottablet (150 mg) daglig.</td></tr>
<tr><td>Dag 7</td><td>Dosis øges til 1 depottablet 2 gange daglig, med mindst 8 timers mellemrum og ikke lige før sengetid.</td></tr>
<tr><td>Uge 2</td><td colspan="2">Fortsæt med at tage 1 depottablet 2 gange daglig.
Stop med at ryge i denne uge, på din fastsatte Stop-Dag.</td></tr>
<tr><td>Uge 3 til 9</td><td colspan="2">Fortsæt med at tage 1 depottablet 2 gange daglig, i op til 9 uger.
Hvis det ikke er lykkedes dig at holde op med at ryge efter 7 uger, kan lægen råde dig til at stoppe med at tage Zyban.
Lægen kan råde dig til at trappe gradvist ned med Zyban efter 7-9 uger.</td></tr>
</table>

Nogle kan have behov for en lavere dosis
- da de kan have større risiko for at få bivirkninger

- hvis du er over 65 år
- hvis du har lever- eller nyresygdom
- hvis du har risiko for at få krampeanfald (*se "Advarsler og forsigtighedsregler" og "Brug af andre lægemidler sammen med Zyban" i punkt 2*):

Den højeste anbefalede dosis er **1 depottablet (150 mg) daglig**.

Sådan tages Zyban depottabletter
Zyban depottabletter bør tages med mindst 8 timers mellemrum. Tag ikke Zyban lige før sengetid – det kan give problemer med at sove.

Du kan tage Zyban i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Zyban depottabletter skal synkes hele. Depottabletterne må ikke knuses, tygges eller deles, da det kan betyde, at lægemidlet bliver frigivet til kroppen for hurtigt. Dette kan øge risikoen for bivirkninger, herunder krampeanfald.

Hvis du har taget for meget Zyban
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Zyban, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du tager for mange Zyban, kan du have større risiko for krampeanfald eller andre bivirkninger.
➔ **Vent ikke.** Kontakt straks lægen eller skadestuen.

Hvis du har glemt at tage Zyban
Hvis du har glemt en dosis, skal du springe den over og tage næste depottablet, som du plejer.
Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Zyban
Det kan være nødvendigt for dig at tage Zyban i op til 7 uger for at få den fulde virkning af behandlingen.

Du må ikke holde op med at tage Zyban uden at have talt med lægen først. Det kan være nødvendigt at nedtrappe behandlingen gradvist.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Krampeanfald
Omtrent 1 ud af 1.000 af de personer, der tager Zyban, er i risiko for at få krampeanfald.
Symptomer på krampeanfald er kramper og oftest bevidstløshed. Personer, der får krampeanfald, kan være forvirrede bagefter og kan muligvis ikke huske, hvad der er sket.
Der er større risiko for krampeanfald, hvis du tager for meget, hvis du tager andre lægemidler, eller hvis du har en højere risiko end normalt for at få krampeanfald *(se punkt 2)*.
➔ **Hvis du får krampeanfald**, så fortæl det til lægen, når du er kommet dig. **Du må ikke tage mere Zyban.**

Overfølsomhedsreaktioner
Alvorlige overfølsomhedsreaktioner overfor Zyban ses sjældent (hos 1 ud af 1.000 personer).
Symptomer på overfølsomhedsreaktion er:

- udslæt (kløende, knoldet udslæt)
- unormal hvæsende vejrtrækning eller vejrtrækningsproblemer
- hævede øjenlåg, læber eller tunge
- smerter i muskler eller led
- kollaps eller bevidstløshed.

➔ **Kontakt straks lægen, hvis du får tegn på overfølsomhedsreaktion. Du må ikke tage mere Zyban.**

Alvorlige hudreaktioner
Stop med at bruge bupropion og søg straks lægehjælp, hvis du bemærker et af følgende symptomer:

- Hyppighed sjælden: Rødlige ikke-hævede, skydeskive-lignende eller cirkulære pletter på overkroppen, ofte med centrale blærer, hudafskalning, sår i mund, hals, næse, kønsorganer og øjne. Disse alvorlige hududslæt kan forudgås af feber og influenzalignende symptomer *(Stevens-Johnsons syndrom*).
- Hyppighed ikke kendt: Store områder med blærer og omfattende hudafskalning forekommer i en alvorlig form af ovenfor beskrevet alvorlige hudreaktion (*toksisk epidermal nekrolyse*).
- Hyppighed ikke kendt: Udbredt udslæt, høj kropstemperatur og forstørrede lymfeknuder (*DRESS-syndrom eller lægemiddeloverfølsomheds-syndrom*). Opståen af dette syndrom er normalt forsinket (2-6 uger efter behandlingsstart).
- Hyppighed ikke kendt: Et rødt, udbredt skællet udslæt med knopper under huden og blærer, ledsaget af feber. Symptomerne opstår normalt ved behandlingens start (*akut generaliseret eksantematøs pustulose*).

Lupus hududslæt eller forværring af lupus symptomer
Ikke kendt – hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data hos patienter der tager Zyban.
Lupus er en lidelse i immunsystemet der påvirker huden og andre organer.
➔ **Hvis du oplever lupusudbrud, hududslæt eller læsioner (især på sol-udsatte områder), mens du tager Zyban, skal du kontakte din læge, da det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen.**

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos **flere end 1 ud af 10** personer):
- problemer med at sove (vær opmærksom på ikke at tage Zyban lige før sengetid).

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos **op til 1 ud af 10** personer):
- depression *(se også "Advarsler og forsigtighedsregler" under punkt 2)*
- uro eller angst
- koncentrationsbesvær
- rysten
- hovedpine
- kvalme eller opkastning
- mavesmerter eller andre mavegener (såsom forstoppelse), smagsforstyrrelser, mundtørhed
- feber, svimmelhed, svedtendens, udslæt (nogle gange på grund af overfølsomhedsreaktion), kløe.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos **op til 1 ud af 100** personer):
- tinnitus (ringen for ørerne), synsforstyrrelser
- forhøjet blodtryk (nogle gange alvorligt), rødmen
- appetitmangel
- kraftesløshed
- brystsmerter
- forvirring
- hurtig puls.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos **op til 1 ud af 1.000** personer):
- krampeanfald (se starten af dette punkt)
- muskelsammentrækninger, muskelstivhed, ukontrollerede bevægelser, problemer med at gå eller med koordinering (*ataksi*)
- hjertebanken
- besvimelse, svimmelhed når man rejser sig pludseligt på grund af fald i blodtryk
- irritabilitet, fjendtlig adfærd, unormale drømme (herunder mareridt)
- hukommelsestab
- føleforstyrrelser
- alvorlige overfølsomhedsreaktioner; udslæt samtidig med led- og muskelsmerter (*se starten af dette punkt*)
- vandladningsforstyrrelser
- forværring af psoriasis (røde fortykkede hudområder)
- gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot), forøget niveau af leverenzymer, leverbetændelse
- ændringer i blodsukkerværdier
- følelse af uvirkelighed eller fremmedhed (*depersonalisation*); se eller høre ting, der ikke er der (*hallucinationer*).

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos **færre end 1 ud af 10.000** personer):
- rastløshed, aggressivitet
- vrangforestillinger, overdreven mistænksomhed (*paranoia*)
- urininkontinens (ufrivillig vandladning, urin der siver).
- usædvanligt hårtab eller udtynding (*alopecia*).

Hyppighed ikke kendt
Andre bivirkninger kan forekomme hos et lille antal personer, men frekvensen kendes ikke:

- tanker om at gøre skade på sig selv eller begå selvmord, enten mens de har brugt Zyban, eller umiddelbart efter de har stoppet behandlingen (*se punkt 2 "Det skal du vide, før du begynder at bruge Zyban")*. Hvis du får disse tanker, **kontakt straks lægen eller tag på skadestuen**
- manglende kontakt med virkeligheden og ude af stand til at tænke klart (*psykose*). Andre symptomer kan være hallucinationer og/eller vrangforestillinger
- følelse af pludselig og intens frygt (panikanfald)
- stammen
- nedsat antal røde blodceller (anæmi), nedsat antal hvide blodceller (leukopeni) og nedsat antal blodplader (trombocytopeni)
- nedsat natrium i blodet (hyponatriæmi)
- ændringer i den mentale tilstand (f.eks. rastløs uro, hallucinationer, koma) og andre påvirkninger såsom kropstemperatur over 38 °C, øget hjertefrekvens, ustabilt blodtryk og hyperaktive reflekser, muskelstivhed, mangel på koordination og/eller mave-tarm symptomer (f.eks. kvalme, opkastning, diarré) mens du tager Zyban sammen med lægemidler mod depression (såsom peroxetin, citalopram, escitalopram, fluoxetin og venlafaxin).

Virkning af rygeophør
Personer, der holder op med at ryge, oplever ofte nikotinabstinens. Dette kan også påvirke personer, der bruger Zyban. Symptomer på nikotinabstinens omfatter:
- søvnbesvær
- rysten eller svedtendens
- uro, angst eller depression, sommetider med tanker om selvmord.

Tal med lægen, hvis du er usikker på, hvordan du har det.

Indberetning af bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke lægemidlet ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar lægemidlet i den originale yderpakning.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zyban indeholder:
Aktivt stof: Hver depottablet indeholder 150 mg bupropionhydrochlorid.
Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer):
Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, cysteinhydrochloridmonohydrat, magnesiumstearat.
Filmovertræk: Hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E171), carnaubavoks, sort jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser
Zyban 150 mg depottabletter er hvide, runde filmovertrukne depottabletter, mærket "GX CH7" på den ene side.

Zyban indeholder 30, 40, 50, 60 eller 100 depottabletter i blisterpakning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen
GlaxoSmithKline Pharma A/S
Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand
Danmark

Telefon: 36 35 91 00
E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller
Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Burgos, Spanien.

Dette lægemiddel er godkendt i medlemslandene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde under følgende navne:
Zyban: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Sverige, Tyskland.

Zyntabac: Holland, Spanien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret august 2026.