

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Celestonvalerat® 1 mg/g creme betamethason

Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Celestonvalerat creme til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Celestonvalerat creme
3. Sådan skal du bruge Celestonvalerat creme
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

- Celestonvalerat creme indeholder et stærkt binyrebarkhormon.
- Celestonvalerat dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.
- Du kan bruge Celestonvalerat til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.
- Lægen kan have givet dig Celestonvalerat for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE CELESTONVALERAT CREME

Brug ikke Celestonvalerat creme

- Hvis du er overfølsom over for det aktive stof mometasonfuroat eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Celestonvalerat creme.
- Hvis du har betændelse i huden, som skyldes bakterier eller svampe, medmindre betændelsen bliver behandlet samtidig.
- Hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næse, kinder, hage og pande (rosacea).
- Hvis du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).
- På bumser eller områder med bumser.
- Hvis du har sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).
- Til børn under 1 år med hudlidelser, f.eks. eksem eller bleeksem.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Celestonvalerat creme

Vær opmærksom på følgende:

- Behandlingen bør ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge igen har set på din hudsygdom.

- Du bør ikke bruge hormoncreme eller -salve længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behandling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning og på kønsdele.
- Du bør især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større risiko for bivirkninger.
- Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og ben.
- Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan være kommet betændelse eller allergi.
- Du bør ikke bruge tætsluttende og lufttæt forbindelse eller plaster, hvis der er betændelse i huden.
- Du bør ikke bruge Celestonvalerat rundt om øjnene.
- Undgå at få Celestonvalerat i øjnene.
- Hvis du har brugt Celestonvalerat i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.
- Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Celestonvalerat i længere tid. Fortæl derfor lægen, at du bruger Celestonvalerat creme, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse (f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.
- Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Celestonvalerat creme.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du kan bruge Celestonvalerat sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun bruge Celestonvalerat creme efter aftale med lægen.

Amning:

Du kan bruge Celestonvalerat creme i korte perioder, selv om du ammer. Spørg lægen.

Du bør ikke bruge Celestonvalerat creme på brystet mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Celestonvalerat påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Celestonvalerat creme

Celestonvalerat creme indeholder chlorcresol, der kan give allergiske reaktioner.

Celestonvalerat creme indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE CELESTONVALERAT CREME

Den sædvanlige dosis er:

Voksne: Påsmør Celestonvalerat creme i et tyndt lag 1-2 gange daglig.

Børn: Du må kun bruge Celestonvalerat til børn efter lægens anvisning.

Vask hænder efter påsmøring, medmindre du skal behandle hænderne. Du kan eventuelt bruge handsker til påsmøring.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.
Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har brugt for meget Celestonvalerat creme

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Celestonvalerat creme, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet.

Tak pakningen med.

I sjældne tilfælde efter langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uønsket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger, som står i bivirkningsafsnittet.

Hvis du har glemt at bruge Celestonvalerat creme

Brug aldrig dobbelt mængde, hvis du har glemt en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

4. BIVIRKNINGER

Celestonvalerat creme kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger forekommer især ved langvarig og overdreven brug, samt ved brug af lufttæt forbinding.

Alvorlige bivirkninger ved brug af Celestonvalerat creme

Meget sjældne bivirkninger (Forekommer hos færre 1 ud af 10.000 behandlede):

- Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øgede fedtdepoter på maven og i nakken. Kontakt læge eller skadestue.
- Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetændelse).
- Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.
- Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppighed er ikke kendt:

- Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

- Brændende fornemmelse, svien, irritation, tør hud, kløe.

Ikke almindelig bivirkninger (Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

- Ny betændelse kan opstå i hud, der er behandlet med Celestonvalerat.
- Allergisk kontakteksem.
- Betændelse i hårsække.
- Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.
- Udslæt med små væskefyldte blærer.
- Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker, laset og opblødt hud.
- Små punktformede eller større blødninger i huden.

Bivirkninger, hvor hyppighed er ikke kendt:

- Forværring af betændelse i huden, sløring af betændelse i hud.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller din pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted
<http://www.meldenbivirkning.dk/>.

5. OPBEVARING

Opbevar Celestonvalerat creme utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Celestonvalerat creme ved temperaturer over 25°C.

Brug ikke Celestonvalerat creme efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE INFORMATION**Celestonvalerat creme 1mg/g indeholder:**

- Det virksomme stof i Celestonvalerat creme er betamethason 1mg/g (som valerat)
- De øvrige indholdsstoffer er: Hvid blød paraffin, koncentreret phosphorsyre, rensat vand, cetostearylalkohol, paraffinolie, cetomacrogol 1000, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, chlorcresol.

Udseende og pakningsstørrelse**Udseende**

Celestonvalerat creme 1mg/g er en glat, hvid og ensartet creme.

Pakningsstørrelser

Tube á 50g

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller**Indehaver af markedsføringstilladelsen**

Schering-Plough Europe, Clos du Lynx 5, 1200 Bruxelles, Belgien

Fremstiller

Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgien

Repræsentant i Danmark

MSD Danmark ApS, Lautrupbjerg 4, 2750 Ballerup, tlf. 4482 4000, dkmail@merck.com

Revideret 11/2011