

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Clarityn, brusetabletter, 10 mg

Loratadin.

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

De kan få Clarityn uden recept. For at opnå de bedste resultater skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Clarityn.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Clarityns virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Clarityn
3. Sådan skal De tage Clarityn
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Clarityn
6. Yderligere oplysninger

1. CLARITYNS VIRKNING OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL

Clarityn tilhører en gruppe produkter kendt som antihistaminer. Antihistaminer er medvirkende til at reducere allergiske symptomer, ved at forhindre virkningen af de histaminer som produceres i kroppen.

Clarityn lindrer symptomer som er forbundet med allergisk rhinit, (for eksempel høfeber), såsom nysen, løbende eller kløende næse og brændende og kløende øjne.

Clarityn kan også lindre symptomer på nældefeber (nedsætte kløe, rødmen og udbredelse af udslæt).

Lindringen af disse symptomer holder en hel dag og er medvirkende til, at De kan opretholde de daglige aktiviteter samt få Deres nattesøvn.

2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE CLARITYN

Tag ikke Clarityn

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for loratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Clarityn

Inden De tager Clarityn, skal de fortælle lægen,

- hvis De har en leversygdom.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Laboratorieundersøgelser:

Hvis De skal have foretaget en hudprøvetest for allergi, skal De ikke tage Clarityn i mindst 48 timer inden testen, da denne medicin kan påvirke resultatet.

Brug af Clarityn sammen med mad og drikke

De kan tage Clarityn i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Clarityn har ikke vist sig at forstærke effekten af alkoholiske drikke.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apotek til råds, før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet

De må ikke tage Clarityn, hvis De er gravid.

Amning

De må ikke tage Clarityn hvis De ammer, da loratadin går over i modermælken. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Clarityn kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Clarityn

Clarityn brusetabletter indeholder lactose, sorbitol og saccharose: Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DE TAGE CLARITYN

Tag altid Clarityn nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apoteket. Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 12 år:

1 brusetablet (10 mg) dagligt opløses i et glas vand. Kan indtages med eller uden mad.

Børn 2-12 år doseres efter vægt:

Vægt over 30 kg:

1 brusetablet (10 mg) dagligt opløses i et glas vand. Kan indtages med eller uden mad.

Vægt under 30 kg

Til behandling af børn med en vægt på 30 kg og derunder bør Clarityn oral opløsning anvendes.

Clarityn må ikke anvendes til børn under 2 år.

Patienter med alvorlige leversygdomme:

Voksne og børn med en vægt på over 30 kg:

1 brusetablet (10 mg) opløses i et glas vand hver anden dag. Kan indtages med eller uden mad.

Hvis De har taget for mange Clarityn brusetabletter:

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Clarityn brusetabletter, end der står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag æsken med.

Symptomer set ved overdosis af Clarityn: søvnighed, hurtige hjerteslag og hovedpine.

Hvis De har glemt at tage Clarityn

Hvis De har glemt at tage en dosis Clarityn brusetabletter, så tag den så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at tage Clarityn

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

4. BIVIRKNINGER

Clarityn kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt, men forekommer meget sjældent:
svære allergiske reaktioner, leverproblemer, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme.

Ikke alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:
For børn mellem 2 og 12 år: hovedpine, nervøsitet og træthed.
For voksne og unge: døsighed, hovedpine, øget appetit og søvnbesvær.

Hyppigheden er ikke kendt, men forekommer meget sjældent:
svimmelhed, kvalme, mundtørhed, mavebesværigheder, hårtab, udslæt og træthed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:
www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. SÅDAN OPBEVARER DE CLARITYN

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Clarityn efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke Clarityn, hvis De kan se synlige forandringer i produktets udseende.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Clarityn brusetabletter 10mg indeholder:

- Aktivt stof: loratadin
- Øvrige indholdsstoffer: silica, kolloid; lactose; povidon; natriumhydrogencarbonat; citronsyre; sorbitol; mannitol; natriumcarbonat; saccharinnatrium; saccharose ester (E473); natriumcitrat; phosphatidylcholin (E322) og orangearoma.

Clarityns udseende og pakningstørrelser

Udseende

Clarityn brusetabletter 10 mg er gråhvide, mærket med "10" på den ene side.

Pakningsstørrelse

Pakket i blisterpakninger á 10 stk.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Schering-Plough Europe
73, rue de Stalle
1180 Bruxelles

Belgien

Repræsentant i Danmark

Schering-Plough A/S

Lautrupbjerg 2

2750 Ballerup

Tlf: 44 39 50 00

Denne indlægsseddel blev sidst revideret Februar 2008