



INDLÆGSSEDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

**Clarityn, oral opløsning, 1 mg/ml**  
Loratadin.**Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.**

De kan få Clarityn uden recept. For at opnå de bedste resultater skal De være omhyggelig med at følge anvisningerne for Clarityn.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

**Oversigt over indlægssedlen**

1. Clarityns virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Clarityn
3. Sådan skal De tage Clarityn
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Clarityn
6. Yderligere oplysninger

**1. Clarityns virkning og hvad De skal bruge det til**

Clarityn tilhører en gruppe produkter kendt som antihistaminer. Antihistaminer er medvirkende til at reducere allergiske symptomer, ved at forhindre virkningen af de histaminer som produceres i kroppen.

Clarityn lindrer symptomer som er forbundet med allergisk rhinit, (for eksempel høfeber), såsom nysen, løbende eller kløende næse og brændende og kløende øjne.

Clarityn kan også lindre symptomer på nældefeber (kløe, rødmen og udbredelse af udslæt).

Lindringen af disse symptomer holder en hel dag og er medvirkende til, at De kan opretholde de daglige aktiviteter samt få Deres nattesøvn.

**2. Det skal De vide, før De begynder at tage Clarityn****Tag ikke Clarityn**

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for loratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

**Vær ekstra forsigtig med at tage Clarityn**

Tal med lægen, inden De tager Clarityn, hvis De har en leversygdom.

**Brug af anden medicin**

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

**Laboratorieundersøgelser**

Hvis De skal have foretaget en hudprøvetest for allergi, må De ikke tage Clarityn i mindst 48 timer inden testen, da denne medicin kan påvirke resultatet.

**Brug af Clarityn sammen med mad og drikke**

De kan tage Clarityn i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt. Effekten af alkoholiske drikke forstærkes ikke når De tager Clarityn.

**Graviditet og amning**

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin.

**Graviditet**

De må ikke tage Clarityn, hvis De er gravid

**Amning**

De må ikke tage Clarityn hvis De ammer, da loratadin går over i modermælken. Tal med lægen.

**Trafik- og arbejdssikkerhed**

Clarityn kan på enkelte virke så sløvende, at det kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

**Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Clarityn**

Hvis De skal have foretaget en hudprøvetest for allergi, må De ikke tage Clarityn i mindst 48 timer inden testen, da denne medicin kan påvirke resultatet.

**3. Sådan skal De tage Clarityn**

Hvis Deres læge har ordineret Clarityn til Dem, skal De altid følge lægens anvisninger. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

**Den sædvanlige dosis er:****Voksne og børn over 12 år:**

10 ml (10 mg) 1 gang dagligt. Kan indtages med eller uden mad. Det er ikke nødvendigt at drikke vand eller anden form for væske for at synke den orale opløsning.

**Børn 2-12 år****Dosis afhænger af barnets vægt.**Hvis barnet vejer over 30 kg, vil dosis normalt være

10 ml (10 mg) 1 gang dagligt. Kan indtages med eller uden mad. Det er ikke nødvendigt at drikke vand eller anden form for væske for at synke den orale opløsning.

Hvis barnet vejer under 30 kg, vil dosis normalt være

5 ml (5 mg) 1 gang dagligt. Kan indtages med eller uden mad. Det er ikke nødvendigt at drikke vand eller anden form for væske for at synke den orale opløsning.

De må kun bruge Clarityn til børn under 2 år efter aftale med lægen.

**Patienter med alvorlige leversygdomme**Voksne og børn med en vægt på over 30 kg:

10 ml (10 mg) 1 gang hver anden dag. Kan indtages med eller uden mad. Det er ikke nødvendigt at drikke vand eller anden form for væske for at synke den orale opløsning.

De må kun bruge Clarityn til børn under 2 år efter aftale med lægen.

**Hvis De har taget for meget Clarityn oral opløsning**

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Clarityn oral opløsning end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer set ved overdosis af Clarityn er: søvnighed, hurtige hjerteslag og hovedpine

**Hvis De har glemt at tage Clarityn**

Hvis De har glemt en dosis oral opløsning, så tag den så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den næste dosis orale opløsning, så spring den glemte dosis oral opløsning over. Tag aldrig dobbelt dosis.

**Hvis De holder op med at tage Clarityn**

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, De er i tvivl om eller føler Dem usikker på.

**4. Bivirkninger**

Clarityn kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

**Alvorlige bivirkninger***Hyppigheden er ikke kendt, men forekommer meget sjældent:* svære allergiske reaktioner, leverproblemer, uregelmæssig eller hurtig hjerterytme.**Ikke alvorlige bivirkninger***Hyppigheden er ikke kendt:* For børn mellem 2 og 12 år: hovedpine, nervøsitet og træthed.

For voksne og unge: døsighed, hovedpine, øget appetit og søvnbesvær.

*Hyppigheden er ikke kendt, men forekommer meget sjældent:*

Svimmelhed, kvalme, mundtørhed, mavebesværigheder, hårtab, udslæt og træthed.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre.

De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: [www.laegemiddelstyrelsen.dk](http://www.laegemiddelstyrelsen.dk)**5. Sådan opbevarer De Clarityn**

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Brug ikke Clarityn efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke Clarityn hvis De kan se nogle forandringer i produktets udseende.

Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

**6. Yderligere oplysninger****Clarityn oral opløsning 1 mg/ml indeholder**

- Aktivt stof: loratadin.
- Øvrige indholdsstoffer: propylenglycol; glycerol; citronsyre; natriumbenzoat (E211); saccharose; ferskenaroma og rensset vand.

**Clarityn udseende og pakningstørrelse****Udseende**


Clarityn oral opløsning er en klar, farveløs til lys gul opløsning i en glasflaske.

**Pakningstørrelse**

100 ml i glasflaske.

**Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller**Schering-Plough Europe  
73, rue de Stalle  
1180 Bruxelles  
Belgien**Repræsentant i Danmark**Schering-Plough A/S  
Lautrupbjerg 2  
2750 Ballerup  
Tlf: 44 39 50 00**Fremstiller**Schering-Plough Labo N.V.  
Industriepark 30  
2220 Heist-op-den-Berg  
Belgien**Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2008**

IN01GV (180 x 630 mm)

NEW CODE	ODI203058IN		SUBMISSION	1.1
PRODUCTNAME	Clarityn Syrup			
CONCENTRATION	1 mg/ml			
PRESENTATION	100 ml			
	1	BLACK	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A
<b>FOR INFORMATION ONLY</b>				
REPLACES OLD CODE	06D202101IN	DATE OF START UP	13okt2008	
COUNTRY	DENMARK/ICELAND			
DTP	JVL	CO	BEY	
PROFILE	IN01GV	SIZE (mm)	W180,00 x L630,00	
SUPPLIER 1	CHESAPEAKE BORNEM (IN)/PDF/FTP			
SUPPLIER 2	N/A			