



Eulexin, tabletter 250 mg

Schering-Plough

Læs denne information godt igennem, før du begynder at bruge medicinen

- Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen.
- Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen.
- Lægen har ordineret Eulexin til dig personligt. Giv derfor ikke medicinen til andre.

Eulexin indeholder:

- Eulexin, tabletter 250 mg.
- Det aktive indholdsstof i Eulexin er flutamid.
- De øvrige indholdsstoffer er: Lactosemonohydrat, natriumlaurilsulfat, majsstivelse, magnesiumstearat, mikrokrySTALLinsk cellulose og siliciumdioxid.

Markedsføring i Danmark:

Schering-Plough Europe, 73 rue de Stalle, 1180 Brussels, Belgien

Fremstiller:

Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, 2220 Heist-Op-den-Berg, Belgien.

Dansk repræsentant:

Schering-Plough A/S, Hvedemarken 12, 3520 Farum. Tlf: 44 39 50 00

1. Virkning og anvendelse

Eulexin er svagt gule, runde tabletter med delekærv, mærket med  på den ene side.

Eulexin tabletter tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes antiandrogener. Eulexin blokerer virkningen af mandligt kønshormon (testosteron) i kroppen. Eulexin anvendes til visse typer af kræft i blærehalskirtlen (prostata), enten som den eneste medicin eller undertiden som en del af en kombination med anden behandling. Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Eulexin

– Brug ikke Eulexin hvis:

Du er overfølsom over for det aktive stof eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer i Eulexin.

– Særlige forholdsregler

Kontakt lægen, hvis du får symptomer på nedsat leverfunktion (kløe, mørkfarvet urin, vedvarende kvalme, gulsot, ømhed i øverste højre side af maven eller uforklarlige influenzalignende symptomer). Hvis du har dårligt hjerte og får ødemer (ophobning af væske), skal du kontakte lægen. Eulexin tabletter bruges kun af mænd, ikke af kvinder.

– Vigtig information om nogle af hjælpestofferne i Eulexin

Eulexin indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerarter.

– Graviditet og amning:

Få vejledning hos lægen eller på apoteket, før du bruger nogen form for medicin. Eulexin tabletter bruges kun af mænd, ikke af kvinder.

– Trafik- og arbejdssikkerhed

Eulexin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

– Brug af anden medicin

Hvis du bruger medicin for at forebygge blodpropper eller for at fortynde blodet, kan din læge være nødt til at justere din dosis af den pågældende medicin. Hvis du bruger theophyllin (et middel mod astma) mod vejrtrækningsbesvær, skal dosis måske ændres.

3. Sådan skal du bruge Eulexin

– Dosering

Indtag 1 tablet 3 gange om dagen med 8 timers interval (dvs morgen, eftermiddag og sen aften), nøjagtigt som anvist af din læge.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

– Har du brugt for meget Eulexin?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Eulexin, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

– Har du glemt at bruge Eulexin?

Hvis du glemmer at tage en dosis til tiden, skal du ikke tage en dobbelt dosis. Tag dosen så hurtigt som muligt og fortsæt så din sædvanlige dosering.

4. Bivirkninger

Eulexin kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger:

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Kontakt omgående lægen, hvis der opstår hudkløe, mørk urin, vedvarende appetitløshed, gule øjne eller gul hud, ømhed i øverste højre side af maven, eller influenzalignende symptomer. Disse symptomer kan tyde på funktionsforstyrrelser i leveren.

Fortæl lægen, hvis du får vejrtrækningsbesvær, hvis du bliver træt eller bleg som tegn på blodmangel eller hvis der opstår usædvanlige ændringer af dit bryst.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Fortæl lægen, hvis du får udslæt i ansigtet og/eller på overkroppen samt feber og ledsmerter.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Forstørrelse af brystet og/eller brystspænding, eller mælkeproduktion. Disse reaktioner forsvinder, når din læge afbryder din behandling eller nedsætter dosis. I øvrigt diarré, kvalme, opkastning, nedsat seksuallyst, impotens og hedgesingninger.

Almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Øget appetit, træthed, søvnløshed og forbigående påvirkning af leverfunktionen og leverbetændelse.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her, så bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle bivirkninger kan kræve behandling. Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted: <http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Opbevaring

Opbevar Eulexin utilgængeligt for børn. Opbevar Eulexin ved stuetemperatur (15°C - 25°C). Anvend ikke Eulexin efter den udløbsdato, der er anført på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Revideret marts 2005

COUNTRY DENMARK		NEW CODE 06D041775IN		REPLACES OLD CODE 06DD02716IN		SUBMISSION		1.1	
PRODUCTNAME EULEXIN Tabletter				DTP LDB		CO SDC		DATE OF START UP 23mrt2005	
CONCENTRATION 250mg		PRESENTATION N/A		PROFILE IN19GR		SIZE (MM) W155 x L297			
COLORS		1		black		N/A		N/A	
				N/A		N/A		N/A	
				N/A		N/A		N/A	
 Schering-Plough Heist-op-den-Berg/Belgium				SUPPLIER PRESSPHARMA/PS/ISDN					