

Terbasmin® Turbuhaler® inhalationspulver 0,5 mg/dosis Terbutalinsulfat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Lægen har ordineret Terbasmin® Turbuhaler® til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Terbasmin® Turbuhaler®
3. Sådan skal du bruge Terbasmin® Turbuhaler®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Inhalationspulver der følger med indåndingsluften ned i lungerne, når du trækker vejret dybt gennem mundstykke.

Virkning

Terbasmin® Turbuhaler® indeholder et bronkieudvidende middel, der afslapper musklerne i luftvejene og ophæver herved den pludselige forsnævring i bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald. Luften kan nu lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret. Terbasmin® Turbuhaler® virker i løbet af få minutter, og virkningen holder sig i ca. 6 timer.

Anvendelse

Du kan bruge Terbasmin® Turbuhaler® til behandling af astmaanfald og andre former for vejrtrækningsbesvær. Du bør kun bruge Terbasmin® Turbuhaler®, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald. Brug ikke Terbasmin® Turbuhaler® som vedligeholdelsesbehandling.

Lægen kan have givet dig Terbasmin® Turbuhaler® for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE TERBASMIN® TURBUHALER®

Brug ikke Terbasmin® Turbuhaler®

- hvis du er overfølsom (allergisk) over for terbutalinsulfat.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Terbasmin® Turbuhaler®

Tal med lægen, hvis

- du har hjerte/karsygdomme.
- du har for højt blodtryk eller høj, uregelmæssig puls.
- du er i behandling med digoxin eller anden hjertemedicin.
- du har sukkersyge.
- du har for højt stofskifte (Basedow).

Kontakt lægen, hvis medicinen ikke har samme virkning som den plejer, og du får flere symptomer på astma, f.eks. hoste og åndenød eller dit forbrug af Terbasmin® Turbuhaler® stiger.

Hvis du har en svær astma, er der risiko for, at kalium i blodet bliver for lavt, især hvis du samtidig tager vanddrivende medicin, astma-medicin med theofyllin eller lignende stoffer eller binyrebarkhormoner.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

- Tal med din læge, hvis du tager medicin mod
 - forhøjet blodtryk eller hjertesvigt (visse beta-blokkere, spørg lægen).
 - forstyrrelser i hjerterytmen (digitalis eller digoxin).
 - grøn stær (visse øjendråber, spørg lægen).
 - medicin, der øger hjerterytmen, eller hvis du er i behandling med binyrebarkhormoner (f.eks. prednisolon), vanddrivende midler (f.eks. furosemid) eller andre midler til behandling af astma (f.eks. theophyllin).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Terbasmin® Turbuhaler® under graviditet.

Der bør dog udvises forsigtighed i første trimester af graviditeten.

Amning

Terbasmin® Turbuhaler® går over i modermælken, men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit barn. Bivirkninger i form af irritabilitet og øget hjerterytme hos det ammede barn kan dog ikke udelukkes. Tal med lægen, hvis du har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Terbasmin® Turbuhaler® påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE TERBASMIN® TURBUHALER®

Brug altid Terbasmin® Turbuhaler® nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Du bør kun bruge Terbasmin® Turbuhaler®, når du har behov for det i forbindelse med et astmaanfald og ikke som en regelmæssig behandling.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Sædvanligvis 1 sug (0,5 mg) 4 gange dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan du tage op til 3 sug (1,5 mg) under samme anfald. Du bør ikke tage mere end 12 sug (6 mg) i døgnet.

Børn fra 10 år

Sædvanligvis 1 sug (0,5 mg) 2 gange dagligt. Hvis det er nødvendigt, kan et barn tage op til 2 sug (1 mg) under samme anfald. Et barn bør ikke tage mere end 8 sug (4 mg) i døgnet.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændringer eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Brugsanvisning

1. Skru beskyttelseshætten af.
2. Hold Terbasmin® Turbuhaler® lodret med bundstykket nedad.
Drej bundstykket én gang frem og tilbage til der lyder et klik.
3. Pust ud (**ikke** i Terbasmin® Turbuhaler®).
4. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne og luk læberne omkring.
Tag så **kraftig** og **dyb** en indånding som muligt. Tyg eller bid ikke i mundstykket.
Anvend ikke Terbasmin® Turbuhaler® hvis den er beskadiget, eller hvis mundstykket sidder løst.
5. Tag Terbasmin® Turbuhaler® væk fra munden og ånd langsomt ud.
6. Hvis du skal tage et sug mere, skal du gentage trin 2-5.
7. **Skru beskyttelseshætten på.**

Vigtigt

Følg nøje brugsanvisningen og skru altid beskyttelseshætten på efter brug.
Terbasmin® Turbuhaler® afgiver ved korrekt brug altid en dosis Terbasmin®, også hvis der er blevet drejet flere gange.
Da mængden af medicin pr. sug er meget lille, er det muligt at du hverken kan smage eller fornemme den.
Fra Terbasmin® Turbuhaler® indånder du kun det virksomme stof (terbutalinsulfat), der er ingen hjælpeoffer.

Børn

Børn kan have brug for hjælp fra en voksen, når de anvender Terbasmin® Turbuhaler®.

Rengøring

Rengør mundstykket med en tør klud.
OBS: Du må ikke gøre mundstykket rent med vand.
Skru altid beskyttelseshætten på efter brug.

Når det røde mærke kommer til syne øverst i dosisindikatoren, er der ca. 20 doser tilbage. Dosisindikatoren tæller antal klik. Når det røde mærke når bunden af dosisindikatoren, er Terbasmin® Turbuhaler® tom, og du skal kassere den.

I bunden af Terbasmin® Turbuhaler® er der et tørremiddel. Den lyd der kommer, når du ryster Terbasmin® Turbuhaler®, stammer fra dette tørremiddel og ikke fra medicinen!

Hvis du har brugt for meget Terbasmin® Turbuhaler®
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere af Terbasmin® Turbuhaler®, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.
Overdosering kan give hjertebanken, evt. blodtryksskud (besvimelse), angst, rysten på hænderne og symptomer som beskrevet under bivirkninger.

4. BIVIRKNINGER

Terbasmin® Turbuhaler® kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

- Hurtig, meget uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Vejtrækningsbesvær. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter:

- Hovedpine.
- Rysten.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter:

- Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammer og forstyrrelser i hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal med lægen.
- Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget hurtig og uregelmæssig puls, bliver utilpas eller besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue. Ring evt. 112.
- Hjertebanken.
- Længerevarende muskelkrampe.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter:

- Søvn- og adfærdsforstyrrelser som opvildelse, uro og rastløshed.
- Uregelmæssig puls på grund af ekstra hjerteslag. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.
- Lokal iltmangel i hjertemuskulaturen, som skyldes manglende blodtilførsel.
- Kvalme.
- Nældefeber, udslæt.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.
Du kan opbevare Terbasmin® Turbuhaler® ved almindelig temperatur.
Opbevares tørt.
Skal opbevares med beskyttelseshætten skruet tæt på.
Må ikke anvendes efter sidste anvendelsesdato, som er angivet på pakningen.
Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Terbasmin® Turbuhaler® 0,5 mg/dosis inhalationspulver indeholder:
Aktivt stof: Terbutalinsulfat 0,5 mg/dosis.

Udseende og pakningsstørrelse
Udseende
Terbasmin® Turbuhaler® er en flerdosis pulverinhalator. Inhalatoren er hvid med en lyseblå drejeanordning.

Pakningsstørrelse
Terbasmin® Turbuhaler® 0,5 mg/dosis fås i pakningsstørrelse á 200 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen
2care4
Tømrervej
6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af
2care4
Tømrervej
6710 Esbjerg V.

Terbasmin® og Turbuhaler® er registrerede varemærker, som tilhører AstraZeneca AB.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2009