

## INDLÆGSSEDDEL : INFORMATION TIL BRUGEREN

### **Aerius® 0,5 mg/ml oral opløsning** desloratadin

**Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at tage medicinen.**

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.
- Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.
- Lægen har ordineret Aerius til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.
- Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

#### **Oversigt over indlægssedlen:**

1. Aerius virkning og hvad De skal bruge det til
2. Det skal De vide, før De begynder at tage Aerius
3. Sådan skal De tage Aerius
4. Bivirkninger
5. Sådan opbevarer De Aerius
6. Yderligere oplysninger

### **1. AERIUS VIRKNING OG HVAD DE SKAL BRUGE DET TIL**

Aerius oral opløsning er et anti-allergisk lægemiddel, som ikke gør Dem døsig. Det hjælper med at regulere Deres allergiske reaktion og dens symptomer.

Aerius oral opløsning lindrer symptomer forbundet med allergisk snue (inflammation af næsepassager forårsaget af allergi, for eksempel høfeber eller støvmideallergi). Symptomerne indbefatter nysen, løbende eller kløende næse, kløe i ganen og kløende, røde eller løbende øjne.

Aerius oral opløsning anvendes også til at lindre symptomerne ved nældefeber (en hudlidelse forårsaget af allergi). Symptomerne indbefatter kløe og kløende udslæt.

Lindring af disse symptomer varer en hel dag og hjælper Dem med at genoptage Deres normale daglige aktiviteter og søvn.

### **2. DET SKAL DE VIDE, FØR DE BEGYNDER AT TAGE AERIUS**

#### **Tag ikke Aerius**

- hvis De er overfølsom (allergisk) over for desloratadin, loratadin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Aerius oral opløsning er beregnet til børn i alderen 1 til 11 år, unge (12 år og ældre), og voksne, inklusive ældre.

#### **Vær ekstra forsigtig med at tage Aerius**

- hvis De har dårlig nyrefunktion.

Hvis dette gælder for Dem, eller De ikke er sikker, skal De tale med Deres læge før De tager Aerius.

#### **Brug af anden medicin**

Der er ingen kendte interaktioner mellem Aerius og andre lægemidler.

#### **Brug af Aerius sammen med mad og drikke**

Aerius kan tages til maden eller mellem måltider.

### **Graviditet og amning**

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Hvis De er gravid, eller De ammer et spædbarn, anbefales det ikke at anvende Aerius oral opløsning.

### **Trafik- og arbejdssikkerhed**

Ved den anbefalede dosering forventes Aerius ikke at gøre Dem døsig eller mindre opmærksom. I meget sjældne tilfælde oplever nogle mennesker dog døsig, som kan have indflydelse på deres evne til at køre eller anvende maskiner.

### **Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Aerius**

Aerius oral opløsning indeholder sorbitol. Hvis Deres læge har fortalt Dem, at De ikke kan tåle visse sukkerarter, kontakt da Deres læge inden De begynder at anvende dette lægemiddel.

## **3. SÅDAN SKAL DE TAGE AERIUS**

Børn i alderen 1 til 5 år: Anvend 2,5 ml (½ skefuld á 5 ml) oral opløsning en gang daglig.

Børn i alderen 6 til 11 år: Anvend 5 ml (en skefuld á 5 ml) oral opløsning en gang daglig.

Voksne og unge (12 år gamle og ældre): Tag 10 ml (to skefulde á 5 ml) oral opløsning en gang daglig.

I tilfælde af at flasken med oral opløsning er forsynet med en oral målesprøjte, kan du alternativt bruge den til at udtage den passende mængde oral opløsning.

Synk dosen af oral opløsning, og drik herefter noget vand. De kan tage Deres medicin til maden eller mellem måltider.

Med hensyn til varigheden af behandlingen, vil Deres læge bestemme hvilken type allergisk snue, De lider af, og vil fastsætte, hvor længe De skal tage Aerius oral opløsning.

Hvis Deres allergiske snue er forbigående (tilstedeværelse af symptomer i mindre end 4 dage per uge eller i mindre end 4 uger), vil Deres læge anbefale Dem en behandlingsplan, som vil afhænge af vurderingen af Deres sygdomshistorie.

Hvis Deres allergiske snue er vedvarende (tilstedeværelse af symptomer i 4 dage eller mere per uge og i mere end 4 uger), vil Deres læge måske anbefale Dem en længerevarende behandling.

For nældefeber kan varigheden af behandling variere fra patient til patient, og De skal derfor følge Deres læges instruktioner.

### **Hvis De har taget for meget Aerius oral opløsning**

Tag udelukkende Aerius oral opløsning således, som det er ordineret til Dem. Ved fejlagtig overdosis forventes ingen alvorlige problemer. Men kontakt Deres læge eller apotek, hvis De tager mere Aerius oral opløsning, end De fik besked på.

### **Hvis De har glemt at tage Aerius**

Hvis De glemmer at tage Deres medicin til tiden, så tag den snarest muligt og vend så tilbage til Deres sædvanlige medicineringsplan. De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

## **4. BIVIRKNINGER**

Aerius oral opløsning kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Hos de fleste børn og voksne var bivirkningerne med Aerius nogenlunde de samme som ved en placeboopløsning eller placebotablet. Imidlertid sås der hos børn yngre end 2 år de almindelige bivirkninger diarré, feber og søvnløshed, mens der hos voksne blev rapporteret træthed, mundtørhed og hovedpine lidt oftere end ved en placebotablet.

Under markedsføring af Aerius er tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner (vejrtrækningsbesvær, hiven efter vejret, kløe, kløende udslæt og hævelse) og udslæt blevet rapporteret meget sjældent. Hjerterebank, hurtigt hjerteslag, mavepine, kvalme, opkastning, mavebesvær, diarré, svimmelhed, døsighed, besvær med at sove, muskelsmerter, hallucinationer, anfald, rastløshed med øget kropsbevægelse, leverbetændelse og unormale leverfunktionsprøver er også rapporteret i meget sjældne tilfælde.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

## **5. SÅDAN OPBEVARER DE AERIUS**

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke nedfryses. Opbevares i den originale yderpakning.

Brug ikke Aerius efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Brug ikke Aerius, hvis De bemærker ændringer i udseende af oral opløsningen.

Spørg på apoteket hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

## **6. YDERLIGERE OPLYSNINGER**

### **Aerius indeholder**

- Aktivt stof: desloratadin 0,5 mg/ml
- Øvrige indholdsstoffer: sorbitol, propylenglycol, sucralose E955, hypromellose 2910, natriumcitratdihydrat, naturligt og kunstigt smagsstof (tyggegummi), citronsyre, vandfri, dinatriumedetat og rensat vand.

### **Aerius udseende og pakningsstørrelse**

Aerius oral opløsning pakkes i flasker med 30, 50, 60, 100, 120, 150, 225 og 300 ml med børnesikkert låg. Alle pakninger på nær 150 ml flasken har vedlagt en måleske, mærket med doserne 2,5 ml og 5 ml. 150 ml pakningen har vedlagt en måleske eller en doseringsprøjte mærket med doserne 2,5 ml og 5 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

### **Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller**

Indehaver af markedsføringstilladelsen: SP Europe, Rue de Stalle 73, B-1180 Bruxelles, Belgien.

Fremstiller: SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgien.

Hvis De vil have yderligere oplysninger om Aerius, skal De henvende dig til den lokale repræsentant:

**Denne indlægsseddel blev senest godkendt: Juni 2011**

De kan finde yderligere information om Aeries på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside  
<http://www.ema.europa.eu/>