INDLÆGSSEDDEL

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1. Veterinærlægemidlets navn

Furosoral vet 40 mg tabletter til katte og hunde

2. Sammensætning

Hver tablet indeholder:

Aktivt stof:
Furosemid 40 mg

Hvid til gullig, rund og konveks tablet med en krydsformet delekærv på den ene side. Tabletter kan opdeles i to eller fire lige store dele.

3. Dyrearter

Til kat og hund.



4. Indikationer

Behandling af hydrothorax (væske omkring lungerne), hydropericardium (væske omkring hjertet), ascites (Væske i bughulen (maven)) og ødem, især forbundet med hjertesvigt og nyredysfunktion.

5. Kontraindikationer

Må ikke anvendes til dyr, der lider af hypovolæmi (for lidt væske i blodbanen), hypotension (lavt blodtryk) eller dehydrering.
Må ikke anvendes i tilfælde af nyresvigt med anuri (ingen eller næsten ingen urinproduktion).
Må ikke anvendes i tilfælde af elektrolytmangel.
Må ikke anvendes til akut glomerulær nefritis (betændelse i nyrernes små blodfiltre).
Må ikke anvendes til patienter, der har fået overdrevne doser af hjerteglykosider.
Må ikke anvendes i kombination med andre sløjfe diuretika.
Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for furosemid, sulfonamider eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

6. Særlige advarsler

Særlige advarsler:
Terapeutisk virkning kan blive forringet af øget indtagelse af drikkevand. Hvor dyrets tilstand tillader det, bør vandindtag begrænses til fysiologisk normale niveauer under behandlingen.

Særlige forholdsregler vedrørende sikker anvendelse hos den dyreart, som lægemidlet er beregnet til:
Furosemid bør anvendes med forsigtighed i tilfælde af eksisterende forstyrrelser af elektrolyt- og/eller væskebalancen, nedsat leverfunktion (kan udløse leverkoma) og diabetes mellitus.
Ved langvarig behandling skal hydreringsstatus og serum-elektrolytter overvåges hyppigt.

1-2 dage før og efter diuretika og ACE-hæmmere påbegyndes, skal nyrefunktionen og hydreringsstatus overvåges.
Furosemid bør anvendes med forsigtighed hos patienter med nefrotisk syndrom.

Særlige forholdsregler for personer, der administrerer lægemidlet til dyr:
Furosemid har mulige genotoksiske egenskaber, og der er evidens for karcinogenicitet hos mus. Selvom der er utilstrækkeligt evidens angående disse virkninger hos mennesker, bør hudkontakt med eller utilsigtet indtagelse af præparatet undgås. Bær uigennemtrængelige handsker ved håndtering og administration af veterinærlægemidlet, og vask hænderne grundigt efter.
Hver gang en ubrugt del af en tablet opbevares indtil næste brug, skal den sættes tilbage i den åbne blister, som så skal indsættes i kartonæsken. Veterinærlægemidlet skal opbevares sikkert, utilgængeligt for børn. I tilfælde af utilsigtet indtagelse skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.

Ved overfølsomhed over for furosemid og andre indholdsstoffer i præparatet bør kontakt med veterinærlægemidlet undgås. Håndter ikke dette veterinærlægemidlet, hvis du ved at du er følsom over for sulfonamider, da overfølsomhed over for sulfonamider kan føre til overfølsomhed over for furosemid. Hvis du udvikler symptomer efter eksponering, såsom et hududslæt, skal der søges lægehjælp, og denne advarsel bør vises til lægen. Hævelse af ansigt, læber eller øjne eller vejrtrækningsbesvær er mere alvorlige symptomer, som kræver øjeblikkelig lægehjælp. Vask hænder efter brug.

Drægtighed og diegivning:
Laboratorieundersøgelser har afsløret teratogene virkninger.
Veterinærlægemidlets sikkerhed under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt. Dog udskilles furosemid i mælken.
Hos drægtige og diegivende dyr må veterinærlægemidlet kun anvendes i overensstemmelse med den ansvarlige dyrlæges vurdering af benefit/riskforholdet.
En hæmmende virkning på laktation kan forventes, særligt hvis drikkevand begrænses.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:
Anvend ikke furosemid sammen med ototoksiske antibiotika til katte.
Anvendelse sammen med lægemidler, der påvirker elektrolytbalancen (kortikosteroider, andre diuretika, amfotericin B, hjerteglykosider) kræver nøje overvågning.
Anvendelse sammen med aminoglykosider eller cefalosporiner kan øge risikoen for nefrotoksicitet.
Furosemid kan øge risikoen for krydsreaktivitet.
Furosemid kan ændre behovet for insulin hos diabetiske dyr.
Furosemid kan reducere udskillelsen af NSAID'er.
Det kan være nødvendigt at reducere dosisprogrammet for langvarig behandling i kombination med ACE-hæmmere, afhængigt af dyrets respons på behandlingen.

Overdosis:
Doser over de anbefalede kan forårsage forbigående døvhed, problemer med elektrolyt- og væskebalancen, CNS-virkninger (sløvhed, koma, krampeanfald) og kardiovaskulære virkninger (hypotension, forstyrrelser af hjerterytmen, kollaps), især hos gamle og svækkede dyr. Behandlingen er symptomatisk.

7. Bivirkninger

Katte og hunde:

Sjælden (1 til 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr):	Blød afføring[1] Hæmokoncentrering (øget concentration af røde blodlegemer)[2], dehydrering[3]

	Dårligt perifert kredsløb[2] Elektrolytforstyrrelser (herunder hypokaliæmi (lavt kalium i blodet, hyponatriæmi (lavt natrium i blodet)[3]

[1] Forbigående, let, det er ikke nødvendigt at seponere behandlingen.
[2] På grund af furosemids vanddrivende virkning.
[3] Ved langvarig behandling.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et produkt. Kontakt i første omgang din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel, eller hvis du mener, at medicinen ikke har virket. Du kan også indberette bivirkninger til indehaveren af markedsføringstilladelsen eller den lokale repræsentant ved hjælp af kontaktoplysningerne sidst i denne indlægsseddel eller via det nationale bivirkningssystem:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk

8. Dosering for hver dyreart, administrationsveje og administrationsmåde

Oral anvendelse.
Den anbefalede startdosis er 2,5-5 mg furosemid pr. kg legemsvægt pr. dag, svarende til ½-1 tablet pr. 8 kg legemsvægt. I tilfælde med svært ødem eller i refraktære tilfælde kan den daglige dosis indledningsvis fordobles.
Til vedligeholdelse bør den daglige dosis justeres af dyrlægen til den lavest effektive dosis, afhængigt af hundens/kattens kliniske respons på behandlingen.
For at sikre korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anven-delse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

9. Oplysninger om korrekt administration

Hvis behandlingen administreres sidst på aftenen, kan det medføre uhensigtsmæssig diurese natten over.

10. Tilbageholdelsestid(er)

Ikke relevant.

11. Særlige forholdsregler vedrørende opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.
Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringsforhold for dette veterinærlægemiddel.
Enhver ubrugt tablet del skal returneres til den åbne blister og anvendes inden for 3 dage.
Brug ikke dette veterinærlægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteret efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den pågældende måned.

12. Særlige forholdsregler vedrørende bortskaffelse

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Benyt returordninger ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller relateret affald i henhold til lokale retningslinjer samt eventuelle nationale indsamlingsordninger, der er relevante for det pågældende veterinærlægemiddel. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

Kontakt dyrlægen eller apotekspersonalet vedrørende bortskaffelse af overskydende lægemidler.

13. Klassificering af veterinærlægemidler

Veterinærlægemidlet udleveres kun på recept.

14. Markedsføringstilladelsesnumre og pakningsstørrelser

54289

Kartonæske indeholdende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50 eller 100 blisters med 10 tabletter hver, svarende til 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 250, 500 eller 1000 tabletter pr. æske.
Kartonæske indeholdende 10 separate kartonæsker, der hver indeholder 1 blister med 10 tabletter
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

15. Dato for seneste ændring af indlægssedlen

31. juli 2026

Der findes detaljerede oplysninger om dette veterinærlægemiddel i EU-lægemiddeldatabasen (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

16. Kontaktoplysninger

Indehaver af markedsføringstilladelsen:
Le Vet. Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Holland

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:
Genera d.d.
Svetonedeljska cesta 2, Kalinovica
10436 Rakov Potok
Kroatien

Lokale repræsentanter og kontaktoplysninger til indberetning af formodede bivirkninger:
Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
7171 Uldum
Danmark
+45 76 90 11 00

Du bedes kontakte den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette veterinærlægemiddel.

17. Andre oplysninger