

Logimax® depottabletter

0094735902

Logimax® er et registreret varemærke, som tilhører AstraZeneca Koncernen

Læs denne information godt igennem før De begynder at bruge medicinen

- Gem denne information, De får måske brug for at læse den igen.
- Ønsker De mere information, så kontakt læge eller apotek.
- Lægen har ordineret Logimax® til Dem personligt. Lad derfor være med at give den til andre.

Indholdsfortegnelse:

1. Virkning og anvendelse
2. Vigtig information som De skal læse før De bruger Logimax®
3. Sådan skal De bruge Logimax®
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere information

1. Virkning og anvendelse

Logimax® er en rund, orangefarvet depottablet, mærket A FG på den ene side.

Depottabletter er fremstillet sådan, at medicinen virker over længere tid end almindelige tabletter.

Logimax® nedsætter blodtrykket. Det indeholder to aktive stoffer, og virker derfor på to forskellige måder. Metoprolol får hjertet til at arbejde langsommere.

Felodipin får de små muskler i blodkarrene til at slappe af, så blodtrykket falder.

Logimax® anvendes når Deres blodtryk ikke kan nedsættes tilstrækkeligt med ét aktivt lægemiddelstof alene.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2. Vigtig information som De skal læse før De bruger Logimax®

Brug ikke Logimax® hvis De har:

- dårligt hjerte (nedsat pumpefunktion, forstyrrelser i hjerterytmen m.m.)
- meget langsom puls (<50/min)
- alvorlige kredsløbslidelser
- for lavt blodtryk
- forstyrrelser i kroppens syre/base ligevægt
- astma
- KOL
- ubehandlet fæokromocytom (svulst i binyremarven)

- haft hjertestop indenfor de sidste 4-8 uger
- forsnævring/dårlig passage mellem hjertets kamre
- angina pectoris (hjertesmerter)
- allergi overfor metoprolol, felodipin eller lignende medicin, eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer.

De må ikke bruge Logimax® hvis De er gravid.

Særlige forholdsregler

De må ikke bruge Logimax®, hvis De er gravid.

De må ikke stoppe behandlingen med Logimax® uden at aftale det med lægen. Der er risiko for alvorlige hjerteproblemer, hvis behandlingen stoppes brat, aftal derfor med lægen, hvordan De gradvist over 10 til 14 dage kan nedsætte dosis. Hvis De skal i narkose (bedøves) skal De fortælle narkoselægen, at De bruger Logimax®.

Fortæl lægen, hvis De bruger anden medicin for hjertet og blodtrykket. Logimax® kan i sjældne tilfælde give meget for lavt blodtryk. Kontakt lægen, hvis De føler dem svimmel, har meget hurtig eller meget langsom puls. Logimax® kan forværre Raynauds sygdom (hvide, kolde finger og tæer), smertefuld gang på grund af forkalkning i benene eller dårlig reguleret sukkersyge. Logimax® kan sløre symptomer på stofskifteforstyrrelser.

Det er vigtigt, at De fortæller lægen om eventuelle allergiske reaktioner, som De har haft.

Logimax® kan udløse eller forværre psoriasis, fortæl lægen, hvis De har, har haft eller et familiemedlem har psoriasis. Fortæl lægen om generelle helbredsproblemer fx nedsat lever- eller nyrefunktion.

Brug af Logimax® sammen med mad og drikkevarer?

De kan tage Logimax® sammen med mad og drikke.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Logimax®

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse sukkerarter. Logimax® indeholder polyethyleret ricinusolie, der kan give mavebesvær og diarré.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før De bruger nogen form for medicin.

Graviditet:

De må ikke bruge Logimax®, hvis De er gravid.

Amning:

Erfaringer med Logimax® er endnu begrænsede. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Logimax® kan hos enkelte godt give bivirkninger (svimmelhed og træthed), som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Brug af anden medicin

Før De tager Logimax®, skal De fortælle Deres læge om **al** anden medicin, De tager, også det, der er købt i håndkøb. Husk også øjendråber og indsprøjtninger. Der er flere typer medicin, hvor det er særligt vigtigt, at De drøfter med lægen, hvordan de skal forholde Dem. Det drejer sig om:

- medicin mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital)
- antibiotika (rifampicin, erythromycin, telithromycin)
- naturlægemidler (perikum)
- medicin mod mavesyre og -sår (cimetidin)
- medicin mod svamp (itraconazol, ketokonazol)
- medicin mod HIV
- medicin i forbindelse med organtransplantation (tacrolimus, ciclosporin)
- vanddrivende medicin (hydrochlorthiazid, hydralazin)
- hjertemedicin (digoxin, verapamil, diltiazem, calciumantagonister, kinidin, amiodaron, nitroglycerin)
- medicin for blodtrykket (methyldopa)
- medicin mod migræne og hedeture (clonidin)
- blodfortyndende medicin (warfarin)
- medicin mod allergi
- medicin mod depression og psykose
- gigtmicin (COX-2-hæmmere)
- medicin mod smerter (indometacin, acetylsalicylsyre, ibuprofen)

Hvis De skal i narkose (bedøves) skal De fortælle narkoselægen, at De bruger Logimax®.

Doseringen skal muligvis ændres, hvis De får øjendråber mod grøn stær, eller hvis De får tabletter mod sukkersyge. Det samme gælder medicin mod depression af typen MAO-hæmmere. Derudover skal De være opmærksom på, at grapefrugtjuice, alkohol og narkotika også påvirker effekten af Logimax®, drøft Deres eventuelle forbrug af disse med lægen.

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også for medicin, som ikke er på recept, naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal De bruge Logimax® Dosering

Voksne: Startdosis 1 tablet 1 gang daglig om morgenen. Dosis kan eventuelt sættes op af lægen til 2 tabletter om morgenen.

Ældre: Startdosis 1 tablet 1 gang daglig om morgenen. Dosis kan eventuelt sættes op af lægen til 2 tabletter om morgenen.

Børn: De må kun anvende Logimax® til børn efter lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion: Dosis skal muligvis justeres. Lægens anvisning skal følges.

Depottabletterne skal indtages om morgenen. De skal synkes hele med rigelig væske og må ikke deles, tygges eller knuses.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Ændring eller stop med behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Har De taget for mange Logimax®?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Logimax®, end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet. Symptomer på overdosering er meget (for) lavt blodtryk, langsom puls, forstyrrelser i hjerterytmen, nedsat hjertepumpefunktion, hjertestop, åndenød, nedsat bevidsthed (eventuelt koma), kvalme, opkastning og iltmangel.

Har De glemt at tage Logimax®?

Hvis De har glemt en dosis skal De ikke tage dobbelt dosis, men fortsætte med Deres sædvanlige dosering.

4. Bivirkninger

Logimax® kan som al anden medicin give bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): Udtalt fald i blodtrykket, tinnitus.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter): Depression, midlertidig forværring af symptomerne på: hjertesvigt, utilstrækkelig hjertefunktion, hjertestop, forstyrrelser i hjerterytmen. Åndenød pga. krampe i bronkierne, for hurtig puls, for lavt blodtryk.

Sjældne bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 10.000 patienter): Forværring af skjult sukkersyge, angst.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 patienter): Nedsat mængde blodplader (giver øget blødningstendens), nedsat mængde hvide blodlegemer (større infektionsrisiko), vævsdød hos patienter med alvorlige kredsløbsslidelser, leverbetændelse, hjertestop, allergisk hævelse af hud og slimhinder fx i ansigt, mund og strube. Kontakt læge eller sygehus, ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter): Svimmelhed når man rejser sig fra siddende eller liggende stilling (evt. besvimelse), træthed, hovedpine, rødfarvning af huden i ansigtet.

Almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 100 patienter): Svimmelhed, langsom puls, balanceforstyrrelser (af og til med besvimelse), hjertebanken, kolde hænder og fødder, åndenød ved anstrengelse, kvalme, mavesmerter, diarré, forstoppelse, angina pectoris (hjertesmerter), hævelser i fødder og ben.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos 1-10 ud af 1000 patienter): Koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, mareridt, hallucinationer, smerter i brystet, opkastning, muskelkramper, vægtstigning, svimmelhed, følelse af myrekryb, rysten, åndenød, eksem, kløe, rastløshed.

Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker De information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får andre bivirkninger end dem,

der står i informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive suppleret.

Fortæl læge eller apotek, hvis De får bivirkninger, der bliver ved eller er generende. Nogle bivirkninger kræver behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted:

<http://www.laegemiddelstyrelsen.dk/>

5. Opbevaring

Opbevar Logimax® utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Logimax efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid eventuelle medicinrester på apoteket.

Logimax® indeholder:

De virksomme indholdsstoffer i Logimax® er felodipin 5 mg og metoprololtartrat 50 mg som metoprololsuccinat. De øvrige indholdsstoffer er: Lactose, kolloid silica, ethylcellulose, hydroxypropylcellulose, hypromellose, natriumaluminiumsilikat, mikrokrySTALLINSK cellulose, polyethyleret ricinusolie, propylgallat, natriumstearyl fumarat, macrogol 6000, paraffin, titandioxid (E 171), gul og rød jernoxid (E 172).

Pakningsstørrelser:

Logimax® findes i pakningsstørrelserne 28 stk. og 105 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Markedsføring i Danmark:

Paranova Danmark A/S, Industriparken 23-25, 2750 Ballerup.

Ompakket og frigivet:

Paranova Pack A/S, Industriparken 23-25, 2750 Ballerup.

Revideret 12/2005