



NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA Innehavare av godkännande för försäljning:
Ceva Animal Health AB
Annedalsvägen 9 - 227 64 LUND - Sverige
Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsatts:
Thepenier Pharma & Cosmetics
Route Départementale 912
61400 Saint Langis Les Mortagne
Frankrike
Ceva Santé Animale
Boulevard de la Communication
Zone Autoroutière
53950 Louvern  - Frankrike

DET VETERIN RMEDICINSKA L KEMEDLETS NAMN

Adaxio® vet 20 mg/ml + 20 mg/ml schampo f r hundar
klorhexidindiglukonat / mikonazolnitrat

DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH  VRIGA SUBSTANSER

1 ml inneh ller:
Klorhexidindiglukonat 20 mg (motsvarande klorhexidin 11,26 mg)
Mikonazolnitrat 20 mg (motsvarande mikonazol 17,37 mg)
Metylkloroisotiazolinon 0,0075 mg
Metylisotiazolinon 0,0025 mg
Bensoesyra (E210) 1,35 mg
Schampo. En klar ljusgul till gul v tska.

ANV NDNINGSSOMR DE(N)

F r att behandla och h lla seborroisk dermatit (mj lleksem) relaterad till *Malassezia pachydermatis* och *Staphylococcus pseudintermedius* under kontroll.

KONTRAINDIKATIONER

Skall inte anv ndas vid  verk nslighet mot aktiva substanser, eller mot n gra hj lp mn n.

BIVERKNINGAR

I enstaka fall kan hundar med atopi ( rftlig ben genhet att f  eksem) utveckla kl da och/eller hudrodnad efter behandling.
I mycket s llsynta fall kan hundar efter behandling utveckla hudreaktioner (kl da, hudrodnad).
Frekvensen av biverkningar anges enligt f ljande:
- Mycket vanliga (fler  n 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)
- Vanliga (fler  n 1 men f rre  n 10 djur av 100 behandlade djur)
- Mindre vanliga (fler  n 1 men f rre  n 10 djur av 1 000 behandlade djur)
- S llsynta (fler  n 1 men f rre  n 10 djur av 10 000 behandlade djur)
- Mycket s llsynta (f rre  n 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade h ndelser inkluderade)
Om du observerar biverkningar,  ven s dana som inte n mns i denna bipacksedel, eller om du tror att l kemedlet inte har fungerat, meddela din veterin r.
Du kan ocks  rapportera biverkningar via det nationella rapporteringssystemet.
SE: L kemedelsverket, Box 26, 751 03, Uppsala. www.lakemedelsverket.se.
FI: http://www.fimea.fi/web/sv/veterinar

DJURSLAG: Hund.

DOSERING F R VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSS TT OCH ADMINISTRERINGSV G

F r utv rtes bruk.
En generell rekommendation  r att schamponera tv  g nger i veckan till dess att symptomen avtar och d refter en g ng i veckan eller s  ofta som det beh vs f r att h lla tillst ndet under kontroll.

ANVISNING F R KORREKT ADMINISTRERING

Bl t djuret noggrant med rent vatten och applicera produkten p  flera st llen p  djuret och massera in det i p lsen. Anv nd tillr ckligt mycket schampo, s  att ett l dder bildas i p lsen och p  huden, s rskilt runt l pparna, under svansen och mellan t rna.
L t verka i 10 minuter (l t djuret st  uppr tt), sk lj d refter noga med rent vatten och l t djuret torka naturligt i en varm, dragfri milj .

	Antal behandlingar per 200 ml flaska	
	Korth�rigt djur	L�ngh�rigt djur
Upp till 15 kg	13	6
16-24 kg	10	5
25 kg eller mer	8	4

	Antal behandlingar per 500 ml flaska	
	Korth�rigt djur	L�ngh�rigt djur
Upp till 15 kg	33	15
16-24 kg	25	13
25 kg eller mer	20	10

KARENSTIDER: Ej relevant.

S RSKILDA F RVARINGSANVISNINGAR:

F rvaras utom syn- och r ckh ll f r barn.
F rvaras vid h gst 25  C.
F rvaras i skydd mot kyla, f r ej frysas.
H llbarhet i  ppnad innerf rpackning: 3 m nader.

Anv nd inte detta l kemedel efter utg ngsdatumet p  flaskan och kartongen efter EXP. Utg ngsdatumet  r den sista dagen i angiven m nad. N r flaskan  ppnas f rsta g ngen ska datumet f r n r eventuellt kvarvarande schampo ska kasseras r knas ut genom att anv nda bipacksedelns information om h llbarhet f r  ppnad innerf rpackning.
Datum f r kassering ska anges p  etiketten.

S RSKILD(A) VARNING(AR)

S rskilda varningar f r respektive djurslag: F r att f rebygga  terfall av infektion b r l mpliga  tg rder vidtas i djurets omgivning (exempelvis reng ring och desinfektion av hundb ddar och hundg rdar).

S rskilda f rsiktighets tg rder f r djur:

Allm nna och lokala riktlinjer f r antibiotikabehandling ska beaktas vid anv ndning av l kemedlet.

Se till att djuret inte inandas produkten eller f r in den i n sa,  ronkanal, nos eller mun under schamponeringen.

Vid ofrivillig kontakt med  gonen, sk lj  gat med rikligt med vatten. Om  gonirritationen kvarst r, kontakta veterin r.

Tilll t inte djuret att slicka sig under schamponering och sk ljning eller innan p lsen har torkat.

Valpar skall efter behandlingen inte ha kontakt med digivande tikar f rr n p lsen har torkat.

Anv ndning av denna produkt p  annat s tt  n vad som anges i produktresum n kan orsaka utveckling av resistens i bakterier som finns p  huden.

S rskilda f rsiktighets tg rder f r personer som ger l kemedlet till djur: Personer som  r  verk nsliga f r klorhexidin, mikonazol eller n gra av hj lp mn na ska undvika kontakt med l kemedlet.

Denna produkt kan orsaka  verk nslighet efter hudkontakt. Om du f r symtom s som hudutslag efter kontakt med produkten, kontakta l kare och visa etikett eller bipacksedel.

Denna produkt kan outsp dd orsaka allvarlig  gonirritation. Undvik kontakt med  gonen.

Vid ofrivillig kontakt med  gonen, sk lj  gat med rikligt med vatten. Om irritationen kvarst r, konsultera l kare.

Denna produkt kan irritera huden. Undvik l ngre hudkontakt med schampot genom att tv tta och torka h nderna noggrant.

Undvik alltf r mycket ber ring av behandlade djur direkt efter avslutad behandling.

Dr ktighet och digivning:

Djurstudier har inte gett bel gg f r att klorhexidin eller mikonazol orsakar fosterskadande eller skadliga effekter f r moderdjuret efter behandling med rekommenderade doser.

S kerheten av detta l kemedel har dock inte fastst llts under dr ktighet och digivning. D rf r ska l kemedlet endast anv ndas i enlighet med ansvarig veterin rs nytta/riskbed mning.

Se  ven avsnitt *”S rskilda f rsiktighets tg rder f r djur”*.

Andra l kemedel och Adaxio® vet:

Det finns ingen data att tillg  avseende denna produkts anv ndning samtidigt med andra produkter som anbringas p  huden.

 verdosering (symptom, akuta  tg rder, motgift): Inga data tillg ngliga.

Blandbarhetsproblem: Inga k nda

S RSKILDA F RSIKTIGHETS TG RDER F R DESTRUKTION AV EJ ANV NT L KEMEDEL ELLER AVFALL, I F REKOMMANDE FALL

SE: Ej anv nt l kemedel och avfall ska kasseras enligt g llande anvisningar.
FI: Oanv nt l kemedel levereras till apotek eller problemavfallsanstalt f r oskadligg rande.

DATUM D  BIPACKSEDELN SENAST GODK NDES:

SE: 2020-08-27, FI: 07.06.2019

 VRIGA UPPLYSNINGAR

F rpackningar: Kartong med en flaska (200 ml), kartong med en flaska (500 ml), flaska (200 ml), flaska (500 ml).
Eventuellt kommer inte alla f rpackningsstorlekar att marknadsf ras.
SE: For ytterligare upplysningar om detta lakemedel, kontakta innehavaren av godkannandet for forsaljning.

MYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEK  ER N VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Myyntiluvan haltija:
Ceva Sant  Animale
10, av. de la Ballastierre - 33500 Libourne, Ranska
Er n vapauttamisesta vastaava valmistaja:
Thepenier Pharma & Cosmetics
Route D partementale 912
61400 Saint Langis Les Mortagne
Ranska
Ceva Sant  Animale
Boulevard de la Communication
Zone Autorouti re
53950 Louvern  - Ranska

EL INL  KEVALMISTEEN NIMI

Adaxio® vet 20 mg/ml + 20 mg/ml shampoo koirille
klooriheksidiinidiglukonaatti /mikonatsolinitraatti

VAIKUTTAVAT JA MUUT AINEET

1 ml sis lt  :
Klooriheksidiinidiglukonaatti 20 mg (vastaa 11,26 mg klooriheksidiini )
Mikonatsolinitraatti 20 mg (vastaa 17,37 mg mikonatsolia)
Metyylikloori-isotiatsolinoni 0,0075 mg
Metyyli-isotiatsolinoni 0,0025 mg
Bentsoehappo (E210) 1,35 mg
Shampoo.
Kirkas keltainen tai vaaleankeltainen neste.

K YTT AIHEET

Seborroisen ihottuman hoitoon ja yll pitohoitoon, kun ihottuman aiheuttajana on *Malassezia pachydermatis* ja/tai *Staphylococcus pseudintermedius*.

VASTA-AIHEET

Ei saa k ytt   tapauksissa, joissa esiintyy yliherkkyytt  vaikuttaville aineille tai apuaineille.

HAITTAVAIKUTUKSET

Atooppisilla koirilla voi hyvin harvoin ilmet  kutinaa ja/tai punoitusta. Hyvin harvoin voi ilmet  ihoreaktioita (kutinaa, punoitusta).
Haittavaikutusten esiintyvyys m  ritell  n seuraavasti:
- hyvin yleinen (useampi kuin 1/10 hoidettua el int  saa haittavaikutuksen)
- yleinen (useampi kuin 1 mutta alle 10 /100 hoidettua el int )
- melko harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 1000 hoidettua el int )
- harvinainen (useampi kuin 1 mutta alle 10 / 10.000 hoidettua el int )
- hyvin harvinainen (alle 1 / 10.000 hoidettua el int , mukaan lukien yksitt iset ilmoitukset).

Jos havaitset haittavaikutuksia, my s sellaisia, joita ei ole mainittu t ss  pakkauselosteessa, tai olet sit  mielt , ett  l  ke ei ole tehonnut, ilmoita asiasta el inl  k rillesi.

Vaihtoehtoisesti voit my s ilmoittaa kansallista raportointij rjestelm   k ytt  en {www.fimea.fi/elainlaakkeet/}.

KOHDE-EL INLAJIT: Koira

ANNOSTUS, ANTOREITIT JA ANTOTAVAT KOHDE-EL INLAJEITTAIN: Iholle. K sitt le el in shampoolla kaksi kertaa viikossa, kunnes oireet rauhoittuvat. Jatka k sittelyj  sen j lkeen kerran viikossa tai tarvittaessa siten, ett  oireet pysyv t hallinnassa.

ANNOSTUSOHJEET:

Kastele el in perusteellisesti puhtaalla vedell . Annostele valmiste useaan kohtaan ja hiero se turkkiin. K yt  shampooa riitt v sti, jotta turkki ja iho ovat vaahdon peitossa. Varmista, ett  shampoo levittyy huulten ymp rille, h nn n alle ja varvasv leihin. Anna shampooon vaikuttaa 10 minuuttia. Huuhtele sen j lkeen puhtaalla vedell . Anna turkin kuivua itseks en l mpim ss  vedottomassa ymp rist ss .

	Hoitokertojen m��r�/200 ml pullo	
	Lyhyt karva	Pitk� karva
� 15 kg	13	6
16-24 kg	10	5
� 25 kg	8	4

	Hoitokertojen määrä/500 ml pullo	
	Lyhyt karva	Pitkä karva
≤ 15 kg	33	15
16-24 kg	25	13
≥ 25 kg	20	10

VAROAIKA: Ei oleellinen.

SÄILYTYSOLOSUHTEET: Ei lasten näkyville eikä ulottuville.

Älä säilytä yli 25 °C.

Älä säilytä kylmässä. Ei saa jäätyä.

Sisäpakkauksen ensimmäisen avaamisen jälkeinen kesto aika: 3 kuukautta.

Älä käytä tätä eläinlääkevalmistetta viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen, joka on ilmoitettu ulkopakkauksessa ja pullossa, EXP jälkeen. Eräntymispäivällä tar koitetaan kuukauden viimeistä päivää.

Kun pullo on avattu ensimmäisen kerran, jäljellä olevan valmisteen viimeinen käyttöpäivämäärä tulee laskea pakkausselosteen tietojen avulla. Tämä päivä määrä merkitään etikettiin sille varattuun kohtaan.

ERITYISVAROITUKSET:

Erityisvaroitukset kohde-eläinlajeittain

Infektion uusiutumisen ehkäisemiseksi eläimen elinympäristössä on noudatet tava asianmukaisia varoitomenpiteitä (esim. kenneleiden ja makuualustojen puhdistus ja desinfiointi).

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet

Valmistetta käytettäessä on otettava huomioon viralliset, kansalliset ja paikalli set mikrobilääkkeiden käyttöä koskevat ohjeet.

Huolehdi siitä, ettei eläin vedä valmistetta henkeen eikä saa sitä silmiin, korva käyttöviin, nenään tai suuhun shampoopesun aikana.

Jos valmistetta joutuu vahingossa silmiin, huuhtele ne runsaalla vedellä.

Jos silmien ärsytys jatkuu, ota yhteys eläinlääkäriin.

Älä anna eläimen nuolla itseään shampoopesun ja huuhtelun aikana tai ennen kuin turkki on kuivunut. Koiranpennut eivät saa olla kosketuksessa imettävän emon kanssa käsittelyn jälkeen ennen kuin turkki on kuivunut.

Valmisteyhteenvedon ohjeista poikkeava käyttö saattaa aiheuttaa resistenssin kehitymistä ihon bakteereissa.

Erityiset varoitomenpiteet, joita eläinlääkevalmistetta antavan henkilön on noudatettava

• Henkilöiden, jotka ovat yliherkkiä klooriheksidiinille, mikonatsolille tai jollekin valmisteen sisältämälle apuaineelle, tulee välttää kosketusta eläinlääkevalmis teen kanssa.

• Tämä valmiste voi aiheuttaa ihoaltistuksen jälkeen yliherkkysoireita. Jos sinulle kehittyi altistuksen jälkeen oireita, esimerkiksi ihottumaa, käänny lää kärin puoleen ja näytä pakkausselostetta tai myyntipäällystyä.

• Laimentamattoman valmisteen joutuminen vahingossa silmiin voi aiheuttaa vakavaa silmien ärsytystä. Valmisteen joutumista silmiin on vältettävä. Jos val mistetta joutuu vahingossa silmiin, huuhtele ne runsaalla vedellä. Jos ärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin.

• Valmiste voi ärsyttää ihoa. Vältä pitkäaikaista kosketusta shampoon kanssa pesemällä ja kuivaamalla kätesi huolellisesti.

• Vältä hoidettujen eläinten liiallista käsittelyä ja silittelyä heti hoidon jälkeen.

Tiineys ja imetys

Klooriheksidiiniin tai mikonatsolin suositusannoksilla tehdyissä laboratoriotutki muksissa ei ole löydetty näyttöä epämuodostumia aiheuttavista, sikiötoksisista tai emälle toksisista vaikutuksista. Eläinlääkevalmisteen turvallisuutta koirilla tiineyden ja imetyksen aikana ei ole selvitetty. Tästä syystä valmistetta voidaan käyttää ainoastaan hoitavan eläinlääkärin tekemän hyöty-haitta-arvion perus teella.

Yhteisvaikutukset muiden lääkevalmisteiden kanssa sekä muut yhteisvaikutukset

Eläinlääkevalmisteen yhteisvaikutuksista muiden paikallisesti käytettyjen valmisteiden kanssa ei ole tietoa.

Yliannostus (oireet, hätätoimenpiteet, vastaläkkeet)

Ei saatavilla olevaa tietoa.

Yhteensopimattomuudet

Ei tunnet a.

ERITYISET VAROTOIMET KÄYTTÄMÄTTÖMÄN VALMISTEEN TAI LÄÄKEJÄTTEEN HÄVITTÄMISEKSI

Käyttämättömät eläinlääkevalmisteet tai niistä peräisin olevat jätemateriaalit on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

PÄIVÄMÄÄRÄ, JOLLOIN PAKKAUSSELOSTE ON VIIMEKSI HYVÄKSYTTY:
07.06.2019

MUUT TIEDOT: Pakkausko ot: Pahlvikotelo, jossa yksi 200 ml:n pullo, pahlvikotelo, jossa yksi 500 ml:n pullo, 200 ml pullo, 500 ml pullo.

Kaikkia pakkauskojoja ei välttämättä ole markkinoilla.

Lisätietoja tästä eläinlääkevalmisteesta saa myyntiiluvan haltijan paikalliselta edustajalta.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADEL-SENSAMTPÅDENINDEHAVERAFVIRKSOMHEDSGODKENDELSE,SOMERANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA	
Indehaver af markedsføringstilladelsen	
Ceva Animal Health A/S	
Ladegårdsvej 2 - 7100 VEJLE - Danmark	
Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:	
Thepenier Pharma & Cosmetics	Ceva Santé Animale
Route Départementale 912	Boulevard de la Communication
61400 Saint Langis Les Mortagne	Zone Autoroutière
Frankrig	53950 Louverné - Frankrig

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Adaxio® Vet. 20 mg/ml + 20 mg/ml Shampoo til hunde.

Klorhexidindigluconat/miconazolnitr at.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Hver ml indeholder:

Klorhexidindigluconat 20 mg (svarende til 11,26 mg klorhexidin).

Miconazolnitr at 20 mg (svarende til 17,37 mg miconazol).

Methylchloroisothiazolin 0,0075 mg.

Methylisothiazolin 0,0025 mg.

Benzoesyre (E210) 1,35 mg.

Shampoo.

Klar lysegul til gul væske.

INDIKATIONER

Til behandling af og kontrol med seborrhæisk dermatitis associeret med *Mallassezia pachydermatis* og/eller *Stafylococcus pseudintermedius*.

KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

BIVIRKNINGER

I meget sjældne tilfælde kan hunde udvikle en hudreaktion (kløe, rødme) efter behandling.

I meget sjældne tilfælde kan en atopisk hund udvikle en pruritisk og/eller erytematos reaktion efter behandling.

I meget sjældne tilfælde kan hunde udvikle en hudreaktion (kløe, rødme) efter behandling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isole rede rapporter)

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirk ninger, der ikke allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikke har virket efter anbefalingerne.

Alternativt kan du indberette observerede bivirkninger via det nationale bivirk ningssystem:

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300, København S. www.mel denbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

DYREARTER

Hunde.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESV EJ(E)
Kutan anvendelse.

Som en generel regel anvendes shampoo 2 gange ugentligt indtil symptomer ne aftager og herefter 1 gang ugentligt eller efter behov for at holde tilstanden under kontrol.

Vær opmærksom på, at dyrlægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid dyrlægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Dyret skylles grundigt med rent vand og produktet appliceres flere steder og masseres ind i pelsen. Der anvendes tilstrækkeligt til at frembringe skum i pelsen og på huden. Sørg for at shampoo'en appliceres rundt om læberne, under halen og mellem tæerne. Lad dyret stå 10 min. efter behandlingen, og skyl derpå med rent vand og efterfølgende naturlig tørring i et varmt, trækfrit miljø.

	Antal behandlinger i 200 ml flaske	
	korthårede	langhårede
Op til 15 kg	13	6
16-24 kg	10	5
25 kg eller mere	8	4

	Antal behandlinger i 500 ml flaske	
	korthårede	langhårede
Op til 15 kg	33	15
16-24 kg	25	13
25 kg eller mere	20	10

TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn

Må ikke opbevares over 25 °C.

Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.

Holdbarhed efter første åbning af beholderen: 3 måneder.

Dette veterinære medicinallægemiddel må ikke anvendes efter udløbsdatoen anført på flasken og æsken efter EXP. Udløbsdatoen refererer til den sidste dag i måneden.

Når beholderen åbnes første gang, bør det beregnes, hvornår indholdet skal kasseres i henhold til holdbarheden, som er angivet i denne indlægsseddel. Denne dato bør skrives på etiketten på det angivne sted.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart

For at forhindre at infektionen genopstår skal passende forholdsregler tages i dyrets omgivelser (f.eks. rengøring og desinficering af hundebur, hundekurv).

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Brug af produktet, som afviger fra produktresumeet kan forårsage udvikling af resistens hos dyrets hudbakterier.

Der bør tages hensyn til den officielle, nationale og regionale antibiotikapolitik ved anvendelse af produktet.

Undgå at dyret inhalerer produktet eller får det i øjnene, øregangene, næse eller mund under behandlingen.

I tilfælde af utilsigtet kontakt med øjnene skylles med rigeligt vand.

Kontakt dyrlægen hvis øjenirritationen fortsætter.

Undgå at dyret slikker sig selv under behandlingen og skylning eller indtil pelsen er tør. Hvalpe bør ikke have adgang til behandlede moderdyr før pelsen er tør. Brug af produktet, som afviger fra produktresumeet kan forårsage udvik ling af resistens hos dyrets hudbakterier.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som ind giver lægemidlet til dyr
• Mennesker med kendt overfølsomhed over for klorhexidin, miconazol eller et eller flere af hjælpestofferne bør undgå kontakt med produktet.

• Produktet kan forårsage overfølsomhed efter hudkontakt. Hvis du udvikler symptomer efter kontakt f.eks. hudkløe søg lægehjælp og vis etiketten eller indlægssedlen til lægen.

• Utilsigtet øjenkontakt med ufortyndet produkt kan forårsage alvorlig øjenirritation. Undgå øjenkontakt. I tilfælde af utilsigtet øjenkontakt skylles med rigeligt vand. Søg læge hvis irritationen fortsætter.

• Produktet kan medføre hudirritation. Undgå langvarig kontakt med shampoo'en ved forsigtig vask og tørring af hænderne.

• Undgå unødvendig håndtering af behandlede dyr umiddelbart efter behandlingen.

Anvendelse under drægtighed og diegivning

Undersøgelser af laboratoriedyr har ikke afsløret teratogene virkninger, føtal eller maternel toksicitet pga. klorhexidin eller miconazol ved de anbefalede doser. Sikkerheden ved anvendelse til drægtige og lakterende hunde er imidlertid ikke undersøgt. Produktet bør derfor kun bruges efter den ansvarlige dyrlæges vurdering af fordele og ulemper. Se afsnittet " Særlige forsigtigheds regler vedrørende brug til dyr".

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om interaktioner med andre topikalt anvendte produkter

Overdosering: Ingen tilgængelige data.

Uforl igeligheder: Ingen kendte.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT
Ikke anvendte veterinærlægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN: 10/2020
ANDRE OPLYSNINGER

Til dyr.

Pakningstørrelser

Æske med 1 flaske med 200 ml.

Æske med 1 flaske med 500 ml.

Flaske med 200 ml.

Flaske med 500 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Du bedes kontakte indehaveren af markedsføringstilladelsen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel.